



# สรุปรายงานการป่วย

## พ.ศ.2559



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559

ที่ปรึกษา นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
แพทย์หญิงมนิตา พรพรรณี  
รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะกรรมการปัจจุบัน กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โทร 0 2590 1497  
โทรศาร 0 2591 8627



### สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2559

จัดทำโดย: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560  
216 หน้า, ตาราง, แผนภูมิ  
สถิติ - - เจ็บป่วย  
สุขภาพ  
การเจ็บป่วย



## คำนำ

สรุประยงานการป่วย พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนนั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลรายบุคคล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลตามโครงการสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) จากหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงสาธารณสุข และฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จาก 2 กองทุน ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความชุก (Prevalence) ของการมารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการ และการนำเสนอจำนวนและอัตราตามสาเหตุการป่วยรายกลุ่มโรค สาเหตุภายนอก ในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สามารถแยกตามเพศ และกลุ่มอายุ

ข้อมูลการป่วยที่นำเสนอในเอกสารนี้ ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) และ สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จึงขอขอบคุณหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ธันวาคม 2560

## สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

ก

สารบัญตาราง

ข

สารบัญรูปภาพ

ง

บทนำ

1

**ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก**

- สถานการณ์ป่วยผู้ป่วยนอก

6

**ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน**

- สถานการณ์ป่วยผู้ป่วยใน

14

- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

19

- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กกลุ่มอายุระหว่าง แรกเกิด-4 ปี

20

- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี

21

- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี

21

- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี

23

- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

23

- ภาพรวมของสถานการณ์ผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก

25

- การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล

- สัดส่วนการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน

31

- จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน

32

- จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนในโรงพยาบาล

32

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน

33

| สารบัญตาราง |   |      |
|-------------|---|------|
| ตาราง       |   | หน้า |
| 1           | 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2555 – 2559                 | 8    |
| 2           | 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559                        | 8    |
| 3           | จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559                                | 9    |
| 4           | 10 ลำดับแรกอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559                            | 17   |
| 5           | 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ทั้งประเทศและรายภาค พ.ศ. 2559                   | 17   |
| 6           | 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ.2555 - 2559                                 | 18   |
| 7           | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559    | 20   |
| 8           | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559 | 21   |
| 9           | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559       | 22   |
| 10          | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559      | 22   |
| 11          | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559      | 23   |
| 12          | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2559    | 24   |
| 13          | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก พ.ศ.2559   | 26   |
| 14          | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี พ.ศ. 2559                   | 28   |
| 15          | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คนจากสาเหตุภายนอกกลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ.2559                            | 29   |
| 16          | 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2559                      | 30   |
| 17          | จำนวนนันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559   | 32   |
| 18          | จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559                       | 32   |

| สารบัญตาราง |  |      |
|-------------|--|------|
| ตาราง       |  | หน้า |
| 19          | ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ<br>พ.ศ. 2559  | 33   |
| 20          | จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการนิจฉัยโรค) จำแนก<br>ตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และรุ่งเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชี<br>จำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2559           | 35   |
| 21          | จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการนิจฉัยโรคหลัก)<br>จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตาม<br>บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2559        | 89   |
| 22          | จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการนิจฉัยโรค) กลุ่ม<br>อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชี<br>จำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 - 2559 | 146  |
| 23          | จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการนิจฉัยโรค) จำแนก<br>ตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ<br>ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)<br>พ.ศ. 2558 - 2559                     | 178  |
| 24          | จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายนอกของ<br>การบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร<br>(ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 ) พ.ศ. 2559   | 210  |

| สารบัญภาพ |   |      |
|-----------|---|------|
| ตัวร่าง   |   | หน้า |
| 1         | อัตราป่วยผู้ป่วยนอกทั้งประเทศ อัตราต่อประชากร 1,000 คน  | 6    |
| 2         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)<br>จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559                          | 14   |
| 3         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)<br>จำแนกตามภาค พ.ศ. 2559                          | 15   |
| 4         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) พ.ศ.<br>2555 - 2559                               | 15   |
| 5         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)<br>จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2559              | 16   |
| 6         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)<br>จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ พ.ศ. 2555 - 2559 | 19   |
| 7         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก<br>จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 - 2559                          | 25   |
| 8         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก<br>จำแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559                 | 25   |
| 9         | อัตราการป่วยของผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก<br>จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2559                           | 27   |
| 10        | สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและ สิทธิ<br>การประกันสุขภาพ พ.ศ. 2559                      | 31   |

## บทนำ

### ความเป็นมา

รายงานการป่วย เป็นข้อมูลที่แสดงความชุกของโรคต่างๆ ที่มีผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในสถานบริการทุกระดับ ในอดีตได้รวบรวมข้อมูลการป่วยจากระบบรายงาน ตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก (รง.504) ตามกลุ่มสาเหตุ (21กลุ่มโรค) แบบรายงานผู้ป่วยในรายโรค (รง.505) ตามกลุ่มสาเหตุ (75กลุ่มโรค) เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลเพื่อใช้ทดแทนระบบเบียนรายงานแบบเดิม ดังนั้น ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลการป่วยจากระบบรายงานดังกล่าว ต่อมาในปีพ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการสาธารณสุขทุกแห่งรายบุคคล ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) จึงมีการปรับเปลี่ยนการนำฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งการนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

**ส่วนที่ 1** รายงานการป่วยผู้ป่วยนอกจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้าง มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43แฟ้ม) โดยยังคงรายละเอียดกลุ่มโรคตามแบบรายงานเดิม แบ่งเป็น 21 กลุ่มโรค โดยนำเสนอรายงานผู้ป่วยนอก เป็นภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค ทั้งจำนวนและ อัตราการป่วยต่อประชากร 1,000 คน รวมทั้งการจัดลำดับโรค 10 ลำดับแรก ในภาพรวมทั้งประเทศ และจำแนกรายภาค ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ

**ส่วนที่ 2** รายงานผู้ป่วยในจากฐานข้อมูลรายบุคคลระบบประกันสุขภาพ ได้นำเสนอตารางหลักๆ ได้แก่ จำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกวิธีการวินิจฉัยโรค ต่อประชากร 100,000 คน (นับทุกวิธีการวินิจฉัยโรคในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง) จำนวนและอัตราผู้ป่วยในเฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก ต่อประชากร 100,000 คน (นับการวินิจฉัยโรคหลักเพียง 1 โรคในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง) ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค การจัดลำดับโรค 10 โรค/กลุ่มโรค จำแนกตามกลุ่มอายุ รวมถึงจำนวนและอัตราผู้ป่วยในรวมทุกวิธีการวินิจฉัยโรคต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และเปรียบเทียบข้อมูลปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) จำแนกเพศ โรค/กลุ่มโรค ซึ่งการจัดกลุ่มโรค จัดตามตารางการป่วยของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 โดยแบ่งออกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค

**ส่วนที่ 3** จำนวนและอัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ต่อประชากร 100,000 คน (นับการวินิจฉัยโรคจากสาเหตุภายนอกเพียง 1 สาเหตุในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง) จำแนกกลุ่มสาเหตุภายนอกหลัก ๆ 35 กลุ่มสาเหตุ ภาพรวมประเทศ จำแนกเพศ รวมทั้งการจัดลำดับ 10 ลำดับสาเหตุภายนอก

นอกจากนี้ ยังแสดงข้อมูลอื่นๆ เช่น วันนอนเฉลี่ยของการมารับบริการต่อปี สัดส่วนการนอนโรงพยาบาล เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญๆ

## การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

### 1. ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจากระบบระเบียนรายงาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ได้ยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามแบบรายงาน รง.504 และข้อมูลผู้ป่วยในตามแบบรายงาน รง.505 จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยนำฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ซึ่งปัจจุบันฐานข้อมูลรายบุคคลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประมวลผล เพื่อทดสอบระบบรายงานเดิมมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม โรคสำคัญ ฐานข้อมูลดังกล่าวรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกรหัสการรักษาพยาบาลจากสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดจัดส่งฐานข้อมูลเป็นรายเดือนมา�ัง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามปีปฏิทิน

### 2. ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล พ.ศ. 2559 รวบรวมข้อมูลจากระบบประกันสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวจากการบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ) เป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลส่งติงให้กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมสถานบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ และแสดงรายละเอียดข้อมูลมากขึ้น เช่น เพศ กลุ่มอายุ โรค ระดับสถานบริการสุขภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดของข้อมูล ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่ง โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว เฉพาะรายการข้อมูล ที่จำเป็น ในการบริหารงานสาธารณสุขเท่านั้น

### การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล

1) ตรวจสอบข้อมูลราย Record โดยตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลสำคัญๆ (วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีที่มารับบริการ เป็นต้น) ความถูกต้องของรหัสโรค ความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ ของรหัสโรคที่สำคัญๆ กับเพศ อายุ ความถูกต้องของข้อมูลการให้รหัสโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ที่สำคัญ เช่น ไข้ทรพิษ การโกรก เป็นต้น

2) การให้รหัสสาเหตุภัยนอกรหัสที่ต้องใช้ร่วมกับรหัสการบาดเจ็บ

## การประมาณผล

### 1. รายงานผู้ป่วยนอก ประมาณผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

- 1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ภาพรวมประเทศไทย และจำแนกรายภาค
- 2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก หน่วยนับเป็น รายโรค สำหรับการนับโรคจากทุกการวินิจฉัยโรคของมาตรการรับบริการในแต่ละครั้ง

### 2. รายงานผู้ป่วยใน ประมาณผลรายปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง

- 1) จำนวน และอัตรา ผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศไทย จำแนกรายภาค และ เพศ
- 2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity)ของ บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10) จำแนกเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค หน่วย นับเป็น ราย สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคหลัก และหน่วยนับเป็น รายโรค สำหรับ การนับโรคจากทุกการวินิจฉัยโรคของมาตรการรับบริการในแต่ละครั้ง
- 3) จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศไทย จำแนกรายภาค เพศ และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ หน่วยนับเป็น ราย

## การจัดลำดับ 10 ลำดับโรคของรายงานการป่วย

ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้นำสาเหตุการป่วยบางโรค / กลุ่มโรค มาจัดลำดับ 10 ลำดับโรค

**1. รายงานผู้ป่วยนอก** การจัดลำดับโรค ไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มา จัดลำดับโรค กลุ่มโรคอาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และสาเหตุภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99,X00-X39, X50-X59, X70-X74, X91-X99, Y00-Y84,Y86-Y89)

**2. รายงานผู้ป่วยใน** นำสาเหตุการป่วย ตามกลุ่มโรค ของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศไทย

ครั้งที่ 10 มาจัดลำดับโรค โดยไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มาจัดลำดับโรค ได้แก่ การคลอดของครรภ์เดี่ยว (O80), อาการ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99) และกลุ่มบุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและการซักสูตร (Z00-Z99) และกลุ่มโรคอื่นๆ ที่เหลือ ของแต่ละบท

## การคำนวณอัตราป่วย

ใช้จำนวนประชากรกลางปีปฏิทิน ของส่วนราชการเปียนราชภูมิ สำนักบริหารการทะเบียนโดยแบ่งการคำนวณอัตราป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ส่วนการคำนวณวันนอนเฉลี่ยจะใช้จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

**Formula  
01**

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยนอก} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกช่วงปีหนึ่ง}}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}} \times 1,000$$



**Formula  
02**

$$\text{สูตรในการคำนวณอัตราผู้ป่วยใน} = \frac{\text{จำนวนผู้ป่วยในช่วงปีหนึ่ง}}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}} \times 100,000$$



**Formula  
03**

$$\frac{\text{จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วย}}{\text{รักษาในโรงพยาบาล}} = \frac{\text{จำนวนวันที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}}$$



## คำจำกัดความ

|  |         |  |
|--|---------|--|
| ราย  | หมายถึง | จำนวนครั้งของการมารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในสำหรับในรายงานนี้รวมจากการวินิจฉัยโรคหลักผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง  |
| รายโรค   | หมายถึง | จำนวนของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคนั้นๆ ในแต่ละครั้งที่มารับบริการ สำหรับในรายงานนี้ รวมรวมจากทุกวินิจฉัยโรคของผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง   |
| จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล (วันนอนเฉลี่ย) | หมายถึง | จำนวนวันโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน 1 คน ที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลจนจำหน่ายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยจากวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน ต่อจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน                             |
| การวินิจฉัยโรคหลัก   | หมายถึง | การวินิจฉัยโรคหลัก โรคที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาพยาบาลไม่นับรวมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ที่เป็นโรคร่วมด้วยในครั้งนั้น  |
| รวมทุกการวินิจฉัยโรค                                       | หมายถึง | การวินิจฉัยโรคทั้งหมด ที่ผู้ป่วยมารับบริการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ได้แก่ การวินิจฉัยโรคหลัก (Principle) การวินิจฉัยโรคร่วม (Co-morbidity) การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อน (Complication) และการวินิจฉัยโรคอื่นๆ (Other) |


<sup>1</sup> กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, ศัพทานุกรมข้อมูลสุขภาพ, 2547, โรงพยาบาลส่งเสริมสันค้าและพัสดุ, กรุงเทพฯ

# ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

## ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาฐานรูปแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้มารับบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ได้ยกเลิกการส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกตามแบบรายงานรง.504 และข้อมูลผู้ป่วยในตามแบบรายงาน รง.505 จากสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยนำฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคสำคัญ ในปี พ.ศ. 2558 การนำเสนอข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอกได้ประมวลผลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล ตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) แต่การจำแนกกลุ่มโรคยังคงแบ่งเป็นกลุ่มสาเหตุการป่วย (21 กลุ่มโรค) โดยแสดงข้อมูลการป่วย ของผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในพารามะระดับประเทศ และภาคตามกลุ่มโรคต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า มีแนวโน้มโรคที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ยอดรวมของอัตราป่วยขึ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากพบว่าบางกลุ่มโรค มีอัตราป่วยลดลงซึ่งอาจเนื่องจากเดิมใช้รูปแบบการรายงานที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดควบรวมหรือประมวลผลส่งเป็นรายเดือนมาเป็นส่วนกลาง นำฐานข้อมูลมาตรวจสอบและประมวลผล นอกจากนี้ ข้อจำกัดของข้อมูลผู้ป่วยนอก คือ ได้รับข้อมูลเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลผู้ป่วยของสถานบริการสังกัดอื่น ๆ และกรุงเทพมหานคร สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยนอก

**ภาพ 1 อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน พ.ศ. 2555 – 2559**



อัตราผู้ป่วยนอกในภาพรวมประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 มีอัตราลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจมีผลจากการเปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนำข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลจากฐานข้อมูล 21 แฟ้มมาประมวลผลที่ส่วนกลางแทนการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือนจากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนาการเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) จากสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดรวบรวมจัดส่งเป็นรายเดือน ภายใต้ชื่อ Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข อัตรารายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2559 อัตรารายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 (ภาพที่ 1)

จากการที่ 1 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงเป็นลำดับที่ 1 อันดับที่ 2 และ ลำดับที่ 3 จะอยู่ในกลุ่มโรคกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และกลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกซึ่ม

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 ลำดับแรก รายภาค พ.ศ. 2559 พบว่า โรคระบบไหลเวียนเลือดเป็นลำดับแรกในภาพรวมประเทศไทย เช่นเดียวกับภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกซึ่ม สูงเป็นลำดับแรก

ตาราง 1 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2555 – 2559

| ลำดับ<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(ชื่อโรค)                                  | 2555  |        | 2556  |        | 2557  |        | 2558  |        | 2559  |        |
|-------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                   |   | ลำดับ | อัตรา  |
| 9                 | โรคระบบปัสสาวะเลือด (I00-I99)                           | 2     | 425.72 | 2     | 4140.1 | 1     | 438.34 | 1     | 489.89 | 1     | 610.93 |
| 4                 | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาโบลิสึม(E00-E90) | 3     | 385.76 | 3     | 462.87 | 2     | 414.58 | 2     | 462.23 | 2     | 567.13 |
| 10                | โรคระบบหัวใจ (J00-J99)                                  | 1     | 473.34 | 1     | 418.25 | 3     | 409.98 | 3     | 408.14 | 3     | 499.58 |
| 11                | โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก(K00-K93)               | 5     | 337.35 | 5     | 354.83 | 5     | 323.44 | 5     | 362.53 | 4     | 440.42 |
| 13                | โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม(M00-M99) | 4     | 354.91 | 4     | 351.66 | 4     | 345.13 | 4     | 371.76 | 5     | 438.54 |
| 12                | โรคผิวหนังและเนื้อยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L99)               | 7     | 104.93 | 8     | 98.64  | 6     | 92.26  | 8     | 98.25  | 6     | 114.56 |
| 1                 | โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-A99, B00-B99 )                  | 6     | 127.53 | 6     | 116.71 | 8     | 86.97  | 7     | 115.17 | 7     | 110.98 |
| 14                | โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ(N00-N99)                    | 8     | 103.33 | 7     | 104.7  | 9     | 81.25  | 6     | 141.67 | 8     | 108.69 |
| 7                 | โรคตารุณส่วนประ躬ของตา(H00-H59)                          | 9     | 80.67  | 9     | 75.62  | 7     | 88.88  | 9     | 86.06  | 9     | 104.42 |
| 5                 | ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99)                   | 10    | 62.35  | 10    | 59.77  | 10    | 50.76  | 10    | 72.09  | 10    | 76.36  |

ตาราง 2 10 ลำดับแรก อัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

| ลำดับ<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(ชื่อโรค)                                  | ภาคกลาง |        | ภาคใต้ |        | ภาคเหนือ |        | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |        | รวมทั้งประเทศ |        |
|-------------------|---|---------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|---------------|--------|
|                   |   | ลำดับ   | อัตรา  | ลำดับ  | อัตรา  | ลำดับ    | อัตรา  | ลำดับ                 | อัตรา  | ลำดับ         | อัตรา  |
| 9                 | โรคระบบปัสสาวะเลือด (I00-I99)                           | 1       | 820.81 | 1      | 631.36 | 3        | 510.24 | 1                     | 547.94 | 1             | 610.93 |
| 4                 | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาโบลิสึม(E00-E90) | 2       | 676.16 | 2      | 586.84 | 1        | 529.07 | 3                     | 484.46 | 2             | 567.13 |
| 10                | โรคระบบหัวใจ (J00-J99)                                  | 4       | 502.33 | 3      | 479.91 | 2        | 512.35 | 2                     | 501.20 | 3             | 499.58 |
| 11                | โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก(K00-K93)               | 5       | 477.23 | 5      | 409.49 | 4        | 458.85 | 4                     | 405.90 | 4             | 440.42 |
| 13                | โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม(M00-M99) | 3       | 537.52 | 4      | 409.52 | 5        | 455.14 | 5                     | 326.63 | 5             | 438.54 |
| 12                | โรคผิวหนังและเนื้อยื่อใต้ผิวหนัง(L00-L99)               | 7       | 121.69 | 6      | 115.53 | 6        | 107.57 | 6                     | 120.37 | 6             | 114.56 |
| 1                 | โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-A99, B00-B99 )                  | 8       | 119.82 | 8      | 106.73 | 7        | 106.33 | 7                     | 118.46 | 7             | 110.98 |
| 14                | โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ(N00-N99)                    | 6       | 133.97 | 9      | 99.39  | 9        | 101.82 | 8                     | 109.76 | 8             | 108.69 |
| 7                 | โรคตารุณส่วนประ躬ของตา(H00-H59)                          | 9       | 112.75 | 7      | 107.36 | 8        | 105.63 | 9                     | 85.82  | 9             | 104.42 |
| 5                 | ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99)                   | 10      | 102.20 | 10     | 65.80  | 10       | 70.08  | 10                    | 77.54  | 10            | 76.36  |

## ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559 (อัตราต่อประชากร 1,000 คน)

| กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย  | ทั่วประเทศ  |          | ภาคกลาง    |          | ภาคใต้     |          | ภาคเหนือ   |          | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |          |
|----------|--|-------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------------------|----------|
|          |  | จำนวน       | อัตรา    | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน                 | อัตรา    |
|          | รวม  | 221,786,620 | 3,732.86 | 51,058,491 | 4,375.83 | 61,034,232 | 3,678.91 | 77,792,501 | 3,553.56 | 31,901,396            | 3,443.36 |
| 1        | โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-A99, B00-B99)Certain infectious and parasitic diseases   | 6,593,971   | 110.98   | 1,398,125  | 119.82   | 1,770,689  | 106.73   | 2,327,663  | 106.33   | 1,097,494             | 118.46   |
| 2        | เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (C00-C97, D00-D48) Neoplasms  | 2,586,374   | 43.53    | 633,965    | 54.33    | 785,495    | 47.35    | 858,684    | 39.22    | 308,230               | 33.27    |
| 3        | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน(D50-D89) Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders | 1,582,891   | 26.64    | 373,282    | 31.99    | 419,326    | 25.28    | 571,203    | 26.09    | 219,080               | 23.65    |
| 4        | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาbolism(E00-E90) Endocrine, nutritional and metabolic diseases   | 33,695,849  | 567.13   | 7,889,678  | 676.16   | 9,735,788  | 586.84   | 11,582,010 | 529.07   | 4,488,373             | 484.46   |
| 5        | ภาวะแพร่ป่วยทางจิตและพฤติกรรม(F00-F99) Mental and behavioural  | 4,536,752   | 76.36    | 1,192,520  | 102.20   | 1,091,622  | 65.80    | 1,534,204  | 70.08    | 718,406               | 77.54    |
| 6        | โรคระบบประสาท (G00-G99) Diseases of the nervous system   | 3,781,151   | 63.64    | 888,485    | 76.15    | 1,167,774  | 70.39    | 1,217,859  | 55.63    | 507,033               | 54.73    |
| 7        | โรคตารwmส่วนประoglobของตา(H00-H59) Diseases of the eye and adnexa  | 6,204,240   | 104.42   | 1,315,658  | 112.75   | 1,781,114  | 107.36   | 2,312,399  | 105.63   | 795,069               | 85.82    |
| 8        | โรคหูและปุ่มูกหู (H60-H95) Disease of the ear and mastoid process  | 1,844,947   | 31.05    | 499,337    | 42.79    | 497,817    | 30.01    | 560,288    | 25.59    | 287,505               | 31.03    |

ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

| กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย   | ทั่วประเทศ |        | ภาคกลาง   |        | ภาคใต้     |        | ภาคเหนือ   |        | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |        |
|----------|---|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|
|          |   | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน     | อัตรา  | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  |
| 9        | โรคระบบไหลเวียนเลือด (I00-I99) Diseases of the circulatory system   | 36,298,204 | 610.93 | 9,577,445 | 820.81 | 10,474,447 | 631.36 | 11,169,840 | 510.24 | 5,076,472             | 547.94 |
| 10       | โรคระบบหายใจ (J00-J99) Diseases of the respiratory system   | 29,682,626 | 499.58 | 5,861,348 | 502.33 | 7,961,786  | 479.91 | 11,216,057 | 512.35 | 4,643,435             | 501.20 |
| 11       | โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก (K00-K93) Diseases of the digestive system   | 26,167,346 | 440.42 | 5,568,455 | 477.23 | 6,793,623  | 409.49 | 10,044,784 | 458.85 | 3,760,484             | 405.90 |
| 12       | โรคผิวหนังและเนื้อยื่นตัวผิวหนัง (L00-L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue                                 | 6,806,630  | 114.56 | 1,419,887 | 121.69 | 1,916,618  | 115.53 | 2,354,900  | 107.57 | 1,115,225             | 120.37 |
| 13       | โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยื่น เสริม (M00-M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue | 26,055,746 | 438.54 | 6,271,998 | 537.52 | 6,794,038  | 409.52 | 9,963,625  | 455.14 | 3,026,085             | 326.63 |
| 14       | โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ (N00-N99) Diseases of the genitourinary system  | 6,458,019  | 108.69 | 1,563,162 | 133.97 | 1,648,992  | 99.39  | 2,228,939  | 101.82 | 1,016,926             | 109.76 |
| 15       | ภาวะแทรกในกรณีตั้งครรภ์ การคลอด และ ระยะหลังคลอด (O00-O99) ยกเว้น (O80-O84)   | 937,002    | 15.77  | 135,598   | 11.62  | 281,751    | 16.98  | 277,750    | 12.69  | 241,903               | 26.11  |

## ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

| กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย   | ทั่วประเทศ |        | ภาคกลาง   |        | ภาคใต้    |        | ภาคเหนือ  |        | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |        |
|----------|---|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------|
|          |   | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน     | อัตรา  | จำนวน     | อัตรา  | จำนวน     | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  |
| 16       | ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด) (P00-P96) Certain conditions originating in the perinatal period   | 275,828    | 4.64   | 57,752    | 4.95   | 72,374    | 4.36   | 108,890   | 4.97   | 36,812                | 3.97   |
| 17       | รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ (Q00-Q99) Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities   | 288,080    | 4.85   | 57,583    | 4.93   | 77,000    | 4.64   | 100,300   | 4.58   | 53,197                | 5.74   |
| 18       | อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ (R00-R99) Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified | 21,862,779 | 367.97 | 5,083,953 | 435.71 | 5,992,791 | 361.22 | 7,254,295 | 331.38 | 3,531,740             | 381.21 |
| 19       | การเป็นพิษและผลที่ตามมา (X40-X49, X60-X69, X85-X90) Poisoning, toxic effect, and their sequelae   | 72,026     | 1.21   | 17,630    | 1.51   | 21,129    | 1.27   | 22,682    | 1.04   | 10,585                | 1.14   |

## ตาราง 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 100,000 คน ทั้งประเทศและรายภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2559

| กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย   | ทั่วประเทศ |       | ภาคกลาง |       | ภาคใต้    |       | ภาคเหนือ  |       | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |       |
|----------|---|------------|-------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------------|-------|
|          |   | จำนวน      | อัตรา | จำนวน   | อัตรา | จำนวน     | อัตรา | จำนวน     | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา |
| 20       | อุบัติเหตุจากการชนส่างและผลที่ตามมา<br>(V01-V99, Y85) Transport accidents and their sequelae  | 1,413,341  | 23.79 | 265,639 | 22.77 | 438,573   | 26.44 | 482,123   | 22.02 | 227,006               | 24.50 |
| 21       | สาเหตุจากภัยนอกรื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย<br>(W00-W99, X00-X19, X20-X29, X30-X39, X50-X59, X70-X84, X91-X99, Y00-Y09, Y20-Y36, Y40-Y84, Y86-Y89) Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes) | 4,642,818  | 78.14 | 986,991 | 84.59 | 1,311,485 | 79.05 | 1,604,006 | 73.27 | 740,336               | 79.91 |

แหล่งข้อมูล : ปี พ.ศ. 2559 ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)

# ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน


สถานการณ์การป่วย พ.ศ. 2559 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยของประชาชนไทย จากข้อมูลผู้ป่วยในที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว สำหรับการสรุปผลการรายงานของการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยใน เป็นการจำแนก สาเหตุการป่วยตามกลุ่มโรค/การจัดลำดับโรคในแต่ละกลุ่มอายุ จำแนกตามเพศ และภูมิภาคต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน

รูปแบบการเจ็บป่วยของประชาชน พ.ศ. 2559 ประมาณผลและวิเคราะห์จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีอัตราการป่วย 30,364.23 ต่อประชากร 100,000 คน และจากการวิเคราะห์ พบร่วมกัน มีอัตราการป่วยสูงกว่าเพศชาย (31,355.48 และ 29,334.94) (ภาพที่ 2) และเมื่อพิจารณาตามภูมิภาคต่าง ๆ พบร่วมกัน มีอัตราการป่วยมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง (32518.48 ,32439.69 ,30586.92, 30074.56, 28016.61) ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับ (ภาพ 3)

ภาพ 2 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ

พ.ศ. 2559




รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 3 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกร่วมกิจฉัยโรค) จำแนกตามภาค

พ.ศ. 2559




รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 4 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกร่วมกิจฉัยโรค) พ.ศ. 2555 - 2559



รวบรวม /

วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)


จากภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่าอัตราผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 แต่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มาก เมื่อพิจารณาข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 พบว่าอัตราผู้ป่วยลดลง แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มการป่วยของผู้ป่วยในลดลง เนื่องจากยังขาดข้อมูลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบางแห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2558 และปี 2559

ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุการป่วยที่พบสูงที่สุด มีสาเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ นำ รองลงมาได้แก่ เบาหวาน และโลหิตจางอื่นๆ ตามลำดับ (ตาราง 4) เมื่อจำแนกรายภาค พบว่า ผู้ป่วยในมี สาเหตุการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ เป็นลำดับแรก โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการป่วย ลำดับที่สอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ภาคเหนือ และ ภาคใต้ ส่วนสาเหตุการป่วยจากโลหิตจางอื่น ๆ ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) และภาคใต้ ตามลำดับ (ตาราง 5)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 ลำดับแรก เปรียบเทียบ พ.ศ. 2555 – 2559 พบว่า โรคที่พบในผู้ป่วยใน ลำดับแรกเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ โรคเบาหวาน ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 พบอัตราป่วยเป็น ลำดับสาม ในปี พ.ศ. 2557 – 2559 พบอัตราป่วยเป็นลำดับสอง ส่วนของโรคโลหิตจางอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 มีอัตราป่วยเป็นลำดับสอง และในปี พ.ศ. 2557 – 2559 มีอัตราป่วยเป็นลำดับสาม (ตาราง 6)

เมื่อพิจารณาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มอายุ พบร้า ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราป่วยสูงที่สุด รองลงมากลุ่มเด็กอายุ 0 – 4 ปี และอัตราป่วยน้อยที่สุดในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเพศ จะเห็นว่าผู้ป่วยเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้นในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปีและ 15 – 59 ปี ที่ผู้ป่วย เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย (ภาพ 5)

**ภาพ 5 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่ม อายุ และเพศ พ.ศ. 2559**



ร ว บ ร ว մ /

วิเคราะห์ : กอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลชั้นราษฎร์ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

#### ตาราง 4 10 ลำดับแรกอัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค   | รวม     | ชาย     | หญิง    |
|-------|---|---------|---------|---------|
| 1     | ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน้ำ(I10)   | 1993.38 | 1751.03 | 2226.78 |
| 2     | เบาหวาน (E10-E14)   | 1292.79 | 1042.83 | 1533.51 |
| 3     | โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)  | 1192.32 | 1108.53 | 1273.02 |
| 4     | ไตวาย (N17-N19)   | 1092.81 | 1111.63 | 1074.7  |
| 5     | ปอดบวม (J12-J18)  | 791.87  | 906.55  | 681.43  |
| 6     | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ(A09)  | 687.03  | 650.24  | 722.46  |
| 7     | ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด(O20-O29,<br>O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) | 451.03  | -       | 885.38  |
| 8     | โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น<br>(J40-J44)                     | 391.47  | 586.71  | 203.45  |
| 9     | โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25)   | 376.88  | 432.59  | 323.24  |
| 10    | โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39)  | 364.04  | 304.27  | 421.6   |

หมายเหตุ: อันดับที่ 7 กลุ่มโรคภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)

\*อัตราป่วยเพศหญิงใช้จำนวนประชากรรวมเป็นตัวหาร\*

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

#### ตาราง 5 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

ทั้งประเทศและรายภาค พ.ศ. 2559

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค  | รวม      | ภาคกลางไม่รวม กทม. | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคเหนือ | ภาคใต้   |
|-------|--|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------|
| 1     | ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน้ำ(I10)  | 1,993.38 | 2,072.68           | 1,815.34              | 2,232.29 | 1,756.32 |
| 2     | เบาหวาน (E10-E14)  | 1,292.79 | 1,251.77           | 1,471.53              | 1,214.44 | 1,005.27 |
| 3     | โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)   | 1,192.32 | 1,072.43           | 1,356.24              | 1,358.50 | 869.70   |
| 4     | ไตวาย (N17-N19)  | 1,092.81 | 940.89             | 1,318.38              | 1,227.06 | 784.80   |
| 5     | ปอดบวม (J12-J18)   | 791.87   | 718.19             | 910.36                | 787.85   | 817.05   |
| 6     | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ(A09)   | 687.03   | 581.70             | 811.62                | 688.04   | 820.86   |
| 7     | ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) | 451.03   | 748.94             | 860.50                | 739.47   | 1,561.64 |
| 8     | โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรัง(J40-J44)                          | 391.47   | 325.78             | 315.63                | 621.43   | 521.16   |
| 9     | โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25)  | 376.88   | 453.18             | 258.59                | 344.06   | 384.10   |
| 10    | โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29, N31-N39)   | 364.04   | 374.90             | 325.44                | 466.60   | 292.03   |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

**ตาราง 6 10 ลำดับแรก อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)**


พ.ศ.2555 - 2559

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค   | 2555     | 2556     | 2557     | 2558     | 2559     |
|-------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1     | ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเส้นทาง(I10)   | 1,546.18 | 1,600.15 | 1,544.32 | 1,882.32 | 1,993.38 |
| 2     | เบาหวาน (E10-E14)   | 1,050.05 | 1,081.25 | 1,032.50 | 1,233.46 | 1,292.79 |
| 3     | โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)  | 1,132.42 | 1,127.94 | 1,030.73 | 1,156.98 | 1,192.32 |
| 4     | ไข้วย (N17-N19)   | 743.46   | 806.01   | 813.95   | 993.89   | 1,092.81 |
| 5     | ปอดบวม (J12-J18)  | 626.53   | 606.87   | 596.12   | 702.44   | 791.87   |
| 6     | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ(A09)<br>ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด | 636.68   | 645.74   | 579.96   | 617.45   | 687.03   |
| 7     | (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)   | 994.66   | 949.66   | 779.49   | 886.87   | 451.03   |
| 8     | โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น<br>แบบเรื้อรังอื่น (J40-J44)                | 390.73   | 366.01   | 347.94   | 384.06   | 391.47   |
| 9     | โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ (I20, I23-I25)   | 326.58   | 327.50   | 307.72   | 375.48   | 376.88   |
| 10    | โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ (N25-N29,<br>N31-N39)                                     | 305.93   | 306.50   | 286.16   | 346.82   | 364.04   |

รวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภาพ 6 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการริบูนิจฉัยโรค) จำแนกสาเหตุ การป่วยที่สำคัญ พ.ศ. 2555 – 2559



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองธุรกิจศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลเข้ารักษาระยะครึ่งปี ประจำปี พ.ศ. 2559 กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

อัตราผู้ป่วยในจำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ได้แก่ ไตวาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง (ภาพ 6) พบว่า ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ไตวาย และโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง อัตราการป่วยเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

#### สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

การเจ็บป่วยในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด เมื่อจำแนกตามเพศตามสาเหตุการป่วย พบว่า เพศชายมีอัตราป่วยสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้นสาเหตุจากทางในครรภ์โดยทั่วไป ทางในครรภ์ขาดสารอาหารและความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยที่เพศหญิงมีอัตราป่วยสูงกว่าเพศชาย (ตาราง 7)

**ตาราง 7 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี  
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559**

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค  | รวม       | ชาย       | หญิง      |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1     | ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด(P22-P28)  | 10,871.56 | 12,584.52 | 9,061.21  |
| 2     | ทารกในครรภ์โดยชา ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย(P05-P07) | 10,373.96 | 10,046.90 | 10,719.61 |
| 3     | ปอดบวม (J12-J18)   | 7,229.37  | 8,730.49  | 5,642.90  |
| 4     | อาการห้องร่าง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09)   | 6,775.75  | 7,816.61  | 5,675.72  |
| 5     | การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปราสิต(P35-P37)  | 5,404.62  | 5,794.40  | 1,992.67  |
| 6     | ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด(P00-P04)            | 4,520.50  | 4,621.94  | 4,413.29  |
| 7     | หลอดลมอักเสบเนียบพลั้นและหลอดลมเล็กอักเสบเนียบพลั้น(J20-J21)   | 4,398.82  | 5,406.10  | 3,334.27  |
| 8     | ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร(Q38-Q40, Q42-Q45)  | 3,993.70  | 4,379.03  | 3,175.09  |
| 9     | โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)   | 3,137.73  | 4,386.00  | 1,818.50  |
| 10    | ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต(Q20-Q28)  | 2,244.52  | 2,287.75  | 2,198.82  |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพตัวหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

**สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในเด็ก กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี**

ในเด็กกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี พบร่วม ส่วนใหญ่สาเหตุการเจ็บป่วยลำดับต้นๆ เกิดจากปอดบวม รองลงมาสาเหตุจากการห้องร่าง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอัตราการป่วยในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง (ตาราง 8)

**ตาราง 8 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี  
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559**

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค   | รวม      | ชาย      | หญิง     |
|-------|---|----------|----------|----------|
| 1     | ปอดบวม (J12-J18)  | 4,147.93 | 4,715.15 | 3,547.32 |
| 2     | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจาก การติดเชื้อ(A09)  | 3,970.79 | 4,464.37 | 3,448.18 |
| 3     | ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเป็ด(P22-P28)   | 1,981.27 | 2,291.34 | 1,652.95 |
| 4     | ทารกในครรภ์โตข้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย(P05-P07) | 1,890.58 | 1,829.30 | 1,955.47 |
| 5     | โลหิตจางอื่น ๆ(D51-D64)   | 1,349.87 | 1,669.98 | 1,010.91 |
| 6     | การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ(J00-J01, J05-J06)  | 1,240.46 | 1,452.07 | 1,016.40 |
| 7     | การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย(E86)   | 1,240.08 | 1,347.81 | 1,126.01 |
| 8     | คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน(J02-J03)  | 1,194.64 | 1,330.80 | 1,050.47 |
| 9     | การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปราสิต(P35-P37)   | 984.95   | 1,055.02 | 910.76   |
| 10    | ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลกระทบปัจจัยทางมารดา และโรคแทรก ในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด(P00-P04)               | 823.83   | 841.54   | 805.07   |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองบูรณาการและแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษากายาสั่งยาทางการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานภาคส่วนที่ศูนย์บริการสุขภาพ (สภส.)

### สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5-14 ปี

ในกลุ่มอายุ 5 – 14 ปี สาเหตุสำคัญของผู้ป่วยในลำดับแรก ได้แก่ โรคโลหิตจางอื่น ๆ รองลง สาเหตุมาจากการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ โดยอัตรา ป่วยพับในเพศชายสูงกว่าเพศหญิง (ตาราง 9)

### สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-24 ปี

สำหรับกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มอายุนี้ 5 ลำดับแรก ได้แก่ การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มี ปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำครรภ์ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด, โลหิตจางอื่น ๆ, ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด, อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และภาวะดูดแตกหักของ แขนขาอื่น ๆ

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบรความแตกต่างของการเจ็บป่วยในเพศชายและเพศหญิง โดย เพศชายการเจ็บป่วย ลำดับแรก ได้แก่ กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ รองลงมาคือ โลหิตจางอื่น ๆ และการบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ ส่วนเพศหญิง ซึ่งจัดว่าเป็นช่วงวัยรุ่นและสตรีวัยเจริญพันธุ์ สาเหตุที่พบลำดับแรก จึงเกี่ยวกับการดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำครรภ์ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด รองลงมาคือ ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด และโลหิตจางอื่น ๆ ตามลำดับ (ตาราง 10)

**ตาราง 9 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 5-14 ปี  
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559**

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค  | รวม    | ชาย    | หญิง   |
|-------|--|--------|--------|--------|
| 1     | โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)   | 777.80 | 789.58 | 765.34 |
| 2     | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09) | 660.25 | 702.42 | 615.64 |
| 3     | ปอดบวม (J12-J18)   | 315.19 | 337.29 | 291.81 |
| 4     | หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน (J20-J21)                  | 308.16 | 348.95 | 265.00 |
| 5     | คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (J02-J03)                      | 288.42 | 303.18 | 272.80 |
| 6     | กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ (K29)                                   | 262.07 | 261.96 | 262.19 |
| 7     | การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย (E86)   | 245.28 | 249.09 | 241.25 |
| 8     | โรคของไส้ติ้ง (K35-K38)  | 230.99 | 245.15 | 216.01 |
| 9     | โรคหืด (J45-J46)   | 215.29 | 265.04 | 162.66 |
| 10    | การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ (J00-J01, J05-J06)        | 188.08 | 203.32 | 171.97 |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลชำราชาก ครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองการสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

**ตาราง 10 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-24 ปี  
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559**

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค   | รวม    | ชาย    | หญิง     |
|-------|---|--------|--------|----------|
| 1     | การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหารกในครรภ์ และถุงน้ำครรภ์ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) | 620.04 | 0.00   | 1,268.94 |
| 2     | โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)  | 484.88 | 353.19 | 622.71   |
| 3     | ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีไดรบุรายละเอียด (O85-O99)                       | 337.83 | 0.00   | 691.38   |
| 4     | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09)  | 277.54 | 186.09 | 373.23   |
| 5     | กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12)  | 230.98 | 375.42 | 79.81    |
| 6     | โรคของไส้ติ้ง (K35-K38)   | 223.67 | 197.54 | 251.02   |
| 7     | การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ (S06)   | 164.36 | 257.27 | 67.13    |
| 8     | โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม (K20-K23, K28, K30-K31)  | 123.17 | 92.88  | 154.88   |
| 9     | การคลอดติดขัด (O64-O66)   | 119.27 | 0.00   | 244.10   |
| 10    | กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า (S02)   | 115.94 | 192.28 | 36.04    |

หมายเหตุ : อันดับ 1 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหารกในครรภ์ และถุงน้ำครรภ์ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) และอันดับ 9 การคลอดติดขัด (O64-O66) อัตราป่วยใช้ประชากรรวมเป็นตัวหาร

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลชำราชาก ครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองการสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลชำราชาก ครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองการสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

### สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 15-59 ปี

การเจ็บป่วยของประชากรในช่วงวัย 15 – 59 ปี ครอบคลุม 3 กลุ่มวัย คือ วัยรุน วัยเจริญพันธุ์ และวัยทำงานจะเห็นว่าสาเหตุการป่วย 5 ลำดับแรก ได้แก่ โลหิตจางอื่น ๆ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (สาเหตุการป่วยที่พบเฉพาะในเพศหญิง) เบ้าหวาน ไตรวย และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ ในเพศชายสาเหตุการป่วยสำคัญที่พบ ได้แก่ โลหิตจางอื่น ๆ เบ้าหวาน ไตรวย ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์ และกระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ สำหรับเพศหญิงสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด โลหิตจางอื่น ๆ เบ้าหวาน ไตรวย และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (ตาราง 11)

**ตาราง 11 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มอายุ 15-59 ปี (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2559**

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค  | รวม    | ชาย    | หญิง     |
|-------|--|--------|--------|----------|
| 1     | โลหิตจางอื่น ๆ (D51-D64)   | 681.35 | 631.65 | 729.98   |
| 2     | ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) | 668.93 | 0.00   | 1,323.39 |
| 3     | เบ้าหวาน (E10-E14)   | 647.37 | 583.07 | 710.27   |
| 4     | ไตรวย (N17-N19)  | 454.03 | 510.68 | 398.61   |
| 5     | อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ                     | 277.82 | 221.87 | 332.56   |
| 6     | ปอดบวม (J12-J18)   | 232.03 | 280.74 | 184.38   |
| 7     | ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์(F10)                           | 222.75 | 410.10 | 39.46    |
| 8     | กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12)                             | 190.23 | 281.14 | 101.29   |
| 9     | โรคอื่น ๆ ของตับ (K71-K77)   | 188.67 | 274.22 | 104.97   |
| 10    | ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด(D65-D77)                                 | 185.19 | 233.40 | 138.02   |

หมายเหตุ : ลำดับ 2 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)

อัตราป่วยใช้ประชากรรวมเป็นตัวหาร

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพด้านหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลเข้ารักษาระ ครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

### สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สาเหตุการป่วยใน 2 ลำดับแรก เป็นสาเหตุการป่วยด้วยโรคเรื้อรังสำคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงไม่สาเหตุนำ และเบ้าหวาน ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุการป่วยที่พบรองลงมาคือ ไตรวย พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โลหิตจางอื่น ๆ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และปอดบวม พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตามลำดับ (ตาราง 12)

**ตาราง 12 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป<sup>1)</sup>  
(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ พ.ศ.2559**

| ลำดับ | กลุ่มโรค/รหัสกลุ่มโรค   | รวม      | ชาย      | หญิง      |
|-------|---|----------|----------|-----------|
| 1     | ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีเส้นทาง(I10)                                       | 9,610.75 | 9,059.38 | 10,054.03 |
| 2     | เบาหวาน (E10-E14)   | 5,627.00 | 4,677.94 | 6,390.03  |
| 3     | ไตวาย(N17-N19)  | 5,152.44 | 5,507.14 | 4,867.28  |
| 4     | โลหิตจางอื่น ๆ(D51-D64)   | 3,713.55 | 3,490.21 | 3,893.12  |
| 5     | ปอดบวม(J12-J18)   | 2,388.14 | 2,852.32 | 2,014.95  |
| 6     | โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้น<br>แบบเรื้อรังอื่น(J40-J44) | 2,144.81 | 3,552.02 | 1,013.45  |
| 7     | โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ(I20, I23-I25)                                      | 1,881.50 | 2,245.77 | 1,588.63  |
| 8     | ต้อกระยะและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ(H25-H28)                             | 1,788.70 | 1,658.95 | 1,893.01  |
| 9     | ความผิดปกติของการนำกระแสงไฟฟ้าหัวใจและหัว<br>ใจเต้นผิดจังหวะ(I44-I49)     | 1,734.97 | 1,814.42 | 1,671.10  |
| 10    | ตาบอดและสายตาเลือนลาง(H54)  | 1,727.33 | 1,594.01 | 1,834.52  |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองการสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

## ภาพรวมของสถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก

เมื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยใน ตามสิทธิการรักษาดังนี้ ๆ และเฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยจากสาเหตุภายนอก สามารถจำแนกได้มากกว่าระบบรายงาน เช่น สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ เพศ กลุ่มอายุ ค่าใช้จ่าย วันนอนเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยใน พ.ศ. 2559 ไม่รวมข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิการรักษาประกันสังคม ซึ่งในปีนี้ผู้ป่วยในบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกเพิ่มจาก พ.ศ. 2558 จาก อัตรา 707.09 เป็น 733.28 เพศชาย อัตรา 922.86 เพิ่มขึ้นเป็น 949.89 เพศหญิง อัตรา 498.90 เพิ่มขึ้นเป็น 524.68 ต่อประชากร 100,000 คน (ภาพ 7)

**ภาพที่ 7 อัตราป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2555 - 2559**




รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

**ภาพ 8 อัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามภาคและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559**



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก ภาพรวมทั้งประเทศ เมื่อนำมาจัดลำดับ 10 ลำดับแรก พ.ศ. 2559 สาเหตุของการป่วย ที่พบสูงที่สุดคือ การพลัดตกหล่ม, บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิตและผู้ช่วยรถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการชนส่ง (ตาราง 13) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอายุ พบว่า อัตราการป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 1,153.30 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตรา 781.84 กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี อัตรา 781.68 กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี อัตรา 654.72 กลุ่มอายุ 5-14 ปี อัตรา 645.79 และกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี อัตรา 450.48 ตามลำดับ (ภาพ 9)

**ตาราง 13 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก พ.ศ.2559**


| ลำดับ | รหัสกลุ่มโรค/ กลุ่มโรค  | รวม    |
|-------|---|--------|
| 1     | Falls<br>การพลัดตกหล่ม( W00 - W19 )   | 182.36 |
| 2     | Exposure to inanimate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต(W20 - W49)  | 117.97 |
| 3     | Motorcycle rider injured in transport accident<br>คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการชนส่ง(V20 - V29)   | 96.24  |
| 4     | Contact with venomous animals and plants<br>สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20 - X29)   | 49.32  |
| 5     | Assault<br>การถูกทำร้าย (X85 - Y09)   | 47.07  |
| 6     | Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure<br>วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย(Y83 - Y84) | 39.50  |
| 7     | Exposure to animate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50 - W64)   | 34.23  |
| 8     | Accidental poisoning by and exposure to noxious substances<br>การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40 - X49)  | 26.63  |
| 9     | Intentional self-harm<br>การทำร้ายตัวเอง (X60 - X84)  | 24.93  |
| 10    | Accidental exposure to other and unspecified factors<br>ภัยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยบังเอิญ(X58 - X59)  | 24.45  |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพผู้ด้อยหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

**ภาพ 9 อัตราป่วยการของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอกจำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2559**



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

**สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ แรกเกิด – 14 ปี**

สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยสำคัญในกลุ่มอายุนี้ ได้แก่ การพลัดตกหล่ม บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และสัมผัสกับสัตว์หรือพืชเมล็ด เมื่อเทียบในกลุ่มอายุ พบร่วมกับ การพลัดตกหล่ม เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุและสูงสุดในกลุ่มอายุ 1-4 ปี โดยการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก ในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ได้แก่ การพลัดตกหล่ม สาเหตุรองลงมา คือ การถูกความร้อนและสารร้อน ในกลุ่มอายุ 1-4 ปี การป่วยจากสาเหตุภายนอก ได้แก่ การพลัดตกหล่ม เช่นกัน สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี ได้แก่ การพลัดตกหล่ม สาเหตุรองลงมา คือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต (ตารางที่ 14)

**ตาราง 14 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี พ.ศ. 2559**

| ลำดับ | รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค  | < 1 ปี | 1 - 4 ปี | 5 - 14 ปี | แรกเกิด- 14 ปี |
|-------|--|--------|----------|-----------|----------------|
| 1     | Falls<br>การพลัดตกหล่น(W00 - W19)  | 130.03 | 225.31   | 192.00    | 197.07         |
| 2     | Exposure to inanimate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกล้าที่ไม่มีชีวิต(W20 - W49)   | 33.10  | 145.99   | 104.88    | 111.41         |
| 3     | Contact with venomous animals and plants<br>สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20 - X29)  | 21.92  | 52.61    | 62.13     | 57.32          |
| 4     | Accidental poisoning by and exposure to<br>noxious substances<br>การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40 - X49)  | 45.33  | 90.16    | 33.31     | 48.79          |
| 5     | Motorcycle rider injured in transport accident<br>คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการชนส่ง(V20 - V29)  | 9.54   | 17.35    | 63.59     | 48.43          |
| 6     | Exposure to animate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50 -W64)   | 11.33  | 47.82    | 42.01     | 41.74          |
| 7     | Pedal cyclist injured in transport accident<br>ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการชนส่ง(V10 - V19)  | 0.89   | 22.83    | 34.44     | 29.48          |
| 8     | Contact with heat and hot substances<br>การถูกความร้อนและสารร้อน(X10 - X19)  | 73.51  | 51.11    | 5.66      | 21.41          |
| 9     | Accidental exposure to other and unspecified<br>factors<br>ภัยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยบังเอิญ(X58 - X59)  | 17.45  | 22.23    | 18.30     | 19.27          |
| 10    | Surgical and other medical procedures as the<br>cause of abnormal reaction of the patient, or<br>of later complication, without mention of<br>misadventure at the time of the procedure<br>วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้<br>เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย(Y83 - Y84) | 26.10  | 13.99    | 13.04     | 14.04          |

รวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลชั้นนำ การมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยสำนักงานกองกลางสำนักบริการสุขภาพ (สกส.)

## สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

กลุ่มอายุ 15-59 ปี เป็นกลุ่มวัยทำงาน สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ในกลุ่มอายุนี้ ได้แก่ ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการชนส่ง รองลงมา คือ สาเหตุจากการบาดเจ็บจากการถูก วัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิตและการพลัดตกหล่ม (ตาราง 15) ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบร่วมกัน สาเหตุภายนอกที่สำคัญลำดับแรก ได้แก่ การพลัดตกหล่ม รองลงมา สาเหตุจากการบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และวิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย (ตารางที่ 16)

### ตารางที่ 15 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คนจากสาเหตุภายนอกกลุ่มอายุ 15-59 ปี พ.ศ.2559

| ลำดับ | รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค  | จำนวน  | อัตรา  |
|-------|--|--------|--------|
| 1     | Motorcycle rider injured in transport accident<br>คนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการชนส่ง(V20-V29)  | 51,015 | 117.14 |
| 2     | Exposure to inanimate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต(W20-W49)   | 49,680 | 114.08 |
| 3     | Falls<br>การพลัดตกหล่ม(W00-W19)  | 48,471 | 111.30 |
| 4     | Assault<br>การถูกทำร้าย(X85-Y09)   | 27,181 | 62.42  |
| 5     | Contact with venomous animals and plants<br>สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20-X29)  | 19,471 | 44.71  |
| 6     | Intentional self-harm<br>การทำร้ายตัวเอง(X60-X84)  | 14,061 | 32.29  |
| 7     | Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure<br>วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย | 13,875 | 31.86  |
| 8     | Exposure to animate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50-W64)  | 12,378 | 28.42  |
| 9     | Accidental poisoning by and exposure to noxious substances<br>การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40-X49)   | 8,849  | 20.32  |
| 10    | Accidental exposure to other and unspecified factors<br>ภัยนตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยบังเอิญ(Y10-Y34)  | 8,045  | 18.47  |

รวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

**ตาราง 16 10 ลำดับแรกอัตราการป่วยของผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุ  
ภายนอกกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2558**

| ลำดับ | รหัสกลุ่มโรค/กลุ่มโรค   | จำนวน  | อัตรา  |
|-------|---|--------|--------|
| 1     | Falls<br>การพลัดตกหล่น(W00-W19)   | 47,282 | 477.91 |
| 2     | Exposure to inanimate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต(W20-W49)  | 14,122 | 142.74 |
| 3     | Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure<br>วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย(Y83-Y84) | 10,178 | 102.88 |
| 4     | Contact with venomous animals and plants<br>สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ(X20-X29)   | 5,962  | 60.26  |
| 5     | Motorcycle rider injured in transport accident<br>คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการชนส่ง(V20-V29)   | 5,949  | 60.13  |
| 6     | Accidental exposure to other and unspecified factors<br>ภัยันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยบังเอิญ(X58-X59)  | 5,623  | 56.84  |
| 7     | Exposure to animate mechanical forces<br>บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต(W50-W64)   | 5,048  | 51.02  |
| 8     | Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use<br>ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแพรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา(Y40-Y59)  | 3,054  | 30.87  |
| 9     | Accidental poisoning by and exposure to noxious substances<br>การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ(X40-X49)  | 2,815  | 28.45  |
| 10    | Assault<br>การถูกทำร้าย(X85-Y09)  | 1,861  | 18.81  |


รวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพ全民 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

## ภาพ 10 สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559

■ รวม ■ อื่นๆ ■ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ■ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า



รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

ภาพ 10 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในระดับ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ตามลำดับ โดยที่ผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มีสัดส่วนการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลรัฐสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและโรงพยาบาลรัฐอื่น มากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิอื่นๆ

**ตาราง 17 จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559**

| ประเภทโรงพยาบาล                                    | รวม         | หลักประกันสุขภาพ<br>ถ้วนหน้า | สวัสดิการ<br>รักษาพยาบาล<br>ข้าราชการ | อื่นๆ       |
|--|-------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b> |             |                              |                                       |             |
| โรงพยาบาลศูนย์                                     | 5.08        | 4.96                         | 5.97                                  | 6.12        |
| โรงพยาบาลทั่วไป                                    | 4.47        | 4.36                         | 5.62                                  | 5.04        |
| โรงพยาบาลชุมชน                                     | 3.09        | 3.08                         | 3.54                                  | 3.67        |
| โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ               | 11.76       | 13.20                        | 9.73                                  | 7.76        |
| โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                   | 6.63        | 6.60                         | 6.74                                  | 7.59        |
| โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ                                 | 6.71        | 6.76                         | 7.43                                  | 7.25        |
| โรงพยาบาลเอกชน                                     | 3.49        | 3.19                         | 16.46                                 | 5.12        |
| <b>รวม</b>   | <b>4.38</b> | <b>4.22</b>                  | <b>5.78</b>                           | <b>5.56</b> |

ตาราง 17 จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน รวมเฉลี่ย 4.38 วัน สิทธิการรักษาสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ มีจำนวนวันเฉลี่ย สูงสุด 5.78 วัน และเฉลี่ยวันนอนผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4.22 วัน เปรียบเทียบกับ วันนอนเฉลี่ย แยกตามประเภทโรงพยาบาล พบร่วมโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอื่นๆ มีวันนอนเฉลี่ยสูงสุด 6.71 วัน รองลงมาคือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6.63 วัน โรงพยาบาลศูนย์ 5.08 วัน โรงพยาบาลทั่วไป 4.47 วัน และโรงพยาบาลชุมชน 3.09 วัน ตามลำดับ

**ตาราง 18 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ.2559**

| ประเภทโรงพยาบาล                                    | รวม         | หลักประกันสุขภาพ<br>ถ้วนหน้า | สวัสดิการ<br>รักษาพยาบาล<br>ข้าราชการ | อื่นๆ       |
|--|-------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b> |             |                              |                                       |             |
| โรงพยาบาลศูนย์                                     | 3.18        | 3.24                         | 3.55                                  | 3.25        |
| โรงพยาบาลทั่วไป                                    | 2.86        | 2.89                         | 3.30                                  | 3.13        |
| โรงพยาบาลชุมชน                                     | 2.45        | 2.48                         | 2.89                                  | 3.02        |
| โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ               | 3.00        | 3.01                         | 3.43                                  | 3.11        |
| โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษา                        | 4.09        | 4.02                         | 4.34                                  | 3.85        |
| โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ                                 | 3.47        | 3.53                         | 3.86                                  | 3.54        |
| โรงพยาบาลเอกชน                                     | 2.69        | 2.65                         | 3.17                                  | 3.33        |
| <b>รวม</b>   | <b>2.83</b> | <b>2.82</b>                  | <b>3.49</b>                           | <b>3.28</b> |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองสหกรณ์บริการสุขภาพ (สกส.)

จากตาราง 18 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 2.82 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่ากับ 3.49 ส่วนสิทธิการรักษาอื่น ๆ เท่ากับ 3.28

ตาราง 19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2559

| ประเภทโรงพยาบาล                                    | รวม              | หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ | อื่นๆ            |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b> |                  |                          |                               |                  |
| โรงพยาบาลศูนย์                                     | 22,410.51        | 22,876.01                | 30,195.87                     | 22,763.76        |
| โรงพยาบาลทั่วไป                                    | 14,440.24        | 14,720.97                | 20,311.01                     | 13,941.51        |
| โรงพยาบาลชุมชน                                     | 5,638.67         | 5,638.41                 | 8,148.96                      | 8,215.27         |
| โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ               | 30,439.76        | 29,981.89                | 42,235.21                     | 35,544.17        |
| โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษา                        | 64,119.27        | 55,303.05                | 67,343.86                     | 429,157.13       |
| โรงพยาบาลรัฐ อื่นๆ                                 | 32,139.37        | 29,167.12                | 44,928.50                     | 34,501.48        |
| โรงพยาบาลเอกชน                                     | 44,438.41        | 39,842.15                | 74,409.49                     | 82,254.54        |
| <b>รวม</b>   | <b>16,714.13</b> | <b>15,046.06</b>         | <b>30,553.62</b>              | <b>63,276.74</b> |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองบุคลากรตัวรับและแผนงาน

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานคลังสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

จากตาราง 19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาลคือ 16,714.13 บาท โดยสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งการนอนโรงพยาบาล คือ 30,553.62 บาท สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 15,046.06 บาท และสิทธิการรักษาอื่นๆ 63,276.74 บาท และจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการนอนโรงพยาบาล 55,527.18 บาท โรงพยาบาลเอกชน 44,438.41 บาท โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ 32,139.37 บาท โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ 30,218.97 บาทโรงพยาบาลศูนย์ 22,410.51 บาท โรงพยาบาลทั่วไป 14,440.24 บาท และโรงพยาบาลชุมชน 5,638.67 บาท ตามลำดับ

# ผู้ป่วยใน

(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย

เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2559

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)        | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |           | เหนือ     |           | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |           | ใต้       |           | ตะวันออกเฉียงเหนือ |           | กรุงเทพฯ  |           |
|------------------|-------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                  |                                     |      | จำนวน         | อัตรา     | จำนวน     | อัตรา     | จำนวน                 | อัตรา     | จำนวน     | อัตรา     | จำนวน              | อัตรา     | จำนวน     | อัตรา     |
| รวมทุกกลุ่มโรค   |                                     | รวม  | 19,740,850    | 30,364.23 | 3,794,354 | 32,518.48 | 4,648,037             | 28,016.61 | 2,786,289 | 30,074.56 | 6,695,913          | 30,586.92 | 1,816,257 | 32,439.69 |
|                  |                                     | ชาย  | 9,356,225     | 29,334.94 | 1,836,363 | 32,049.61 | 2,169,661             | 26,912.00 | 1,260,287 | 27,611.08 | 3,206,981          | 29,426.89 | 882,933   | 33,442.98 |
|                  |                                     | หญิง | 10,384,625    | 31,355.48 | 1,957,991 | 32,970.87 | 2,478,376             | 29,060.83 | 1,526,002 | 32,466.88 | 3,488,932          | 31,736.91 | 933,324   | 31,544.45 |
| 001              | Cholera (A00)                       | รวม  | 142           | 0.22      | 17        | 0.15      | 34                    | 0.20      | 30        | 0.32      | 44                 | 0.20      | 17        | 0.30      |
|                  | อหิวาตกโรค                          | ชาย  | 81            | 0.25      | 10        | 0.17      | 20                    | 0.25      | 19        | 0.42      | 24                 | 0.22      | 8         | 0.30      |
|                  |                                     | หญิง | 61            | 0.18      | 7         | 0.12      | 14                    | 0.16      | 11        | 0.23      | 20                 | 0.18      | 9         | 0.30      |
| 002              | Typhoid and paratyphoid fever (A01) | รวม  | 4,169         | 6.41      | 318       | 2.73      | 198                   | 1.19      | 3,080     | 33.24     | 544                | 2.48      | 29        | 0.52      |
|                  |                                     | ชาย  | 2,199         | 6.89      | 180       | 3.14      | 113                   | 1.40      | 1,595     | 34.94     | 293                | 2.69      | 18        | 0.68      |
|                  |                                     | หญิง | 1,970         | 5.95      | 138       | 2.32      | 85                    | 1.00      | 1,485     | 31.59     | 251                | 2.28      | 11        | 0.37      |
| 003              | Shigellosis (A03)                   | รวม  | 181           | 0.28      | 29        | 0.25      | 45                    | 0.27      | 29        | 0.31      | 61                 | 0.28      | 17        | 0.30      |
|                  | โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา               | ชาย  | 90            | 0.28      | 16        | 0.28      | 20                    | 0.25      | 16        | 0.35      | 30                 | 0.28      | 8         | 0.30      |
|                  |                                     | หญิง | 91            | 0.27      | 13        | 0.22      | 25                    | 0.29      | 13        | 0.28      | 31                 | 0.28      | 9         | 0.30      |
| 004              | Amoebiasis (A06)                    | รวม  | 3,730         | 5.74      | 1,120     | 9.60      | 508                   | 3.06      | 1,168     | 12.61     | 902                | 4.12      | 32        | 0.57      |
|                  |                                     | ชาย  | 1,678         | 5.26      | 496       | 8.66      | 245                   | 3.04      | 521       | 11.41     | 395                | 3.62      | 21        | 0.80      |
|                  |                                     | หญิง | 2,052         | 6.20      | 624       | 10.51     | 263                   | 3.08      | 647       | 13.77     | 507                | 4.61      | 11        | 0.37      |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการริบินจัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยน้ำหนักจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายໂຄ

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยนับซึ่งจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)                      | เพศ  | พื้นประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 010              | Brucellosis (A23)<br>โรคติดเชื้อบรูเชลล่า         | รวม  | 14         | 0.02  | 4     | 0.03  | 1                     | 0.01  | 2     | 0.02  | 1                  | 0.00  | 6        | 0.11  |
|                  |   | ชาย  | 10         | 0.03  | 3     | 0.05  | 1                     | 0.01  | 1     | 0.02  | 1                  | 0.01  | 4        | 0.15  |
|                  |   | หญิง | 4          | 0.01  | 1     | 0.02  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.02  | 0                  | 0.00  | 2        | 0.07  |
| 011              | Leprosy (A30)<br>โรคเรือน                         | รวม  | 436        | 0.67  | 60    | 0.51  | 128                   | 0.77  | 65    | 0.70  | 167                | 0.76  | 16       | 0.29  |
|                  |   | ชาย  | 264        | 0.83  | 36    | 0.63  | 83                    | 1.03  | 41    | 0.90  | 95                 | 0.87  | 9        | 0.34  |
|                  |   | หญิง | 172        | 0.52  | 24    | 0.40  | 45                    | 0.53  | 24    | 0.51  | 72                 | 0.65  | 7        | 0.24  |
| 012              | Tetanus neonatorum (A33)<br>บาดทะยักในเด็กแรกเกิด | รวม  | 1          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 1          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 013              | Other tetanus (A34-A35)<br>บาดทะยักอื่น ๆ         | รวม  | 231        | 0.36  | 66    | 0.57  | 46                    | 0.28  | 16    | 0.17  | 94                 | 0.43  | 9        | 0.16  |
|                  |   | ชาย  | 148        | 0.46  | 41    | 0.72  | 35                    | 0.43  | 11    | 0.24  | 54                 | 0.50  | 7        | 0.27  |
|                  |   | หญิง | 83         | 0.25  | 25    | 0.42  | 11                    | 0.13  | 5     | 0.11  | 40                 | 0.36  | 2        | 0.07  |
| 014              | Diphtheria (A36)<br>โรคคอตีบ                      | รวม  | 66         | 0.10  | 14    | 0.12  | 13                    | 0.08  | 17    | 0.18  | 20                 | 0.09  | 2        | 0.04  |
|                  |   | ชาย  | 32         | 0.10  | 10    | 0.17  | 6                     | 0.07  | 10    | 0.22  | 5                  | 0.05  | 1        | 0.04  |
|                  |   | หญิง | 34         | 0.10  | 4     | 0.07  | 7                     | 0.08  | 7     | 0.15  | 15                 | 0.14  | 1        | 0.03  |
| 015              | Whooping cough (A37)<br>โรคไอกรน                  | รวม  | 76         | 0.12  | 6     | 0.05  | 15                    | 0.09  | 28    | 0.30  | 18                 | 0.08  | 9        | 0.16  |
|                  |   | ชาย  | 31         | 0.10  | 3     | 0.05  | 7                     | 0.09  | 9     | 0.20  | 8                  | 0.07  | 4        | 0.15  |
|                  |   | หญิง | 45         | 0.14  | 3     | 0.05  | 8                     | 0.09  | 19    | 0.40  | 10                 | 0.09  | 5        | 0.17  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยนับซึ่งแบ่งโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 016              | Meningococcal infection (A39)<br>การติดเชื้อเมนingoคอกอคคัส                                  | รวม  | 109        | 0.17   | 15     | 0.13   | 28                    | 0.17   | 25     | 0.27   | 33                 | 0.15   | 8        | 0.14   |
|                  |  | ชาย  | 65         | 0.20   | 10     | 0.17   | 17                    | 0.21   | 11     | 0.24   | 22                 | 0.20   | 5        | 0.19   |
|                  |  | หญิง | 44         | 0.13   | 5      | 0.08   | 11                    | 0.13   | 14     | 0.30   | 11                 | 0.10   | 3        | 0.10   |
| 017              | Septicemia (A40-A41)<br>โลหิตเป็นพิษ   | รวม  | 140,825    | 216.61 | 27,712 | 237.50 | 35,723                | 215.32 | 17,051 | 184.04 | 47,456             | 216.78 | 12,883   | 230.10 |
|                  |  | ชาย  | 72,113     | 226.10 | 14,631 | 255.35 | 17,133                | 212.51 | 8,804  | 192.88 | 25,143             | 230.71 | 6,402    | 242.49 |
|                  |  | หญิง | 68,712     | 207.47 | 13,081 | 220.27 | 18,590                | 217.98 | 8,247  | 175.46 | 22,313             | 202.97 | 6,481    | 219.04 |
| 018              | Other bacterial diseases ( A21-A22, A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49 )<br>โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ | รวม  | 58,920     | 90.63  | 7,918  | 67.86  | 7,014                 | 42.28  | 11,348 | 122.49 | 31,469             | 143.75 | 1,171    | 20.91  |
|                  |  | ชาย  | 33,754     | 105.83 | 4,517  | 78.83  | 3,776                 | 46.84  | 6,394  | 140.08 | 18,438             | 169.18 | 629      | 23.82  |
|                  |  | หญิง | 25,166     | 75.99  | 3,401  | 57.27  | 3,238                 | 37.97  | 4,954  | 105.40 | 13,031             | 118.54 | 542      | 18.32  |
| 019              | Congenital syphilis (A50)<br>ชิพลิสแต่กำเนิด   | รวม  | 590        | 0.91   | 60     | 0.51   | 212                   | 1.28   | 30     | 0.32   | 121                | 0.55   | 167      | 2.98   |
|                  |  | ชาย  | 327        | 1.03   | 30     | 0.52   | 111                   | 1.38   | 17     | 0.37   | 76                 | 0.70   | 93       | 3.52   |
|                  |  | หญิง | 263        | 0.79   | 30     | 0.51   | 101                   | 1.18   | 13     | 0.28   | 45                 | 0.41   | 74       | 2.50   |
| 020              | Early syphilis (A51)<br>ชิพลิสระยะเริ่ม  | รวม  | 221        | 0.34   | 36     | 0.31   | 45                    | 0.27   | 24     | 0.26   | 89                 | 0.41   | 27       | 0.48   |
|                  |  | ชาย  | 148        | 0.46   | 25     | 0.44   | 30                    | 0.37   | 16     | 0.35   | 61                 | 0.56   | 16       | 0.61   |
|                  |  | หญิง | 73         | 0.22   | 11     | 0.19   | 15                    | 0.18   | 8      | 0.17   | 28                 | 0.25   | 11       | 0.37   |
| 021              | Other syphilis (A52-A53)<br>ชิพลิสวิ่ง ๆ   | รวม  | 2,376      | 3.65   | 294    | 2.52   | 508                   | 3.06   | 318    | 3.43   | 927                | 4.23   | 329      | 5.88   |
|                  |  | ชาย  | 1,289      | 4.04   | 166    | 2.90   | 274                   | 3.40   | 170    | 3.72   | 552                | 5.07   | 127      | 4.81   |
|                  |  | หญิง | 1,087      | 3.28   | 128    | 2.16   | 234                   | 2.74   | 148    | 3.15   | 375                | 3.41   | 202      | 6.83   |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 022              | Gonococcal infection (A54)<br>การติดเชื้อหนองใน   | รวม  | 405        | 0.62  | 65    | 0.56  | 120                   | 0.72  | 30    | 0.32  | 163                | 0.74  | 27       | 0.48  |
|                  |   | ชาย  | 275        | 0.86  | 51    | 0.89  | 82                    | 1.02  | 16    | 0.35  | 118                | 1.08  | 8        | 0.30  |
|                  |   | หญิง | 130        | 0.39  | 14    | 0.24  | 38                    | 0.45  | 14    | 0.30  | 45                 | 0.41  | 19       | 0.64  |
| 023              | Sexually transmitted<br>chlamydial diseases<br>(A55-A56)  | รวม  | 44         | 0.07  | 11    | 0.09  | 8                     | 0.05  | 13    | 0.14  | 7                  | 0.03  | 5        | 0.09  |
|                  |   | ชาย  | 28         | 0.09  | 6     | 0.10  | 4                     | 0.05  | 12    | 0.26  | 5                  | 0.05  | 1        | 0.04  |
|                  |   | หญิง | 16         | 0.05  | 5     | 0.08  | 4                     | 0.05  | 1     | 0.02  | 2                  | 0.02  | 4        | 0.14  |
| 024              | Other infections with a<br>predominantly sexual mode<br>of transmission (A57-A64)<br>โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทาง<br>เพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก | รวม  | 2,622      | 4.03  | 499   | 4.28  | 714                   | 4.30  | 253   | 2.73  | 842                | 3.85  | 314      | 5.61  |
|                  |   | ชาย  | 684        | 2.14  | 151   | 2.64  | 164                   | 2.03  | 55    | 1.20  | 226                | 2.07  | 88       | 3.33  |
|                  |   | หญิง | 1,938      | 5.85  | 348   | 5.86  | 550                   | 6.45  | 198   | 4.21  | 616                | 5.60  | 226      | 7.64  |
| 025              | Relapsing fever (A68)<br>โรคไข้กลับซ้ำ  | รวม  | 5          | 0.01  | 1     | 0.01  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.01  | 3                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 3          | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.02  | 2                  | 0.02  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 2          | 0.01  | 1     | 0.02  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
| 026              | Trachoma (A71)<br>ริดสีดวงตา  | รวม  | 4          | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.01  | 3                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 2          | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.02  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 2          | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 2                  | 0.02  | 0        | 0.00  |
| 027              | Typhus fever (A75)<br>ไข้รากสาดใหญ่   | รวม  | 11,548     | 17.76 | 4,107 | 35.20 | 713                   | 4.30  | 3,076 | 33.20 | 3,566              | 16.29 | 86       | 1.54  |
|                  |   | ชาย  | 6,431      | 20.16 | 2,285 | 39.88 | 402                   | 4.99  | 1,783 | 39.06 | 1,915              | 17.57 | 46       | 1.74  |
|                  |   | หญิง | 5,117      | 15.45 | 1,822 | 30.68 | 311                   | 3.65  | 1,293 | 27.51 | 1,651              | 15.02 | 40       | 1.35  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 028              | Acute poliomyelitis (A80)<br>โรคโปลีโอเฉียบพลัน   | รวม  | 268        | 0.41   | 52     | 0.45   | 75                    | 0.45  | 26     | 0.28   | 69                 | 0.32   | 46       | 0.82  |
|                  |   | ชาย  | 135        | 0.42   | 29     | 0.51   | 29                    | 0.36  | 14     | 0.31   | 41                 | 0.38   | 22       | 0.83  |
|                  |   | หญิง | 133        | 0.40   | 23     | 0.39   | 46                    | 0.54  | 12     | 0.26   | 28                 | 0.25   | 24       | 0.81  |
| 029              | Rabies (A82)<br>โรคพิษสุนัขบ้า  | รวม  | 12         | 0.02   | 2      | 0.02   | 4                     | 0.02  | 3      | 0.03   | 2                  | 0.01   | 1        | 0.02  |
|                  |   | ชาย  | 9          | 0.03   | 1      | 0.02   | 3                     | 0.04  | 2      | 0.04   | 2                  | 0.02   | 1        | 0.04  |
|                  |   | หญิง | 3          | 0.01   | 1      | 0.02   | 1                     | 0.01  | 1      | 0.02   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00  |
| 030              | Viral encephalitis (A83-A86)<br>สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส   | รวม  | 796        | 1.22   | 128    | 1.10   | 177                   | 1.07  | 101    | 1.09   | 308                | 1.41   | 82       | 1.46  |
|                  |   | ชาย  | 441        | 1.38   | 78     | 1.36   | 84                    | 1.04  | 57     | 1.25   | 180                | 1.65   | 42       | 1.59  |
|                  |   | หญิง | 355        | 1.07   | 50     | 0.84   | 93                    | 1.09  | 44     | 0.94   | 128                | 1.16   | 40       | 1.35  |
| 031              | Yellow fever (A95)<br>ไข้เหลือง   | รวม  | 8          | 0.01   | 2      | 0.02   | 0                     | 0.00  | 4      | 0.04   | 1                  | 0.00   | 1        | 0.02  |
|                  |   | ชาย  | 3          | 0.01   | 1      | 0.02   | 0                     | 0.00  | 1      | 0.02   | 0                  | 0.00   | 1        | 0.04  |
|                  |   | หญิง | 5          | 0.02   | 1      | 0.02   | 0                     | 0.00  | 3      | 0.06   | 1                  | 0.01   | 0        | 0.00  |
| 032              | Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99)<br>ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ | รวม  | 105,126    | 161.70 | 12,069 | 103.43 | 13,919                | 83.90 | 48,425 | 522.69 | 27,475             | 125.51 | 3,238    | 57.83 |
|                  |   | ชาย  | 52,682     | 165.18 | 5,936  | 103.60 | 7,182                 | 89.08 | 23,831 | 522.10 | 14,009             | 128.54 | 1,724    | 65.30 |
|                  |   | หญิง | 52,444     | 158.35 | 6,133  | 103.27 | 6,737                 | 79.00 | 24,594 | 523.26 | 13,466             | 122.49 | 1,514    | 51.17 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)                                       | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 033              | Herpesviral infection (B00)  | รวม  | 5,900         | 9.08   | 1,301  | 11.15  | 1,275                 | 7.69  | 526   | 5.68  | 2,105              | 9.62   | 693      | 12.38  |
|                  |  | ชาย  | 2,702         | 8.47   | 612    | 10.68  | 582                   | 7.22  | 213   | 4.67  | 994                | 9.12   | 301      | 11.40  |
|                  |  | หญิง | 3,198         | 9.66   | 689    | 11.60  | 693                   | 8.13  | 313   | 6.66  | 1,111              | 10.11  | 392      | 13.25  |
| 034              | Varicella and zoster (B01-B02)                                     | รวม  | 10,594        | 16.30  | 2,019  | 17.30  | 2,302                 | 13.88 | 1,618 | 17.46 | 3,844              | 17.56  | 811      | 14.49  |
|                  |  | ชาย  | 4,981         | 15.62  | 972    | 16.96  | 1,071                 | 13.28 | 779   | 17.07 | 1,789              | 16.42  | 370      | 14.01  |
|                  |  | หญิง | 5,613         | 16.95  | 1,047  | 17.63  | 1,231                 | 14.43 | 839   | 17.85 | 2,055              | 18.69  | 441      | 14.90  |
| 035              | Measles (B05)  | รวม  | 2,668         | 4.10   | 40     | 0.34   | 153                   | 0.92  | 2,265 | 24.45 | 111                | 0.51   | 99       | 1.77   |
|                  |  | ชาย  | 1,423         | 4.46   | 25     | 0.44   | 96                    | 1.19  | 1,181 | 25.87 | 69                 | 0.63   | 52       | 1.97   |
|                  |  | หญิง | 1,245         | 3.76   | 15     | 0.25   | 57                    | 0.67  | 1,084 | 23.06 | 42                 | 0.38   | 47       | 1.59   |
| 036              | Rubella (B06)  | รวม  | 45            | 0.07   | 7      | 0.06   | 11                    | 0.07  | 10    | 0.11  | 14                 | 0.06   | 3        | 0.05   |
|                  |  | ชาย  | 27            | 0.08   | 4      | 0.07   | 5                     | 0.06  | 6     | 0.13  | 10                 | 0.09   | 2        | 0.08   |
|                  |  | หญิง | 18            | 0.05   | 3      | 0.05   | 6                     | 0.07  | 4     | 0.09  | 4                  | 0.04   | 1        | 0.03   |
| 037              | Acute hepatitis B (B16)<br>ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี                | รวม  | 6,274         | 9.65   | 1,344  | 11.52  | 1,445                 | 8.71  | 609   | 6.57  | 2,515              | 11.49  | 361      | 6.45   |
|                  |  | ชาย  | 4,100         | 12.85  | 876    | 15.29  | 912                   | 11.31 | 404   | 8.85  | 1,681              | 15.42  | 227      | 8.60   |
|                  |  | หญิง | 2,174         | 6.56   | 468    | 7.88   | 533                   | 6.25  | 205   | 4.36  | 834                | 7.59   | 134      | 4.53   |
| 038              | Other viral hepatitis (B15,<br>B17-B19)<br>ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ | รวม  | 48,633        | 74.80  | 10,194 | 87.36  | 9,294                 | 56.02 | 4,269 | 46.08 | 16,804             | 76.76  | 8,072    | 144.17 |
|                  |  | ชาย  | 32,946        | 103.30 | 7,034  | 122.76 | 5,975                 | 74.11 | 2,845 | 62.33 | 11,561             | 106.08 | 5,531    | 209.50 |
|                  |  | หญิง | 15,687        | 47.37  | 3,160  | 53.21  | 3,319                 | 38.92 | 1,424 | 30.30 | 5,243              | 47.69  | 2,541    | 85.88  |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยน้ำหนักจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยนับซึ่งจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)                         | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 045              | Trypanosomiasis (B56-B57)<br>โรคทริปารอนโซเม         | รวม  | 36            | 0.06  | 5     | 0.04  | 8                     | 0.05  | 8     | 0.09  | 11                 | 0.05  | 4        | 0.07  |
|                  |  | ชาย  | 14            | 0.04  | 2     | 0.03  | 5                     | 0.06  | 4     | 0.09  | 3                  | 0.03  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 22            | 0.07  | 3     | 0.05  | 3                     | 0.04  | 4     | 0.09  | 8                  | 0.07  | 4        | 0.14  |
| 046              | Schistosomiasis (B65)<br>โรคติดเชื้อชีสโตโซเม        | รวม  | 12            | 0.02  | 1     | 0.01  | 1                     | 0.01  | 3     | 0.03  | 6                  | 0.03  | 1        | 0.02  |
|                  |  | ชาย  | 9             | 0.03  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 3     | 0.07  | 5                  | 0.05  | 1        | 0.04  |
|                  |  | หญิง | 3             | 0.01  | 1     | 0.02  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
| 047              | Other fluke infections (B66)<br>โรคพยาธิใบไม้ อื่น ๆ | รวม  | 713           | 1.10  | 183   | 1.57  | 20                    | 0.12  | 3     | 0.03  | 499                | 2.28  | 8        | 0.14  |
|                  |  | ชาย  | 405           | 1.27  | 94    | 1.64  | 14                    | 0.17  | 1     | 0.02  | 290                | 2.66  | 6        | 0.23  |
|                  |  | หญิง | 308           | 0.93  | 89    | 1.50  | 6                     | 0.07  | 2     | 0.04  | 209                | 1.90  | 2        | 0.07  |
| 048              | Echinococcosis (B67)<br>โรคพยาธิเอคโคโนคอคคัส        | รวม  | 17            | 0.03  | 5     | 0.04  | 1                     | 0.01  | 1     | 0.01  | 7                  | 0.03  | 3        | 0.05  |
|                  |  | ชาย  | 10            | 0.03  | 2     | 0.03  | 1                     | 0.01  | 1     | 0.02  | 4                  | 0.04  | 2        | 0.08  |
|                  |  | หญิง | 7             | 0.02  | 3     | 0.05  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 3                  | 0.03  | 1        | 0.03  |
| 049              | Dracunculiasis (B72)<br>โรคพยาธิดรากูลลัส            | รวม  | 1             | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 1             | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 0             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 050              | Onchocerciasis (B73)<br>โรคพยาธิອอนโคเซอร์ค่า        | รวม  | 2             | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 2             | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 051              | Filariasis (B74)<br>โรคพยาธิพิลาเรีย                                   | รวม  | 36            | 0.06  | 2     | 0.02  | 3                     | 0.02  | 19    | 0.21  | 7                  | 0.03  | 5        | 0.09  |
|                  |  | ชาย  | 24            | 0.08  | 1     | 0.02  | 2                     | 0.02  | 14    | 0.31  | 4                  | 0.04  | 3        | 0.11  |
|                  |  | หญิง | 12            | 0.04  | 1     | 0.02  | 1                     | 0.01  | 5     | 0.11  | 3                  | 0.03  | 2        | 0.07  |
| 052              | Hookworm diseases (B76)<br>โรคพยาธิปากขอ                               | รวม  | 499           | 0.77  | 50    | 0.43  | 62                    | 0.37  | 228   | 2.46  | 154                | 0.70  | 5        | 0.09  |
|                  |  | ชาย  | 254           | 0.80  | 22    | 0.38  | 34                    | 0.42  | 126   | 2.76  | 68                 | 0.62  | 4        | 0.15  |
|                  |  | หญิง | 245           | 0.74  | 28    | 0.47  | 28                    | 0.33  | 102   | 2.17  | 86                 | 0.78  | 1        | 0.03  |
| 053              | Other helminthiases<br>(B68-B71, B75, B77-B83)<br>โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ | รวม  | 7,968         | 12.26 | 2,138 | 18.32 | 674                   | 4.06  | 797   | 8.60  | 4,147              | 18.94 | 212      | 3.79  |
|                  |  | ชาย  | 5,194         | 16.28 | 1,455 | 25.39 | 424                   | 5.26  | 461   | 10.10 | 2,722              | 24.98 | 132      | 5.00  |
|                  |  | หญิง | 2,774         | 8.38  | 683   | 11.50 | 250                   | 2.93  | 336   | 7.15  | 1,425              | 12.96 | 80       | 2.70  |
| 054              | Sequelae of tuberculosis<br>(B90)<br>ผลตามหลังรักษาโรคริดเดน           | รวม  | 27,126        | 41.72 | 3,417 | 29.28 | 5,902                 | 35.58 | 3,431 | 37.03 | 12,333             | 56.34 | 2,043    | 36.49 |
|                  |  | ชาย  | 18,201        | 57.07 | 2,390 | 41.71 | 4,118                 | 51.08 | 2,463 | 53.96 | 7,815              | 71.71 | 1,415    | 53.60 |
|                  |  | หญิง | 8,925         | 26.95 | 1,027 | 17.29 | 1,784                 | 20.92 | 968   | 20.59 | 4,518              | 41.10 | 628      | 21.23 |
| 055              | Sequelae of poliomyelitis<br>(B91)<br>ผลตามหลังโรคโอลิโว               | รวม  | 79            | 0.12  | 19    | 0.16  | 19                    | 0.11  | 4     | 0.04  | 18                 | 0.08  | 19       | 0.34  |
|                  |  | ชาย  | 46            | 0.14  | 15    | 0.26  | 9                     | 0.11  | 4     | 0.09  | 10                 | 0.09  | 8        | 0.30  |
|                  |  | หญิง | 33            | 0.10  | 4     | 0.07  | 10                    | 0.12  | 0     | 0.00  | 8                  | 0.07  | 11       | 0.37  |
| 056              | Sequelae of leprosy (B92)<br>ผลตามหลังโรคเรือง                         | รวม  | 52            | 0.08  | 7     | 0.06  | 3                     | 0.02  | 4     | 0.04  | 37                 | 0.17  | 1        | 0.02  |
|                  |  | ชาย  | 30            | 0.09  | 1     | 0.02  | 2                     | 0.02  | 3     | 0.07  | 23                 | 0.21  | 1        | 0.04  |
|                  |  | หญิง | 22            | 0.07  | 6     | 0.10  | 1                     | 0.01  | 1     | 0.02  | 14                 | 0.13  | 0        | 0.00  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ  |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|-------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน  | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 057              | Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)<br>โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ | รวม  | 10,991     | 16.91 | 2,174  | 18.63 | 2,133                 | 12.86 | 2,755 | 29.74 | 3,183              | 14.54 | 746      | 13.32  |
|                  |   | ชาย  | 6,195      | 19.42 | 1,244  | 21.71 | 1,157                 | 14.35 | 1,599 | 35.03 | 1,829              | 16.78 | 366      | 13.86  |
|                  |   | หญิง | 4,796      | 14.48 | 930    | 15.66 | 976                   | 11.44 | 1,156 | 24.59 | 1,354              | 12.32 | 380      | 12.84  |
| 058              | Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)<br>เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย                          | รวม  | 24,293     | 37.37 | 3,782  | 32.41 | 6,040                 | 36.41 | 2,988 | 32.25 | 6,781              | 30.98 | 4,702    | 83.98  |
|                  |   | ชาย  | 17,487     | 54.83 | 2,677  | 46.72 | 4,670                 | 57.93 | 2,299 | 50.37 | 4,240              | 38.91 | 3,601    | 136.40 |
|                  |   | หญิง | 6,806      | 20.55 | 1,105  | 18.61 | 1,370                 | 16.06 | 689   | 14.66 | 2,541              | 23.11 | 1,101    | 37.21  |
| 059              | Malignant neoplasm of oesophagus (C15)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร  | รวม  | 9,641      | 14.83 | 1,441  | 12.35 | 3,284                 | 19.79 | 1,608 | 17.36 | 1,779              | 8.13  | 1,529    | 27.31  |
|                  |   | ชาย  | 8,448      | 26.49 | 1,228  | 21.43 | 2,870                 | 35.60 | 1,424 | 31.20 | 1,545              | 14.18 | 1,381    | 52.31  |
|                  |   | หญิง | 1,193      | 3.60  | 213    | 3.59  | 414                   | 4.85  | 184   | 3.91  | 234                | 2.13  | 148      | 5.00   |
| 060              | Malignant neoplasm of stomach (C16)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร  | รวม  | 11,270     | 17.33 | 2,921  | 25.03 | 2,304                 | 13.89 | 773   | 8.34  | 3,629              | 16.58 | 1,643    | 29.35  |
|                  |   | ชาย  | 6,305      | 19.77 | 1,571  | 27.42 | 1,278                 | 15.85 | 494   | 10.82 | 2,090              | 19.18 | 872      | 33.03  |
|                  |   | หญิง | 4,965      | 14.99 | 1,350  | 22.73 | 1,026                 | 12.03 | 279   | 5.94  | 1,539              | 14.00 | 771      | 26.06  |
| 061              | Malignant neoplasm of colon (C18)<br>เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่   | รวม  | 54,274     | 83.48 | 10,601 | 90.85 | 12,462                | 75.12 | 6,024 | 65.02 | 16,022             | 73.19 | 9,165    | 163.69 |
|                  |   | ชาย  | 27,855     | 87.33 | 5,363  | 93.60 | 6,357                 | 78.85 | 3,131 | 68.60 | 7,922              | 72.69 | 5,082    | 192.49 |
|                  |   | หญิง | 26,419     | 79.77 | 5,238  | 88.20 | 6,105                 | 71.59 | 2,893 | 61.55 | 8,100              | 73.68 | 4,083    | 138.00 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 062              | Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)<br>เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัม และซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก | รวม  | 37,664     | 57.93  | 7,797  | 66.82  | 6,957                 | 41.93 | 3,536 | 38.17 | 12,159             | 55.54  | 7,215    | 128.87 |
|                  |  | ชาย  | 21,838     | 68.47  | 4,543  | 79.29  | 4,130                 | 51.23 | 2,137 | 46.82 | 6,910              | 63.41  | 4,118    | 155.98 |
|                  |  | หญิง | 15,826     | 47.79  | 3,254  | 54.79  | 2,827                 | 33.15 | 1,399 | 29.76 | 5,249              | 47.75  | 3,097    | 104.67 |
| 063              | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ  | รวม  | 54,017     | 83.09  | 11,942 | 102.35 | 8,379                 | 50.51 | 3,531 | 38.11 | 22,507             | 102.81 | 7,658    | 136.78 |
|                  |  | ชาย  | 37,417     | 117.31 | 8,455  | 147.56 | 6,013                 | 74.58 | 2,461 | 53.92 | 15,104             | 138.59 | 5,384    | 203.93 |
|                  |  | หญิง | 16,600     | 50.12  | 3,487  | 58.72  | 2,366                 | 27.74 | 1,070 | 22.77 | 7,403              | 67.34  | 2,274    | 76.86  |
| 064              | Malignant neoplasm of pancreas (C25)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน   | รวม  | 5,404      | 8.31   | 1,214  | 10.40  | 1,317                 | 7.94  | 601   | 6.49  | 1,088              | 4.97   | 1,184    | 21.15  |
|                  |  | ชาย  | 2,737      | 8.58   | 575    | 10.04  | 678                   | 8.41  | 348   | 7.62  | 571                | 5.24   | 565      | 21.40  |
|                  |  | หญิง | 2,667      | 8.05   | 639    | 10.76  | 639                   | 7.49  | 253   | 5.38  | 517                | 4.70   | 619      | 20.92  |
| 065              | Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ  | รวม  | 6,913      | 10.63  | 1,281  | 10.98  | 1,027                 | 6.19  | 634   | 6.84  | 2,843              | 12.99  | 1,128    | 20.15  |
|                  |  | ชาย  | 3,513      | 11.01  | 641    | 11.19  | 443                   | 5.49  | 320   | 7.01  | 1,605              | 14.73  | 504      | 19.09  |
|                  |  | หญิง | 3,400      | 10.27  | 640    | 10.78  | 584                   | 6.85  | 314   | 6.68  | 1,238              | 11.26  | 624      | 21.09  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |       | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|-------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 066              | Malignant neoplasm of larynx (C32)<br>เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง  | รวม  | 5,096      | 7.84  | 776    | 6.65   | 1,509                 | 9.10  | 747   | 8.06  | 1,142              | 5.22  | 922      | 16.47  |
|                  |  | ชาย  | 4,715      | 14.78 | 705    | 12.30  | 1,402                 | 17.39 | 696   | 15.25 | 1,056              | 9.69  | 856      | 32.42  |
|                  |  | หญิง | 381        | 1.15  | 71     | 1.20   | 107                   | 1.25  | 51    | 1.09  | 86                 | 0.78  | 66       | 2.23   |
| 067              | Malignant neoplasm of trachea,<br>bronchus and lung (C33-C34)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด                                   | รวม  | 42,067     | 64.71 | 11,273 | 96.61  | 9,027                 | 54.41 | 4,597 | 49.62 | 11,672             | 53.32 | 5,498    | 98.20  |
|                  |  | ชาย  | 26,100     | 81.83 | 6,734  | 117.53 | 5,750                 | 71.32 | 2,963 | 64.92 | 7,337              | 67.32 | 3,316    | 125.60 |
|                  |  | หญิง | 15,967     | 48.21 | 4,539  | 76.43  | 3,277                 | 38.43 | 1,634 | 34.76 | 4,335              | 39.43 | 2,182    | 73.75  |
| 068              | Other malignant neoplasm of<br>respiratory and intrathoracic organs<br>(C30-C31, C37-C39)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะซ่องอก | รวม  | 2,616      | 4.02  | 470    | 4.03   | 499                   | 3.01  | 215   | 2.32  | 661                | 3.02  | 771      | 13.77  |
|                  |  | ชาย  | 1,717      | 5.38  | 311    | 5.43   | 348                   | 4.32  | 117   | 2.56  | 448                | 4.11  | 493      | 18.67  |
|                  |  | หญิง | 899        | 2.71  | 159    | 2.68   | 151                   | 1.77  | 98    | 2.09  | 213                | 1.94  | 278      | 9.40   |
| 069              | Malignant neoplasm of bone and<br>articular cartilage (C40-C41)<br>เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ                            | รวม  | 3,475      | 5.35  | 495    | 4.24   | 454                   | 2.74  | 361   | 3.90  | 1,163              | 5.31  | 1,002    | 17.90  |
|                  |  | ชาย  | 1,932      | 6.06  | 286    | 4.99   | 242                   | 3.00  | 194   | 4.25  | 664                | 6.09  | 546      | 20.68  |
|                  |  | หญิง | 1,543      | 4.66  | 209    | 3.52   | 212                   | 2.49  | 167   | 3.55  | 499                | 4.54  | 456      | 15.41  |
| 070              | Malignant melanoma of skin (C43)<br>เนื้องอกร้ายที่เมลานีมาของผิวหนัง  | รวม  | 786        | 1.21  | 156    | 1.34   | 151                   | 0.91  | 76    | 0.82  | 245                | 1.12  | 158      | 2.82   |
|                  |  | ชาย  | 411        | 1.29  | 75     | 1.31   | 79                    | 0.98  | 40    | 0.88  | 145                | 1.33  | 72       | 2.73   |
|                  |  | หญิง | 375        | 1.13  | 81     | 1.36   | 72                    | 0.84  | 36    | 0.77  | 100                | 0.91  | 86       | 2.91   |
| 071              | Other malignant neoplasm of skin<br>(C44)<br>เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ  | รวม  | 2,709      | 4.17  | 549    | 4.71   | 628                   | 3.79  | 273   | 2.95  | 802                | 3.66  | 457      | 8.16   |
|                  |  | ชาย  | 1,356      | 4.25  | 292    | 5.10   | 345                   | 4.28  | 129   | 2.83  | 381                | 3.50  | 209      | 7.92   |
|                  |  | หญิง | 1,353      | 4.09  | 257    | 4.33   | 283                   | 3.32  | 144   | 3.06  | 421                | 3.83  | 248      | 8.38   |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 072              | Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49)<br>เนื้องอกร้ายที่เมโสไซเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน            | รวม  | 5,217      | 8.02   | 993    | 8.51   | 799                   | 4.82   | 582   | 6.28  | 1,397              | 6.38   | 1,446    | 25.83  |
|                  |   | ชาย  | 2,333      | 7.31   | 404    | 7.05   | 313                   | 3.88   | 280   | 6.13  | 692                | 6.35   | 644      | 24.39  |
|                  |   | หญิง | 2,884      | 8.71   | 589    | 9.92   | 486                   | 5.70   | 302   | 6.43  | 705                | 6.41   | 802      | 27.11  |
| 073              | Malignant neoplasm of breast (C50)<br>เนื้องอกร้ายที่เต้านม   | รวม  | 43,801     | 67.37  | 10,701 | 91.71  | 9,221                 | 55.58  | 4,669 | 50.40 | 12,212             | 55.78  | 6,998    | 124.99 |
|                  |   | ชาย  | 385        | 1.21   | 59     | 1.03   | 81                    | 1.00   | 44    | 0.96  | 121                | 1.11   | 80       | 3.03   |
|                  |   | หญิง | 43,416     | 131.09 | 10,642 | 179.20 | 9,140                 | 107.17 | 4,625 | 98.40 | 12,091             | 109.99 | 6,918    | 233.81 |
| 074              | Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)<br>เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก   | รวม  | 24,147     | 72.91  | 4,982  | 83.89  | 6,152                 | 72.14  | 2,507 | 53.34 | 6,222              | 56.60  | 4,284    | 144.79 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 24,147     | 72.91  | 4,982  | 83.89  | 6,152                 | 72.14  | 2,507 | 53.34 | 6,222              | 56.60  | 4,284    | 144.79 |
| 075              | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุส่วนของมดลูก | รวม  | 10,292     | 31.08  | 1,660  | 27.95  | 1,882                 | 22.07  | 798   | 16.98 | 3,003              | 27.32  | 2,949    | 99.67  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 10,292     | 31.08  | 1,660  | 27.95  | 1,882                 | 22.07  | 798   | 16.98 | 3,003              | 27.32  | 2,949    | 99.67  |
| 076              | Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง            | รวม  | 19,704     | 59.49  | 3,003  | 50.57  | 3,183                 | 37.32  | 1,496 | 31.83 | 6,567              | 59.74  | 5,455    | 184.37 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 19,704     | 59.49  | 3,003  | 50.57  | 3,183                 | 37.32  | 1,496 | 31.83 | 6,567              | 59.74  | 5,455    | 184.37 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 077              | Malignant neoplasm of prostate<br>(C61)<br>เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก                                | รวม  | 9,934         | 31.15 | 1,885 | 32.90 | 2,226                 | 27.61 | 1,352 | 29.62 | 2,265              | 20.78 | 2,206    | 83.56 |
|                  |  | ชาย  | 9,934         | 31.15 | 1,885 | 32.90 | 2,226                 | 27.61 | 1,352 | 29.62 | 2,265              | 20.78 | 2,206    | 83.56 |
|                  |  | หญิง | 0             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 078              | Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสีบพันธุ์ชาย | รวม  | 2,373         | 7.44  | 309   | 5.39  | 474                   | 5.88  | 334   | 7.32  | 938                | 8.61  | 318      | 12.04 |
|                  |  | ชาย  | 2,373         | 7.44  | 309   | 5.39  | 474                   | 5.88  | 334   | 7.32  | 938                | 8.61  | 318      | 12.04 |
|                  |  | หญิง | 0             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 079              | Malignant neoplasm of bladder (C67)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ                                 | รวม  | 11,054        | 17.00 | 2,071 | 17.75 | 2,234                 | 13.47 | 1,725 | 18.62 | 2,771              | 12.66 | 2,253    | 40.24 |
|                  |  | ชาย  | 8,710         | 27.31 | 1,504 | 26.25 | 1,731                 | 21.47 | 1,498 | 32.82 | 2,236              | 20.52 | 1,741    | 65.94 |
|                  |  | หญิง | 2,344         | 7.08  | 567   | 9.55  | 503                   | 5.90  | 227   | 4.83  | 535                | 4.87  | 512      | 17.30 |
| 080              | Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ         | รวม  | 3,667         | 5.64  | 771   | 6.61  | 587                   | 3.54  | 414   | 4.47  | 951                | 4.34  | 944      | 16.86 |
|                  |  | ชาย  | 2,390         | 7.49  | 492   | 8.59  | 349                   | 4.33  | 260   | 5.70  | 673                | 6.18  | 616      | 23.33 |
|                  |  | หญิง | 1,277         | 3.86  | 279   | 4.70  | 238                   | 2.79  | 154   | 3.28  | 278                | 2.53  | 328      | 11.09 |
| 081              | Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)<br>เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ                         | รวม  | 911           | 1.40  | 168   | 1.44  | 64                    | 0.39  | 110   | 1.19  | 173                | 0.79  | 396      | 7.07  |
|                  |  | ชาย  | 469           | 1.47  | 103   | 1.80  | 37                    | 0.46  | 58    | 1.27  | 85                 | 0.78  | 186      | 7.05  |
|                  |  | หญิง | 442           | 1.33  | 65    | 1.09  | 27                    | 0.32  | 52    | 1.11  | 88                 | 0.80  | 210      | 7.10  |
| 082              | Malignant neoplasm of brain (C71)<br>เนื้องอกร้ายของสมอง   | รวม  | 4,582         | 7.05  | 694   | 5.95  | 701                   | 4.23  | 675   | 7.29  | 1,311              | 5.99  | 1,201    | 21.45 |
|                  |  | ชาย  | 2,519         | 7.90  | 349   | 6.09  | 385                   | 4.78  | 406   | 8.89  | 686                | 6.29  | 693      | 26.25 |
|                  |  | หญิง | 2,063         | 6.23  | 345   | 5.81  | 316                   | 3.71  | 269   | 5.72  | 625                | 5.69  | 508      | 17.17 |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 083              | Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)<br>เนื้องอกร้ายๆ ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง                 | รวม  | 533        | 0.82   | 84     | 0.72   | 133                   | 0.80   | 83     | 0.90   | 146                | 0.67   | 87       | 1.55   |
|                  |  | ชาย  | 229        | 0.72   | 42     | 0.73   | 42                    | 0.52   | 43     | 0.94   | 54                 | 0.50   | 48       | 1.82   |
|                  |  | หญิง | 304        | 0.92   | 42     | 0.71   | 91                    | 1.07   | 40     | 0.85   | 92                 | 0.84   | 39       | 1.32   |
| 084              | Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)<br>เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ | รวม  | 162,951    | 250.64 | 32,092 | 275.04 | 28,059                | 169.13 | 13,482 | 145.52 | 49,856             | 227.74 | 39,462   | 704.82 |
|                  |  | ชาย  | 76,856     | 240.97 | 15,646 | 273.07 | 13,452                | 166.86 | 6,880  | 150.73 | 24,519             | 224.98 | 16,359   | 619.63 |
|                  |  | หญิง | 86,095     | 259.96 | 16,446 | 276.94 | 14,607                | 171.28 | 6,602  | 140.46 | 25,337             | 230.48 | 23,103   | 780.83 |
| 085              | Hodgkin's disease (C81)<br>โรคยอดกินส์   | รวม  | 1,850      | 2.85   | 265    | 2.27   | 319                   | 1.92   | 208    | 2.25   | 525                | 2.40   | 533      | 9.52   |
|                  |  | ชาย  | 1,127      | 3.53   | 172    | 3.00   | 190                   | 2.36   | 131    | 2.87   | 329                | 3.02   | 305      | 11.55  |
|                  |  | หญิง | 723        | 2.18   | 93     | 1.57   | 129                   | 1.51   | 77     | 1.64   | 196                | 1.78   | 228      | 7.71   |
| 086              | Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)<br>เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคยอดกินส์   | รวม  | 20,600     | 31.69  | 3,499  | 29.99  | 3,791                 | 22.85  | 2,073  | 22.38  | 6,842              | 31.25  | 4,395    | 78.50  |
|                  |  | ชาย  | 11,774     | 36.92  | 2,115  | 36.91  | 2,193                 | 27.20  | 1,130  | 24.76  | 3,919              | 35.96  | 2,417    | 91.55  |
|                  |  | หญิง | 8,826      | 26.65  | 1,384  | 23.31  | 1,598                 | 18.74  | 943    | 20.06  | 2,923              | 26.59  | 1,978    | 66.85  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 087              | Leukaemia (C91-C95)<br>ลิวโคเมีย   | รวม  | 22,756        | 35.00 | 3,934 | 33.72 | 4,623                 | 27.87 | 3,099 | 33.45 | 7,591              | 34.68 | 3,509    | 62.67 |
|                  |  | ชาย  | 12,557        | 39.37 | 2,167 | 37.82 | 2,459                 | 30.50 | 1,661 | 36.39 | 4,274              | 39.22 | 1,996    | 75.60 |
|                  |  | หญิง | 10,199        | 30.80 | 1,767 | 29.75 | 2,164                 | 25.37 | 1,438 | 30.59 | 3,317              | 30.17 | 1,513    | 51.14 |
| 088              | Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ | รวม  | 6,311         | 9.71  | 1,119 | 9.59  | 1,134                 | 6.84  | 691   | 7.46  | 2,231              | 10.19 | 1,136    | 20.29 |
|                  |  | ชาย  | 3,241         | 10.16 | 593   | 10.35 | 538                   | 6.67  | 347   | 7.60  | 1,200              | 11.01 | 563      | 21.32 |
|                  |  | หญิง | 3,070         | 9.27  | 526   | 8.86  | 596                   | 6.99  | 344   | 7.32  | 1,031              | 9.38  | 573      | 19.37 |
|                  |  | รวม  | 1,511         | 4.56  | 238   | 4.01  | 384                   | 4.50  | 184   | 3.91  | 549                | 4.99  | 156      | 5.27  |
| 089              | Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)<br>มะเร็งจำเกิดเฉพาะที่ของปากมดลูก   | ชาย  | 0             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 1,511         | 4.56  | 238   | 4.01  | 384                   | 4.50  | 184   | 3.91  | 549                | 4.99  | 156      | 5.27  |
|                  |  | รวม  | 1,511         | 4.56  | 238   | 4.01  | 384                   | 4.50  | 184   | 3.91  | 549                | 4.99  | 156      | 5.27  |
| 090              | Benign neoplasm of skin (D22-D23)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของผิวนัง  | รวม  | 975           | 1.50  | 136   | 1.17  | 115                   | 0.69  | 162   | 1.75  | 347                | 1.59  | 215      | 3.84  |
|                  |  | ชาย  | 377           | 1.18  | 46    | 0.80  | 48                    | 0.60  | 62    | 1.36  | 126                | 1.16  | 95       | 3.60  |
|                  |  | หญิง | 598           | 1.81  | 90    | 1.52  | 67                    | 0.79  | 100   | 2.13  | 221                | 2.01  | 120      | 4.06  |
| 091              | Benign neoplasm of breast (D24)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม  | ชาย  | 6             | 0.02  | 1     | 0.02  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 4                  | 0.04  | 0        | 0.00  |
|                  |  | รวม  | 1,348         | 2.07  | 191   | 1.64  | 292                   | 1.76  | 239   | 2.58  | 445                | 2.03  | 181      | 3.23  |
|                  |  | หญิง | 1,342         | 4.05  | 190   | 3.20  | 291                   | 3.41  | 239   | 5.08  | 441                | 4.01  | 181      | 6.12  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ  |       | กลาง ('ไม่รวมกรุงเทพฯ') |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|-------|--------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน  | อัตรา | จำนวน                   | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 092              | Leiomyoma of uterus (D25)<br>โลโองโนมาทึ่นคลุก   | รวม  | 26,905     | 81.24 | 3,807  | 64.11 | 4,811                   | 56.41 | 3,229 | 68.70 | 10,261             | 93.34 | 4,797    | 162.13 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0      | 0.00  | 0                       | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 26,905     | 81.24 | 3,807  | 64.11 | 4,811                   | 56.41 | 3,229 | 68.70 | 10,261             | 93.34 | 4,797    | 162.13 |
| 093              | Benigh neoplasm of ovary (D27)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่   | รวม  | 3,133      | 9.46  | 566    | 9.53  | 468                     | 5.49  | 466   | 9.91  | 993                | 9.03  | 640      | 21.63  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0      | 0.00  | 0                       | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 3,133      | 9.46  | 566    | 9.53  | 468                     | 5.49  | 466   | 9.91  | 993                | 9.03  | 640      | 21.63  |
| 094              | Benigh neoplasm of urinary organs (D30)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ   | รวม  | 236        | 0.36  | 48     | 0.41  | 71                      | 0.43  | 24    | 0.26  | 54                 | 0.25  | 39       | 0.70   |
|                  |  | ชาย  | 123        | 0.39  | 24     | 0.42  | 41                      | 0.51  | 17    | 0.37  | 31                 | 0.28  | 10       | 0.38   |
|                  |  | หญิง | 113        | 0.34  | 24     | 0.40  | 30                      | 0.35  | 7     | 0.15  | 23                 | 0.21  | 29       | 0.98   |
| 095              | Benigh neoplasm of brain and other parts<br>of central nervous system (D33)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบ<br>ประสาทส่วนกลาง  | รวม  | 1,659      | 2.55  | 311    | 2.67  | 392                     | 2.36  | 216   | 2.33  | 357                | 1.63  | 383      | 6.84   |
|                  |  | ชาย  | 702        | 2.20  | 115    | 2.01  | 170                     | 2.11  | 88    | 1.93  | 167                | 1.53  | 162      | 6.14   |
|                  |  | หญิง | 957        | 2.89  | 196    | 3.30  | 222                     | 2.60  | 128   | 2.72  | 190                | 1.73  | 221      | 7.47   |
| 096              | Other in situ and benign neoplasms and<br>neoplasms of uncertain and unknown<br>behaviour (D00-D05, D07-D21,<br>D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48)<br>เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอก<br>บางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม | รวม  | 57,392     | 88.28 | 10,404 | 89.16 | 11,627                  | 70.08 | 6,715 | 72.48 | 18,982             | 86.71 | 9,664    | 172.61 |
|                  |  | ชาย  | 24,974     | 78.30 | 4,627  | 80.75 | 5,022                   | 62.29 | 3,014 | 66.03 | 8,360              | 76.71 | 3,951    | 149.65 |
|                  |  | หญิง | 32,418     | 97.88 | 5,777  | 97.28 | 6,605                   | 77.45 | 3,701 | 78.74 | 10,622             | 96.62 | 5,713    | 193.09 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | พื้นประเทศ |          | เหนือ   |          | กลาง ('ไม่รวมกรุงเทพฯ) |          | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |          |
|------------------|---|------|------------|----------|---------|----------|------------------------|----------|--------|--------|--------------------|----------|----------|----------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน                  | อัตรา    | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา    |
| 097              | Iron deficiency anaemia (D50)<br>โลหิตจากภารชาดธาตุเหล็ก  | รวม  | 113,903    | 175.20   | 20,463  | 175.37   | 26,244                 | 158.19   | 21,052 | 227.23 | 39,088             | 178.55   | 7,056    | 126.03   |
|                  |   | ชาย  | 48,583     | 152.32   | 9,658   | 168.56   | 10,612                 | 131.63   | 8,493  | 186.07 | 16,786             | 154.03   | 3,034    | 114.92   |
|                  |   | หญิง | 65,320     | 197.23   | 10,805  | 181.95   | 15,632                 | 183.30   | 12,559 | 267.20 | 22,302             | 202.87   | 4,022    | 135.94   |
| 098              | Other anaemia (D51-D64)<br>โลหิตจากอื่น ๆ   | รวม  | 775,171    | 1,192.32 | 158,514 | 1,358.50 | 177,919                | 1,072.43 | 80,574 | 869.70 | 296,901            | 1,356.24 | 61,263   | 1,094.20 |
|                  |   | ชาย  | 353,559    | 1,108.53 | 74,989  | 1,308.77 | 80,901                 | 1,003.48 | 34,955 | 765.81 | 135,149            | 1,240.11 | 27,565   | 1,044.08 |
|                  |   | หญิง | 421,612    | 1,273.02 | 83,525  | 1,406.49 | 97,018                 | 1,137.61 | 45,619 | 970.58 | 161,752            | 1,471.37 | 33,698   | 1,138.92 |
| 099              | Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77)<br>ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด | รวม  | 171,705    | 264.11   | 32,685  | 280.12   | 34,834                 | 209.97   | 18,385 | 198.44 | 67,661             | 309.08   | 18,140   | 323.99   |
|                  |   | ชาย  | 98,283     | 308.15   | 18,713  | 326.59   | 18,998                 | 235.65   | 10,262 | 224.83 | 40,408             | 370.78   | 9,902    | 375.06   |
|                  |   | หญิง | 73,422     | 221.69   | 13,972  | 235.28   | 15,836                 | 185.69   | 8,123  | 172.82 | 27,253             | 247.91   | 8,238    | 278.43   |
| 100              | Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)<br>ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน                                     | รวม  | 1,755      | 2.70     | 260     | 2.23     | 348                    | 2.10     | 166    | 1.79   | 358                | 1.64     | 623      | 11.13    |
|                  |   | ชาย  | 1,189      | 3.73     | 166     | 2.90     | 257                    | 3.19     | 119    | 2.61   | 267                | 2.45     | 380      | 14.39    |
|                  |   | หญิง | 566        | 1.71     | 94      | 1.58     | 91                     | 1.07     | 47     | 1.00   | 91                 | 0.83     | 243      | 8.21     |
| 101              | Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02)<br>การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมรังรอยด์                                      | รวม  | 1,100      | 1.69     | 223     | 1.91     | 232                    | 1.40     | 96     | 1.04   | 314                | 1.43     | 235      | 4.20     |
|                  |   | ชาย  | 382        | 1.20     | 75      | 1.31     | 90                     | 1.12     | 26     | 0.57   | 120                | 1.10     | 71       | 2.69     |
|                  |   | หญิง | 718        | 2.17     | 148     | 2.49     | 142                    | 1.67     | 70     | 1.49   | 194                | 1.76     | 164      | 5.54     |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)                     | เพศ  | พื้นประเทศ |          | เหนือ   |          | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |          | ใต้    |          | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |          |
|------------------|--|------|------------|----------|---------|----------|-----------------------|----------|--------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน                 | อัตรา    | จำนวน  | อัตรา    | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา    |
| 102              | Thyrotoxicosis (E05)<br>โรคพิษร้อยด์             | รวม  | 34,527     | 53.11    | 6,995   | 59.95    | 7,609                 | 45.86    | 3,706  | 40.00    | 13,374             | 61.09    | 2,843    | 50.78    |
|                  |  | ชาย  | 9,261      | 29.04    | 1,701   | 29.69    | 2,084                 | 25.85    | 1,071  | 23.46    | 3,572              | 32.78    | 833      | 31.55    |
|                  |  | หญิง | 25,266     | 76.29    | 5,294   | 89.15    | 5,525                 | 64.78    | 2,635  | 56.06    | 9,802              | 89.16    | 2,010    | 67.93    |
| 103              | Other disorders of thyroid<br>(E03-E04, E06-E07) | รวม  | 38,231     | 58.80    | 7,067   | 60.57    | 8,667                 | 52.24    | 4,794  | 51.75    | 11,638             | 53.16    | 6,065    | 108.33   |
|                  |  | ชาย  | 8,688      | 27.24    | 1,653   | 28.85    | 1,914                 | 23.74    | 1,044  | 22.87    | 2,372              | 21.77    | 1,705    | 64.58    |
|                  |  | หญิง | 29,543     | 89.20    | 5,414   | 91.17    | 6,753                 | 79.18    | 3,750  | 79.78    | 9,266              | 84.29    | 4,360    | 147.36   |
| 104              | Diabetes mellitus (E10-E14)<br>เบาหวาน           | รวม  | 840,489    | 1,292.79 | 141,704 | 1,214.44 | 207,673               | 1,251.77 | 93,134 | 1,005.27 | 322,138            | 1,471.53 | 75,840   | 1,354.56 |
|                  |  | ชาย  | 332,605    | 1,042.83 | 56,781  | 990.99   | 80,910                | 1,003.59 | 36,527 | 800.25   | 124,002            | 1,137.83 | 34,385   | 1,302.41 |
|                  |  | หญิง | 507,884    | 1,533.51 | 84,923  | 1,430.03 | 126,763               | 1,486.39 | 56,607 | 1,204.36 | 198,136            | 1,802.33 | 41,455   | 1,401.09 |
| 105              | Malnutrition (E40-E46)<br>ทุพโภชนาการ            | รวม  | 21,457     | 33.00    | 3,198   | 27.41    | 4,285                 | 25.83    | 3,061  | 33.04    | 6,722              | 30.71    | 4,191    | 74.85    |
|                  |  | ชาย  | 12,161     | 38.13    | 1,859   | 32.44    | 2,440                 | 30.27    | 1,712  | 37.51    | 4,005              | 36.75    | 2,145    | 81.25    |
|                  |  | หญิง | 9,296      | 28.07    | 1,339   | 22.55    | 1,845                 | 21.63    | 1,349  | 28.70    | 2,717              | 24.72    | 2,046    | 69.15    |
| 106              | Vitamin A deficiency (E50)<br>การขาดวิตามินเอ    | รวม  | 111        | 0.17     | 16      | 0.14     | 16                    | 0.10     | 15     | 0.16     | 25                 | 0.11     | 39       | 0.70     |
|                  |  | ชาย  | 48         | 0.15     | 10      | 0.17     | 4                     | 0.05     | 8      | 0.18     | 9                  | 0.08     | 17       | 0.64     |
|                  |  | หญิง | 63         | 0.19     | 6       | 0.10     | 12                    | 0.14     | 7      | 0.15     | 16                 | 0.15     | 22       | 0.74     |
| 107              | Other vitamin deficiencies<br>(E51-E56)          | รวม  | 3,157      | 4.86     | 294     | 2.52     | 360                   | 2.17     | 123    | 1.33     | 588                | 2.69     | 1,792    | 32.01    |
|                  |  | ชาย  | 1,561      | 4.89     | 174     | 3.04     | 179                   | 2.22     | 58     | 1.27     | 350                | 3.21     | 800      | 30.30    |
|                  |  | หญิง | 1,596      | 4.82     | 120     | 2.02     | 181                   | 2.12     | 65     | 1.38     | 238                | 2.16     | 992      | 33.53    |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |          | เหนือ   |          | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |          | ใต้     |          | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |          |
|------------------|---|------|------------|----------|---------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน                 | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา    |
| 108              | Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64)<br>ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ | รวม  | 66         | 0.10     | 17      | 0.15     | 21                    | 0.13     | 5       | 0.05     | 18                 | 0.08     | 5        | 0.09     |
|                  |   | ชาย  | 36         | 0.11     | 11      | 0.19     | 8                     | 0.10     | 3       | 0.07     | 10                 | 0.09     | 4        | 0.15     |
|                  |   | หญิง | 30         | 0.09     | 6       | 0.10     | 13                    | 0.15     | 2       | 0.04     | 8                  | 0.07     | 1        | 0.03     |
| 109              | Obesity (E66)<br>โรคอ้วน  | รวม  | 14,090     | 21.67    | 1,624   | 13.92    | 3,603                 | 21.72    | 2,363   | 25.51    | 3,563              | 16.28    | 2,937    | 52.46    |
|                  |   | ชาย  | 4,885      | 15.32    | 641     | 11.19    | 1,241                 | 15.39    | 608     | 13.32    | 1,230              | 11.29    | 1,165    | 44.13    |
|                  |   | หญิง | 9,205      | 27.79    | 983     | 16.55    | 2,362                 | 27.70    | 1,755   | 37.34    | 2,333              | 21.22    | 1,772    | 59.89    |
| 110              | Volume depletion (E86)<br>การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย  | รวม  | 95,800     | 147.35   | 18,869  | 161.71   | 25,477                | 153.57   | 18,934  | 204.37   | 26,145             | 119.43   | 6,375    | 113.86   |
|                  |   | ชาย  | 48,901     | 153.32   | 9,699   | 169.27   | 13,449                | 166.82   | 9,299   | 203.73   | 13,129             | 120.47   | 3,325    | 125.94   |
|                  |   | หญิง | 46,899     | 141.61   | 9,170   | 154.41   | 12,028                | 141.04   | 9,635   | 204.99   | 13,016             | 118.40   | 3,050    | 103.08   |
| 111              | Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90)                              | รวม  | 2,115,915  | 3,254.58 | 448,886 | 3,847.06 | 541,059               | 3,261.30 | 253,117 | 2,732.09 | 680,044            | 3,106.44 | 192,809  | 3,443.71 |
|                  |   | ชาย  | 1,010,878  | 3,169.44 | 213,783 | 3,731.10 | 250,464               | 3,106.70 | 118,128 | 2,588.01 | 335,066            | 3,074.53 | 93,437   | 3,539.13 |
|                  |   | หญิง | 1,105,037  | 3,336.56 | 235,103 | 3,958.93 | 290,595               | 3,407.45 | 134,989 | 2,872.00 | 344,978            | 3,138.08 | 99,372   | 3,358.57 |
| 112              | Dementia (F00-F03)<br>สมองเสื่อม  | รวม  | 11,692     | 17.98    | 2,152   | 18.44    | 3,157                 | 19.03    | 935     | 10.09    | 2,802              | 12.80    | 2,646    | 47.26    |
|                  |   | ชาย  | 5,064      | 15.88    | 958     | 16.72    | 1,280                 | 15.88    | 423     | 9.27     | 1,260              | 11.56    | 1,143    | 43.29    |
|                  |   | หญิง | 6,628      | 20.01    | 1,194   | 20.11    | 1,877                 | 22.01    | 512     | 10.89    | 1,542              | 14.03    | 1,503    | 50.80    |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 113              | Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)                       | รวม  | 112,033    | 172.32 | 28,778 | 246.63 | 20,108                | 121.20 | 6,658 | 71.86  | 52,585             | 240.21 | 3,904    | 69.73  |
|                  |   | ชาย  | 100,494    | 315.08 | 25,970 | 453.25 | 17,367                | 215.42 | 6,240 | 136.71 | 47,423             | 435.15 | 3,494    | 132.34 |
|                  | ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลกอฮอล์                       | หญิง | 11,539     | 34.84  | 2,808  | 47.28  | 2,741                 | 32.14  | 418   | 8.89   | 5,162              | 46.96  | 410      | 13.86  |
| 114              | Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) | รวม  | 26,999     | 41.53  | 4,130  | 35.40  | 7,388                 | 44.53  | 4,808 | 51.90  | 7,519              | 34.35  | 3,154    | 56.33  |
|                  |   | ชาย  | 23,831     | 74.72  | 3,458  | 60.35  | 6,445                 | 79.94  | 4,526 | 99.16  | 6,834              | 62.71  | 2,568    | 97.27  |
|                  | ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้ยาตุลย์                         | หญิง | 3,168      | 9.57   | 672    | 11.32  | 943                   | 11.06  | 282   | 6.00   | 685                | 6.23   | 586      | 19.81  |
| 115              | Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)                     | รวม  | 61,698     | 94.90  | 10,342 | 88.63  | 11,062                | 66.68  | 6,856 | 74.00  | 27,774             | 126.87 | 5,664    | 101.16 |
|                  |   | ชาย  | 39,127     | 122.68 | 6,064  | 105.83 | 6,419                 | 79.62  | 4,708 | 103.15 | 18,528             | 170.01 | 3,408    | 129.09 |
|                  | จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด   | หญิง | 22,571     | 68.15  | 4,278  | 72.04  | 4,643                 | 54.44  | 2,148 | 45.70  | 9,246              | 84.11  | 2,256    | 76.25  |
| 116              | Mood(affective) disorders (F30-F39)   | รวม  | 37,444     | 57.59  | 10,121 | 86.74  | 7,225                 | 43.55  | 5,213 | 56.27  | 11,962             | 54.64  | 2,923    | 52.21  |
|                  |   | ชาย  | 12,474     | 39.11  | 3,522  | 61.47  | 2,434                 | 30.19  | 1,693 | 37.09  | 3,613              | 33.15  | 1,212    | 45.91  |
|                  | ความผิดปกติทางอารมณ์  | หญิง | 24,970     | 75.39  | 6,599  | 111.12 | 4,791                 | 56.18  | 3,520 | 74.89  | 8,349              | 75.95  | 1,711    | 57.83  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|-------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 117              | Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48)<br>โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด | รวม  | 27,491     | 42.29 | 6,198  | 53.12  | 5,709                 | 34.41 | 4,370 | 47.17 | 9,579              | 43.76 | 1,635    | 29.20  |
|                  |  | ชาย  | 8,199      | 25.71 | 1,879  | 32.79  | 1,993                 | 24.72 | 1,294 | 28.35 | 2,398              | 22.00 | 635      | 24.05  |
|                  |  | หญิง | 19,292     | 58.25 | 4,319  | 72.73  | 3,716                 | 43.57 | 3,076 | 65.44 | 7,181              | 65.32 | 1,000    | 33.80  |
| 118              | Mental retardation (F70-F79)<br>ภาวะปัญญาอ่อน  | รวม  | 7,257      | 11.16 | 894    | 7.66   | 1,226                 | 7.39  | 527   | 5.69  | 1,638              | 7.48  | 2,972    | 53.08  |
|                  |  | ชาย  | 4,179      | 13.10 | 444    | 7.75   | 693                   | 8.60  | 285   | 6.24  | 898                | 8.24  | 1,859    | 70.41  |
|                  |  | หญิง | 3,078      | 9.29  | 450    | 7.58   | 533                   | 6.25  | 242   | 5.15  | 740                | 6.73  | 1,113    | 37.62  |
| 119              | Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99)<br>ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ          | รวม  | 48,050     | 73.91 | 10,426 | 89.35  | 11,520                | 69.44 | 3,920 | 42.31 | 13,660             | 62.40 | 8,524    | 152.24 |
|                  |  | ชาย  | 28,153     | 88.27 | 6,291  | 109.80 | 6,882                 | 85.36 | 2,310 | 50.61 | 7,443              | 68.30 | 5,227    | 197.98 |
|                  |  | หญิง | 19,897     | 60.08 | 4,135  | 69.63  | 4,638                 | 54.38 | 1,610 | 34.25 | 6,217              | 56.55 | 3,297    | 111.43 |
| 120              | Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09)  | รวม  | 28,059     | 43.16 | 5,604  | 48.03  | 5,378                 | 32.42 | 2,307 | 24.90 | 12,681             | 57.93 | 2,089    | 37.31  |
|                  |  | ชาย  | 17,058     | 53.48 | 3,465  | 60.47  | 3,257                 | 40.40 | 1,386 | 30.37 | 7,790              | 71.48 | 1,160    | 43.94  |
|                  |  | หญิง | 11,001     | 33.22 | 2,139  | 36.02  | 2,121                 | 24.87 | 921   | 19.59 | 4,891              | 44.49 | 929      | 31.40  |
| 121              | Parkinson's disease (G20)<br>โรคพาร์กินสัน   | รวม  | 16,845     | 25.91 | 3,136  | 26.88  | 4,498                 | 27.11 | 1,732 | 18.69 | 4,509              | 20.60 | 2,970    | 53.05  |
|                  |  | ชาย  | 8,117      | 25.45 | 1,537  | 26.82  | 2,054                 | 25.48 | 842   | 18.45 | 2,169              | 19.90 | 1,515    | 57.38  |
|                  |  | หญิง | 8,728      | 26.35 | 1,599  | 26.93  | 2,444                 | 28.66 | 890   | 18.94 | 2,340              | 21.29 | 1,455    | 49.18  |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 122              | Alzheimer's disease (G30)<br>โรคแอลไซเมอร์  | รวม  | 7,179      | 11.04  | 1,258  | 10.78  | 1,843                 | 11.11  | 735    | 7.93   | 1,562              | 7.14   | 1,781    | 31.81  |
|                  |   | ชาย  | 2,742      | 8.60   | 489    | 8.53   | 676                   | 8.38   | 268    | 5.87   | 651                | 5.97   | 658      | 24.92  |
|                  |   | หญิง | 4,437      | 13.40  | 769    | 12.95  | 1,167                 | 13.68  | 467    | 9.94   | 911                | 8.29   | 1,123    | 37.96  |
| 123              | Multiple sclerosis (G35)<br>มัลติเพลส เสคลอโรซิส  | รวม  | 443        | 0.68   | 113    | 0.97   | 60                    | 0.36   | 61     | 0.66   | 130                | 0.59   | 79       | 1.41   |
|                  |   | ชาย  | 79         | 0.25   | 19     | 0.33   | 14                    | 0.17   | 7      | 0.15   | 19                 | 0.17   | 20       | 0.76   |
|                  |   | หญิง | 364        | 1.10   | 94     | 1.58   | 46                    | 0.54   | 54     | 1.15   | 111                | 1.01   | 59       | 1.99   |
| 124              | Epilepsy (G40-G41)<br>ลมบ้าหมู  | รวม  | 82,698     | 127.20 | 17,542 | 150.34 | 18,501                | 111.52 | 11,247 | 121.40 | 28,412             | 129.79 | 6,996    | 124.95 |
|                  |   | ชาย  | 50,688     | 158.92 | 10,911 | 190.43 | 11,428                | 141.75 | 6,793  | 148.82 | 17,527             | 160.83 | 4,029    | 152.61 |
|                  |   | หญิง | 32,010     | 96.65  | 6,631  | 111.66 | 7,073                 | 82.94  | 4,454  | 94.76  | 10,885             | 99.01  | 2,967    | 100.28 |
| 125              | Migraine and other headache syndromes (G43-G44)<br>โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวด  | รวม  | 16,820     | 25.87  | 2,876  | 24.65  | 3,406                 | 20.53  | 3,001  | 32.39  | 6,836              | 31.23  | 701      | 12.52  |
|                  |   | ชาย  | 5,298      | 16.61  | 858    | 14.97  | 1,007                 | 12.49  | 994    | 21.78  | 2,253              | 20.67  | 186      | 7.05   |
|                  |   | หญิง | 11,522     | 34.79  | 2,018  | 33.98  | 2,399                 | 28.13  | 2,007  | 42.70  | 4,583              | 41.69  | 515      | 17.41  |
| 126              | Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)<br>โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อย ชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง | รวม  | 11,803     | 18.15  | 2,228  | 19.09  | 2,926                 | 17.64  | 1,820  | 19.64  | 3,743              | 17.10  | 1,086    | 19.40  |
|                  |   | ชาย  | 6,394      | 20.05  | 1,214  | 21.19  | 1,603                 | 19.88  | 1,027  | 22.50  | 1,985              | 18.21  | 565      | 21.40  |
|                  |   | หญิง | 5,409      | 16.33  | 1,014  | 17.07  | 1,323                 | 15.51  | 793    | 16.87  | 1,758              | 15.99  | 521      | 17.61  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยนับซึ่งจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 127              | Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)<br>ความผิดปกติของสันประสาท ราก  | รวม  | 12,732        | 19.58  | 2,652  | 22.73  | 2,350                 | 14.16  | 1,539  | 16.61  | 4,085              | 18.66  | 2,106    | 37.61  |
|                  |  | ชาย  | 5,589         | 17.52  | 1,097  | 19.15  | 1,025                 | 12.71  | 634    | 13.89  | 1,865              | 17.11  | 968      | 36.67  |
|                  |  | หญิง | 7,143         | 21.57  | 1,555  | 26.18  | 1,325                 | 15.54  | 905    | 19.25  | 2,220              | 20.19  | 1,138    | 38.46  |
| 128              | Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83)<br>สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ                                   | รวม  | 49,270        | 75.78  | 7,805  | 66.89  | 10,081                | 60.76  | 6,703  | 72.35  | 18,908             | 86.37  | 5,773    | 103.11 |
|                  |  | ชาย  | 30,112        | 94.41  | 4,941  | 86.23  | 6,122                 | 75.94  | 4,075  | 89.28  | 11,704             | 107.39 | 3,270    | 123.86 |
|                  |  | หญิง | 19,158        | 57.85  | 2,864  | 48.23  | 3,959                 | 46.42  | 2,628  | 55.91  | 7,204              | 65.53  | 2,503    | 84.60  |
| 129              | Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)<br>โรคของระบบประสาಥอื่น ๆ | รวม  | 101,767       | 156.53 | 18,476 | 158.34 | 19,675                | 118.59 | 10,159 | 109.65 | 38,458             | 175.68 | 14,999   | 267.89 |
|                  |  | ชาย  | 56,360        | 176.71 | 10,496 | 183.18 | 10,375                | 128.69 | 5,591  | 122.49 | 21,850             | 200.49 | 8,048    | 304.84 |
|                  |  | หญิง | 45,407        | 137.10 | 7,980  | 134.38 | 9,300                 | 109.05 | 4,568  | 97.19  | 16,608             | 151.07 | 6,951    | 234.93 |
| 130              | Inflammation of eyelid (H00-H01)<br>การอักเสบของหนังตา   | รวม  | 3,117         | 4.79   | 562    | 4.82   | 631                   | 3.80   | 491    | 5.30   | 1,202              | 5.49   | 231      | 4.13   |
|                  |  | ชาย  | 1,524         | 4.78   | 276    | 4.82   | 293                   | 3.63   | 264    | 5.78   | 573                | 5.26   | 118      | 4.47   |
|                  |  | หญิง | 1,593         | 4.81   | 286    | 4.82   | 338                   | 3.96   | 227    | 4.83   | 629                | 5.72   | 113      | 3.82   |
| 131              | Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13)<br>เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อ                           | รวม  | 20,379        | 31.35  | 4,204  | 36.03  | 5,086                 | 30.66  | 2,153  | 23.24  | 7,798              | 35.62  | 1,138    | 20.33  |
|                  |  | ชาย  | 8,669         | 27.18  | 1,897  | 33.11  | 2,210                 | 27.41  | 931    | 20.40  | 3,014              | 27.66  | 617      | 23.37  |
|                  |  | หญิง | 11,710        | 35.36  | 2,307  | 38.85  | 2,876                 | 33.72  | 1,222  | 26.00  | 4,784              | 43.52  | 521      | 17.61  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 132              | Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19)<br>กระจากตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ | รวม  | 10,811     | 16.63  | 1,872  | 16.04  | 2,127                 | 12.82  | 1,144  | 12.35  | 4,133              | 18.88  | 1,535    | 27.42  |
|                  |  | ชาย  | 6,330      | 19.85  | 1,104  | 19.27  | 1,226                 | 15.21  | 700    | 15.34  | 2,446              | 22.44  | 854      | 32.35  |
|                  |  | หญิง | 4,481      | 13.53  | 768    | 12.93  | 901                   | 10.56  | 444    | 9.45   | 1,687              | 15.35  | 681      | 23.02  |
| 133              | Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28)<br>ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ                  | รวม  | 217,129    | 333.98 | 45,470 | 389.69 | 61,406                | 370.13 | 22,852 | 246.66 | 62,783             | 286.79 | 24,618   | 439.70 |
|                  |  | ชาย  | 93,863     | 294.29 | 20,184 | 352.27 | 25,331                | 314.20 | 9,891  | 216.70 | 27,347             | 250.93 | 11,110   | 420.82 |
|                  |  | หญิง | 123,266    | 372.19 | 25,286 | 425.79 | 36,075                | 423.01 | 12,961 | 275.76 | 35,436             | 322.34 | 13,508   | 456.54 |
| 134              | Retinal detachments and breaks (H33)<br>จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของ  | รวม  | 7,899      | 12.15  | 1,250  | 10.71  | 2,070                 | 12.48  | 738    | 7.97   | 1,423              | 6.50   | 2,418    | 43.19  |
|                  |  | ชาย  | 4,570      | 14.33  | 685    | 11.96  | 1,212                 | 15.03  | 419    | 9.18   | 827                | 7.59   | 1,427    | 54.05  |
|                  |  | หญิง | 3,329      | 10.05  | 565    | 9.51   | 858                   | 10.06  | 319    | 6.79   | 596                | 5.42   | 991      | 33.49  |
| 135              | Glaucoma (H40-H42)<br>ต้อหิน   | รวม  | 21,702     | 33.38  | 4,445  | 38.09  | 5,029                 | 30.31  | 2,502  | 27.01  | 5,855              | 26.75  | 3,871    | 69.14  |
|                  |  | ชาย  | 10,453     | 32.77  | 2,103  | 36.70  | 2,381                 | 29.53  | 1,273  | 27.89  | 2,604              | 23.89  | 2,092    | 79.24  |
|                  |  | หญิง | 11,249     | 33.97  | 2,342  | 39.44  | 2,648                 | 31.05  | 1,229  | 26.15  | 3,251              | 29.57  | 1,779    | 60.13  |
| 136              | Strabismus (H49-H50)<br>ตาเหลี่ยม  | รวม  | 3,125      | 4.81   | 398    | 3.41   | 497                   | 3.00   | 475    | 5.13   | 778                | 3.55   | 977      | 17.45  |
|                  |  | ชาย  | 1,508      | 4.73   | 203    | 3.54   | 254                   | 3.15   | 243    | 5.32   | 356                | 3.27   | 452      | 17.12  |
|                  |  | หญิง | 1,617      | 4.88   | 195    | 3.28   | 243                   | 2.85   | 232    | 4.94   | 422                | 3.84   | 525      | 17.74  |
| 137              | Disorders of refraction and accommodation (H52)<br>ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง                                  | รวม  | 1,362      | 2.09   | 218    | 1.87   | 307                   | 1.85   | 196    | 2.12   | 257                | 1.17   | 384      | 6.86   |
|                  |  | ชาย  | 645        | 2.02   | 88     | 1.54   | 141                   | 1.75   | 110    | 2.41   | 121                | 1.11   | 185      | 7.01   |
|                  |  | หญิง | 717        | 2.16   | 130    | 2.19   | 166                   | 1.95   | 86     | 1.83   | 136                | 1.24   | 199      | 6.73   |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยนับซึ่งแบ่งโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 138              | Blindness and low vision (H54)<br>ตาบอดและสายตาเลือนราง   | รวม  | 210,366    | 323.57 | 44,019 | 377.25 | 58,443                | 352.27 | 21,986 | 237.31 | 62,236             | 284.29 | 23,682   | 422.98 |
|                  |   | ชาย  | 90,239     | 282.93 | 19,382 | 338.27 | 23,807                | 295.30 | 9,401  | 205.96 | 27,098             | 248.65 | 10,551   | 399.64 |
|                  |   | หญิง | 120,127    | 362.71 | 24,637 | 414.87 | 34,636                | 406.13 | 12,585 | 267.76 | 35,138             | 319.63 | 13,131   | 443.80 |
| 139              | Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)<br>โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ | รวม  | 46,264     | 71.16  | 7,088  | 60.75  | 10,011                | 60.34  | 5,497  | 59.33  | 12,724             | 58.12  | 10,944   | 195.47 |
|                  |   | ชาย  | 21,829     | 68.44  | 3,305  | 57.68  | 4,701                 | 58.31  | 2,695  | 59.04  | 5,736              | 52.63  | 5,392    | 204.23 |
|                  |   | หญิง | 24,435     | 73.78  | 3,783  | 63.70  | 5,310                 | 62.26  | 2,802  | 59.61  | 6,988              | 63.57  | 5,552    | 187.65 |
|                  |   |      |            |        |        |        |                       |        |        |        |                    |        |          |        |
| 140              | Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75 )<br>หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกอกหูอื่น ๆ    | รวม  | 9,275      | 14.27  | 1,879  | 16.10  | 1,699                 | 10.24  | 1,873  | 20.22  | 2,385              | 10.89  | 1,439    | 25.70  |
|                  |   | ชาย  | 4,766      | 14.94  | 913    | 15.93  | 923                   | 11.45  | 964    | 21.12  | 1,230              | 11.29  | 736      | 27.88  |
|                  |   | หญิง | 4,509      | 13.61  | 966    | 16.27  | 776                   | 9.10   | 909    | 19.34  | 1,155              | 10.51  | 703      | 23.76  |
| 141              | Hearing loss (H90-H91)<br>การสูญเสียการได้ยิน   | รวม  | 3,526      | 5.42   | 580    | 4.97   | 695                   | 4.19   | 321    | 3.46   | 1,051              | 4.80   | 879      | 15.70  |
|                  |   | ชาย  | 1,899      | 5.95   | 352    | 6.14   | 356                   | 4.42   | 173    | 3.79   | 549                | 5.04   | 469      | 17.76  |
|                  |   | หญิง | 1,627      | 4.91   | 228    | 3.84   | 339                   | 3.98   | 148    | 3.15   | 502                | 4.57   | 410      | 13.86  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |          | เหนือ   |          | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |          | ใต้     |          | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |          |
|------------------|---|------|---------------|----------|---------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|                  |   |      | จำนวน         | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน                 | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา    |
| 142              | Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)<br>โรคของหูและปูมูกหูอื่น ๆ | รวม  | 26,919        | 41.41    | 4,417   | 37.85    | 6,338                 | 38.20    | 5,132   | 55.39    | 9,480              | 43.30    | 1,552    | 27.72    |
|                  |   | ชาย  | 8,606         | 26.98    | 1,530   | 26.70    | 1,910                 | 23.69    | 1,617   | 35.43    | 2,959              | 27.15    | 590      | 22.35    |
|                  |   | หญิง | 18,313        | 55.29    | 2,887   | 48.61    | 4,428                 | 51.92    | 3,515   | 74.78    | 6,521              | 59.32    | 962      | 32.51    |
| 143              | Acute rheumatic fever (I00-I02)<br>ไข้รูมาติกเฉียบพลัน  | รวม  | 572           | 0.88     | 69      | 0.59     | 122                   | 0.74     | 119     | 1.28     | 208                | 0.95     | 54       | 0.96     |
|                  |   | ชาย  | 257           | 0.81     | 26      | 0.45     | 57                    | 0.71     | 47      | 1.03     | 105                | 0.96     | 22       | 0.83     |
|                  |   | หญิง | 315           | 0.95     | 43      | 0.72     | 65                    | 0.76     | 72      | 1.53     | 103                | 0.94     | 32       | 1.08     |
| 144              | Chronic rheumatic heart disease (I05-I09)<br>โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง                                  | รวม  | 26,788        | 41.20    | 6,081   | 52.12    | 5,178                 | 31.21    | 2,606   | 28.13    | 9,607              | 43.88    | 3,316    | 59.23    |
|                  |   | ชาย  | 10,444        | 32.75    | 2,294   | 40.04    | 1,936                 | 24.01    | 914     | 20.02    | 3,973              | 36.46    | 1,327    | 50.26    |
|                  |   | หญิง | 16,344        | 49.35    | 3,787   | 63.77    | 3,242                 | 38.01    | 1,692   | 36.00    | 5,634              | 51.25    | 1,989    | 67.22    |
| 145              | Essential (primary) hypertension (I10)<br>ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ                               | รวม  | 1,295,968     | 1,993.38 | 260,470 | 2,232.29 | 343,863               | 2,072.68 | 162,716 | 1,756.32 | 397,403            | 1,815.34 | 131,516  | 2,348.97 |
|                  |   | ชาย  | 558,481       | 1,751.03 | 113,833 | 1,986.70 | 144,724               | 1,795.12 | 71,488  | 1,566.20 | 166,973            | 1,532.13 | 61,463   | 2,328.04 |
|                  |   | หญิง | 737,487       | 2,226.78 | 146,637 | 2,469.24 | 199,139               | 2,335.06 | 91,228  | 1,940.95 | 230,430            | 2,096.10 | 70,053   | 2,367.65 |
| 146              | Other hypertensive diseases (I11-I15)<br>โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ                                     | รวม  | 10,102        | 15.54    | 1,393   | 11.94    | 2,294                 | 13.83    | 2,213   | 23.89    | 2,633              | 12.03    | 1,569    | 28.02    |
|                  |   | ชาย  | 4,699         | 14.73    | 601     | 10.49    | 1,000                 | 12.40    | 1,152   | 25.24    | 1,180              | 10.83    | 766      | 29.01    |
|                  |   | หญิง | 5,403         | 16.31    | 792     | 13.34    | 1,294                 | 15.17    | 1,061   | 22.57    | 1,453              | 13.22    | 803      | 27.14    |
| 147              | Acute myocardial infarction (I21-I22)<br>กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน                                  | รวม  | 82,427        | 126.78   | 14,781  | 126.68   | 24,914                | 150.17   | 13,649  | 147.32   | 20,788             | 94.96    | 8,295    | 148.15   |
|                  |   | ชาย  | 47,760        | 149.74   | 7,616   | 132.92   | 14,006                | 173.73   | 8,943   | 195.93   | 12,093             | 110.96   | 5,102    | 193.25   |
|                  |   | หญิง | 34,667        | 104.67   | 7,165   | 120.65   | 10,908                | 127.90   | 4,706   | 100.12   | 8,695              | 79.09    | 3,193    | 107.92   |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 148              | Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25)<br>โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ                 | รวม  | 245,026    | 376.88 | 40,146 | 344.06 | 75,184                | 453.18 | 35,585 | 384.10 | 56,608             | 258.59 | 37,503   | 669.83 |
|                  |   | ชาย  | 137,972    | 432.59 | 20,463 | 357.14 | 39,920                | 495.16 | 22,752 | 498.46 | 31,897             | 292.68 | 22,940   | 868.90 |
|                  |   | หญิง | 107,054    | 323.24 | 19,683 | 331.44 | 35,264                | 413.50 | 12,833 | 273.03 | 24,711             | 224.78 | 14,563   | 492.20 |
| 149              | Pulmonary embolism (I26)<br>ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด                        | รวม  | 5,958      | 9.16   | 959    | 8.22   | 1,357                 | 8.18   | 850    | 9.17   | 1,374              | 6.28   | 1,418    | 25.33  |
|                  |   | ชาย  | 2,246      | 7.04   | 389    | 6.79   | 471                   | 5.84   | 338    | 7.41   | 521                | 4.78   | 527      | 19.96  |
|                  |   | หญิง | 3,712      | 11.21  | 570    | 9.60   | 886                   | 10.39  | 512    | 10.89  | 853                | 7.76   | 891      | 30.11  |
| 150              | Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49)<br>ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้า | รวม  | 235,107    | 361.63 | 47,759 | 409.31 | 56,571                | 340.99 | 24,614 | 265.68 | 79,434             | 362.85 | 26,729   | 477.40 |
|                  |   | ชาย  | 112,478    | 352.66 | 22,315 | 389.46 | 26,581                | 329.70 | 12,061 | 264.24 | 38,296             | 351.40 | 13,225   | 500.93 |
|                  |   | หญิง | 122,629    | 370.27 | 25,444 | 428.45 | 29,990                | 351.66 | 12,553 | 267.07 | 41,138             | 374.21 | 13,504   | 456.41 |
| 151              | Heart failure (I50)<br>หัวใจล้มเหลว   | รวม  | 193,018    | 296.89 | 40,282 | 345.23 | 54,285                | 327.21 | 32,562 | 351.47 | 49,665             | 226.87 | 16,224   | 289.77 |
|                  |   | ชาย  | 85,103     | 266.83 | 16,885 | 294.69 | 23,033                | 285.70 | 14,976 | 328.10 | 22,481             | 206.28 | 7,728    | 292.71 |
|                  |   | หญิง | 107,915    | 325.84 | 23,397 | 393.99 | 31,252                | 366.45 | 17,586 | 374.16 | 27,184             | 247.28 | 8,496    | 287.15 |
| 152              | Other heart diseases (I27-I43, I51-I52)<br>โรคหัวใจอื่น ๆ                               | รวม  | 120,151    | 184.81 | 22,179 | 190.08 | 29,040                | 175.04 | 14,267 | 153.99 | 36,945             | 168.76 | 17,720   | 316.49 |
|                  |   | ชาย  | 59,050     | 185.14 | 11,066 | 193.13 | 13,789                | 171.04 | 6,778  | 148.50 | 18,560             | 170.30 | 8,857    | 335.48 |
|                  |   | หญิง | 61,101     | 184.49 | 11,113 | 187.13 | 15,251                | 178.83 | 7,489  | 159.33 | 18,385             | 167.24 | 8,863    | 299.55 |
| 153              | Intracranial haemorrhage (I60-I62)<br>เลือดออกในสมอง                                    | รวม  | 56,920     | 87.55  | 12,529 | 107.38 | 15,888                | 95.77  | 6,700  | 72.32  | 16,281             | 74.37  | 5,522    | 98.63  |
|                  |   | ชาย  | 33,985     | 106.55 | 7,426  | 129.60 | 9,433                 | 117.00 | 3,966  | 86.89  | 9,961              | 91.40  | 3,199    | 121.17 |
|                  |   | หญิง | 22,935     | 69.25  | 5,103  | 85.93  | 6,455                 | 75.69  | 2,734  | 58.17  | 6,320              | 57.49  | 2,323    | 78.51  |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 154              | Cerebral infarction (I63)<br>เนื้อสมองตาย   | รวม  | 104,322    | 160.46 | 18,494 | 158.50 | 28,502                | 171.80 | 14,420 | 155.65 | 34,332             | 156.83 | 8,574    | 153.14 |
|                  |   | ชาย  | 56,156     | 176.07 | 9,843  | 171.79 | 15,294                | 189.70 | 7,912  | 173.34 | 18,408             | 168.91 | 4,699    | 177.98 |
|                  |   | หญิง | 48,166     | 145.43 | 8,651  | 145.68 | 13,208                | 154.87 | 6,508  | 138.46 | 15,924             | 144.85 | 3,875    | 130.97 |
| 155              | Stroke, not specified as<br>haemorrhage or infarction (I64)<br>เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจาก<br>เลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจาก<br>การขาดเลือด | รวม  | 23,349     | 35.91  | 4,432  | 37.98  | 5,203                 | 31.36  | 3,660  | 39.51  | 8,738              | 39.92  | 1,316    | 23.50  |
|                  |   | ชาย  | 12,593     | 39.48  | 2,364  | 41.26  | 2,807                 | 34.82  | 1,918  | 42.02  | 4,768              | 43.75  | 736      | 27.88  |
|                  |   | หญิง | 10,756     | 32.48  | 2,068  | 34.82  | 2,396                 | 28.09  | 1,742  | 37.06  | 3,970              | 36.11  | 580      | 19.60  |
|                  |   |      |            |        |        |        |                       |        |        |        |                    |        |          |        |
| 156              | Other cerebrovascular diseases<br>(I65-I69)<br>โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ   | รวม  | 108,872    | 167.46 | 20,317 | 174.12 | 30,558                | 184.19 | 14,210 | 153.38 | 30,509             | 139.37 | 13,278   | 237.15 |
|                  |   | ชาย  | 59,876     | 187.73 | 11,265 | 196.61 | 16,429                | 203.78 | 8,067  | 176.74 | 16,888             | 154.96 | 7,227    | 273.74 |
|                  |   | หญิง | 48,996     | 147.94 | 9,052  | 152.43 | 14,129                | 165.67 | 6,143  | 130.70 | 13,621             | 123.90 | 6,051    | 204.51 |
| 157              | Atherosclerosis (I70)<br>อะเรอโรสเคลโลโรสิส   | รวม  | 2,316      | 3.56   | 271    | 2.32   | 429                   | 2.59   | 227    | 2.45   | 203                | 0.93   | 1,186    | 21.18  |
|                  |   | ชาย  | 1,224      | 3.84   | 134    | 2.34   | 232                   | 2.88   | 126    | 2.76   | 108                | 0.99   | 624      | 23.64  |
|                  |   | หญิง | 1,092      | 3.30   | 137    | 2.31   | 197                   | 2.31   | 101    | 2.15   | 95                 | 0.86   | 562      | 18.99  |
| 158              | Other peripheral vascular diseases<br>(I73)<br>โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ   | รวม  | 1,974      | 3.04   | 296    | 2.54   | 535                   | 3.22   | 292    | 3.15   | 360                | 1.64   | 491      | 8.77   |
|                  |   | ชาย  | 1,137      | 3.56   | 158    | 2.76   | 308                   | 3.82   | 172    | 3.77   | 214                | 1.96   | 285      | 10.79  |
|                  |   | หญิง | 837        | 2.53   | 138    | 2.32   | 227                   | 2.66   | 120    | 2.55   | 146                | 1.33   | 206      | 6.96   |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 159              | Aterial embolism and thrombosis (I74)<br>ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือด   | รวม  | 6,268      | 9.64   | 1,213  | 10.40  | 1,446                 | 8.72  | 849   | 9.16  | 1,883              | 8.60  | 877      | 15.66  |
|                  |  | ชาย  | 3,495      | 10.96  | 659    | 11.50  | 787                   | 9.76  | 516   | 11.30 | 1,030              | 9.45  | 503      | 19.05  |
|                  |  | หญิง | 2,773      | 8.37   | 554    | 9.33   | 659                   | 7.73  | 333   | 7.08  | 853                | 7.76  | 374      | 12.64  |
| 160              | Other disease of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79)<br>โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดง<br>ย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ | รวม  | 16,019     | 24.64  | 2,981  | 25.55  | 3,247                 | 19.57 | 2,153 | 23.24 | 4,645              | 21.22 | 2,993    | 53.46  |
|                  |  | ชาย  | 9,605      | 30.11  | 1,631  | 28.47  | 1,946                 | 24.14 | 1,389 | 30.43 | 2,722              | 24.98 | 1,917    | 72.61  |
|                  |  | หญิง | 6,414      | 19.37  | 1,350  | 22.73  | 1,301                 | 15.26 | 764   | 16.25 | 1,923              | 17.49 | 1,076    | 36.37  |
| 161              | Phlebitis, thrombophlebitis,venous embolism and thrombosis (I80-I82)<br>หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำ                                | รวม  | 25,199     | 38.76  | 4,881  | 41.83  | 5,178                 | 31.21 | 2,951 | 31.85 | 8,070              | 36.86 | 4,119    | 73.57  |
|                  |  | ชาย  | 10,619     | 33.29  | 2,092  | 36.51  | 2,041                 | 25.32 | 1,273 | 27.89 | 3,544              | 32.52 | 1,669    | 63.22  |
|                  |  | หญิง | 14,580     | 44.02  | 2,789  | 46.96  | 3,137                 | 36.78 | 1,678 | 35.70 | 4,526              | 41.17 | 2,450    | 82.81  |
| 162              | Varicose veins of lower extremities (I83)<br>หลอดเลือดดำขอดของรยางส่วนล่าง   | รวม  | 1,691      | 2.60   | 267    | 2.29   | 552                   | 3.33  | 221   | 2.39  | 286                | 1.31  | 365      | 6.52   |
|                  |  | ชาย  | 669        | 2.10   | 96     | 1.68   | 224                   | 2.78  | 83    | 1.82  | 126                | 1.16  | 140      | 5.30   |
|                  |  | หญิง | 1,022      | 3.09   | 171    | 2.88   | 328                   | 3.85  | 138   | 2.94  | 160                | 1.46  | 225      | 7.60   |
| 163              | Haemorrhoids (I84)<br>ริดสีดวงทวาร   | รวม  | 20,468     | 31.48  | 4,465  | 38.27  | 4,467                 | 26.93 | 2,931 | 31.64 | 6,466              | 29.54 | 2,139    | 38.20  |
|                  |  | ชาย  | 11,664     | 36.57  | 2,743  | 47.87  | 2,505                 | 31.07 | 1,682 | 36.85 | 3,612              | 33.14 | 1,122    | 42.50  |
|                  |  | หญิง | 8,804      | 26.58  | 1,722  | 29.00  | 1,962                 | 23.01 | 1,249 | 26.57 | 2,854              | 25.96 | 1,017    | 34.37  |
| 164              | Other diseases of the circulatory system (I85-I99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบหลอดเวียนโลหิต  | รวม  | 53,455     | 82.22  | 15,028 | 128.79 | 12,558                | 75.69 | 5,182 | 55.93 | 15,891             | 72.59 | 4,796    | 85.66  |
|                  |  | ชาย  | 32,533     | 102.00 | 9,121  | 159.19 | 7,537                 | 93.49 | 3,032 | 66.43 | 9,994              | 91.70 | 2,849    | 107.91 |
|                  |  | หญิง | 20,922     | 63.17  | 5,907  | 99.47  | 5,021                 | 58.88 | 2,150 | 45.74 | 5,897              | 53.64 | 1,947    | 65.80  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|----------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา  |
| 165              | Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)<br>คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิล                                   | รวม  | 95,860     | 147.45 | 21,302 | 182.56 | 23,786                | 143.37 | 18,223 | 196.69 | 29,080             | 132.84   | 3,469    | 61.96  |
|                  |   | ชาย  | 49,665     | 155.72 | 11,402 | 199.00 | 12,559                | 155.78 | 9,202  | 201.60 | 14,740             | 135.25   | 1,762    | 66.74  |
|                  |   | หญิง | 46,195     | 139.48 | 9,900  | 166.71 | 11,227                | 131.65 | 9,021  | 191.93 | 14,340             | 130.44   | 1,707    | 57.69  |
| 166              | Acute laryngitis and tracheitis (J04)<br>กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบ<br>เฉียบพลัน                                   | รวม  | 1,118      | 1.72   | 202    | 1.73   | 228                   | 1.37   | 109    | 1.18   | 438                | 2.00     | 141      | 2.52   |
|                  |   | ชาย  | 626        | 1.96   | 105    | 1.83   | 123                   | 1.53   | 73     | 1.60   | 249                | 2.28     | 76       | 2.88   |
|                  |   | หญิง | 492        | 1.49   | 97     | 1.63   | 105                   | 1.23   | 36     | 0.77   | 189                | 1.72     | 65       | 2.20   |
| 167              | Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06)<br>การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน<br>แบบเฉียบพลันอ่อน ๆ | รวม  | 88,315     | 135.84 | 15,829 | 135.66 | 21,715                | 130.89 | 16,159 | 174.42 | 29,987             | 136.98   | 4,625    | 82.61  |
|                  |   | ชาย  | 46,718     | 146.48 | 8,610  | 150.27 | 12,010                | 148.97 | 8,004  | 175.36 | 15,637             | 143.48   | 2,457    | 93.06  |
|                  |   | หญิง | 41,597     | 125.60 | 7,219  | 121.56 | 9,705                 | 113.80 | 8,155  | 173.50 | 14,350             | 130.53   | 2,168    | 73.27  |
| 168              | Influenza (J09-J11)<br>ไข้หวัดใหญ่  | รวม  | 53,048     | 81.60  | 9,900  | 84.85  | 14,405                | 86.83  | 5,950  | 64.22  | 17,495             | 79.92    | 5,298    | 94.63  |
|                  |   | ชาย  | 27,497     | 86.21  | 5,269  | 91.96  | 7,616                 | 94.47  | 3,010  | 65.94  | 8,859              | 81.29    | 2,743    | 103.90 |
|                  |   | หญิง | 25,551     | 77.15  | 4,631  | 77.98  | 6,789                 | 79.61  | 2,940  | 62.55  | 8,636              | 78.56    | 2,555    | 86.35  |
| 169              | Pneumonia (J12-J18)<br>ปอดบวม   | รวม  | 514,823    | 791.87 | 91,929 | 787.85 | 119,150               | 718.19 | 75,696 | 817.05 | 199,291            | 910.36   | 28,757   | 513.62 |
|                  |   | ชาย  | 289,141    | 906.55 | 51,835 | 904.66 | 66,483                | 824.64 | 43,098 | 944.22 | 111,373            | 1,021.95 | 16,352   | 619.37 |
|                  |   | หญิง | 225,682    | 681.43 | 40,094 | 675.15 | 52,667                | 617.56 | 32,598 | 693.55 | 87,918             | 799.74   | 12,405   | 419.26 |
| 170              | Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)<br>หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน               | รวม  | 187,747    | 288.78 | 35,457 | 303.87 | 40,589                | 244.66 | 33,630 | 362.99 | 71,212             | 325.30   | 6,859    | 122.51 |
|                  |   | ชาย  | 102,480    | 321.31 | 19,541 | 341.04 | 21,814                | 270.58 | 18,556 | 406.54 | 38,752             | 355.58   | 3,817    | 144.58 |
|                  |   | หญิง | 85,267     | 257.46 | 15,916 | 268.01 | 18,775                | 220.15 | 15,074 | 320.71 | 32,460             | 295.27   | 3,042    | 102.81 |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 171              | Chronic sinusitis (J32)<br>ไซนัสอักเสบเรื้อรัง   | รวม  | 6,205      | 9.54   | 1,217  | 10.43  | 1,413                 | 8.52   | 645    | 6.96   | 1,820              | 8.31   | 1,110    | 19.83  |
|                  |  | ชาย  | 3,278      | 10.28  | 673    | 11.75  | 719                   | 8.92   | 327    | 7.16   | 955                | 8.76   | 604      | 22.88  |
|                  |  | หญิง | 2,927      | 8.84   | 544    | 9.16   | 694                   | 8.14   | 318    | 6.77   | 865                | 7.87   | 506      | 17.10  |
| 172              | Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34)<br>โรคอื่นของจมูกและไซนัส  | รวม  | 15,510     | 23.86  | 2,781  | 23.83  | 4,253                 | 25.64  | 1,935  | 20.89  | 3,436              | 15.70  | 3,105    | 55.46  |
|                  |  | ชาย  | 8,402      | 26.34  | 1,507  | 26.30  | 2,296                 | 28.48  | 1,016  | 22.26  | 1,856              | 17.03  | 1,727    | 65.41  |
|                  |  | หญิง | 7,108      | 21.46  | 1,274  | 21.45  | 1,957                 | 22.95  | 919    | 19.55  | 1,580              | 14.37  | 1,378    | 46.57  |
| 173              | Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35)<br>โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ   | รวม  | 9,524      | 14.65  | 1,761  | 15.09  | 1,986                 | 11.97  | 1,260  | 13.60  | 2,825              | 12.90  | 1,692    | 30.22  |
|                  |  | ชาย  | 5,211      | 16.34  | 964    | 16.82  | 1,093                 | 13.56  | 653    | 14.31  | 1,448              | 13.29  | 1,053    | 39.88  |
|                  |  | หญิง | 4,313      | 13.02  | 797    | 13.42  | 893                   | 10.47  | 607    | 12.91  | 1,377              | 12.53  | 639      | 21.60  |
| 174              | Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน  | รวม  | 8,139      | 12.52  | 1,477  | 12.66  | 1,494                 | 9.01   | 1,101  | 11.88  | 2,427              | 11.09  | 1,640    | 29.29  |
|                  |  | ชาย  | 4,631      | 14.52  | 867    | 15.13  | 856                   | 10.62  | 640    | 14.02  | 1,383              | 12.69  | 885      | 33.52  |
|                  |  | หญิง | 3,508      | 10.59  | 610    | 10.27  | 638                   | 7.48   | 461    | 9.81   | 1,044              | 9.50   | 755      | 25.52  |
| 175              | Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44)<br>โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น | รวม  | 254,507    | 391.47 | 72,510 | 621.43 | 54,048                | 325.78 | 48,283 | 521.16 | 69,095             | 315.63 | 10,571   | 188.81 |
|                  |  | ชาย  | 187,127    | 586.71 | 45,948 | 801.92 | 41,839                | 518.96 | 36,474 | 799.09 | 54,716             | 502.07 | 8,150    | 308.70 |
|                  |  | หญิง | 67,380     | 203.45 | 26,562 | 447.28 | 12,209                | 143.16 | 11,809 | 251.25 | 14,379             | 130.80 | 2,421    | 81.82  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 176              | Asthma (J45-J46)<br>โรคหืด   | รวม  | 119,037    | 183.10 | 16,311 | 139.79 | 28,668                | 172.80 | 22,479 | 242.63 | 43,613             | 199.22 | 7,966    | 142.28 |
|                  |  | ชาย  | 44,763     | 140.35 | 6,093  | 106.34 | 10,707                | 132.81 | 8,013  | 175.55 | 16,774             | 153.92 | 3,176    | 120.30 |
|                  |  | หญิง | 74,274     | 224.26 | 10,218 | 172.06 | 17,961                | 210.61 | 14,466 | 307.78 | 26,839             | 244.14 | 4,790    | 161.89 |
| 177              | Bronchioectasis (J47)<br>โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง  | รวม  | 15,155     | 23.31  | 2,643  | 22.65  | 2,783                 | 16.77  | 1,887  | 20.37  | 6,651              | 30.38  | 1,191    | 21.27  |
|                  |  | ชาย  | 7,168      | 22.47  | 1,376  | 24.02  | 1,285                 | 15.94  | 795    | 17.42  | 3,104              | 28.48  | 608      | 23.03  |
|                  |  | หญิง | 7,987      | 24.12  | 1,267  | 21.34  | 1,498                 | 17.57  | 1,092  | 23.23  | 3,547              | 32.27  | 583      | 19.70  |
| 178              | Pneumoconiosis (J60-J65)<br>โรคฝุ่นสะสมในปอด   | รวม  | 269        | 0.41   | 24     | 0.21   | 33                    | 0.20   | 34     | 0.37   | 159                | 0.73   | 19       | 0.34   |
|                  |  | ชาย  | 214        | 0.67   | 16     | 0.28   | 16                    | 0.20   | 27     | 0.59   | 144                | 1.32   | 11       | 0.42   |
|                  |  | หญิง | 55         | 0.17   | 8      | 0.13   | 17                    | 0.20   | 7      | 0.15   | 15                 | 0.14   | 8        | 0.27   |
| 179              | Other diseases of the respiratory system<br>(J22, J66-J99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ                      | รวม  | 339,697    | 522.50 | 67,757 | 580.69 | 75,873                | 457.33 | 46,409 | 500.93 | 121,290            | 554.05 | 28,368   | 506.67 |
|                  |  | ชาย  | 198,864    | 623.51 | 39,111 | 682.59 | 43,281                | 536.85 | 27,742 | 607.79 | 72,984             | 669.69 | 15,746   | 596.41 |
|                  |  | หญิง | 140,833    | 425.23 | 28,646 | 482.37 | 32,592                | 382.17 | 18,667 | 397.16 | 48,306             | 439.41 | 12,622   | 426.60 |
| 180              | Dental caries (K02)<br>ฟันผุ   | รวม  | 8,184      | 12.59  | 1,589  | 13.62  | 1,941                 | 11.70  | 1,128  | 12.18  | 2,159              | 9.86   | 1,367    | 24.42  |
|                  |  | ชาย  | 4,425      | 13.87  | 875    | 15.27  | 1,065                 | 13.21  | 626    | 13.71  | 1,097              | 10.07  | 762      | 28.86  |
|                  |  | หญิง | 3,759      | 11.35  | 714    | 12.02  | 876                   | 10.27  | 502    | 10.68  | 1,062              | 9.66   | 605      | 20.45  |
| 181              | Other disorders of teeth and supporting<br>structures (K00-K01, K03-K08)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง | รวม  | 17,560     | 27.01  | 4,383  | 37.56  | 3,073                 | 18.52  | 2,002  | 21.61  | 6,105              | 27.89  | 1,997    | 35.67  |
|                  |  | ชาย  | 9,578      | 30.03  | 2,555  | 44.59  | 1,671                 | 20.73  | 1,086  | 23.79  | 3,088              | 28.34  | 1,178    | 44.62  |
|                  |  | หญิง | 7,982      | 24.10  | 1,828  | 30.78  | 1,402                 | 16.44  | 916    | 19.49  | 3,017              | 27.44  | 819      | 27.68  |

**ตาราง 20 ຈຳນວນແລະອັຕຣາຜູ້ປ່າຍໃນຕ່ອປະກາດ 100,000 ດານ (ຮມທຸກກາງວິນຈິຈັຍໂຮດ) ຈຳແນກຕາມສາເຫດຖາກປ່າຍ ເພດ ຮາຍກາດ ແລະກຽບທຶນທານຄຣ**  
**(ตารางກາງປ່າຍນັ້ນຊື່ຈຳແນກໂຮດຮ່ວມປະເທດ ຂັບແກ້ໄຂຄົງທີ 10 : 298 ກລຸ່ມໂຮດ ປີ ພ.ສ. 2559) (ຕ່ອ)**

ໜ່າຍໜັບ : ໄຮໂຮດ

| ຮທສ<br>ກລຸ່ມໂຮດ | ສາເຫດຖາກປ່າຍ (ໂຮດ/ກລຸ່ມໂຮດ)   | ເພດ  | ທີ່ປະເທດ |        | ເຫື້ອ  |        | ກລາງ (ມີຮ່ວມກຸງທຶນ) |        | ໄດ້    |        | ຕະວັນອອກເສີ່ງເຫື້ອ |        | ກຸງທຶນ |        |
|-----------------|---|------|----------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                 |   |      | ຈຳນວນ    | ອັຕຣາ  | ຈຳນວນ  | ອັຕຣາ  | ຈຳນວນ               | ອັຕຣາ  | ຈຳນວນ  | ອັຕຣາ  | ຈຳນວນ              | ອັຕຣາ  | ຈຳນວນ  | ອັຕຣາ  |
| 182             | Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14)<br>ໂຮຄອ່ນໆ ທີ່ ຂອງຫົ່ວ່າງ ຕ່ອມນ້ຳລາຍແລະຂາກຮ່າກີຣ                | ຮວມ  | 20,619   | 31.71  | 3,939  | 33.76  | 3,801               | 22.91  | 2,457  | 26.52  | 8,661              | 39.56  | 1,761  | 31.45  |
|                 |   | ໝາຍ  | 10,395   | 32.59  | 1,984  | 34.63  | 1,954               | 24.24  | 1,292  | 28.31  | 4,245              | 38.95  | 920    | 34.85  |
|                 |   | ໜູ້ງ | 10,224   | 30.87  | 1,955  | 32.92  | 1,847               | 21.66  | 1,165  | 24.79  | 4,416              | 40.17  | 841    | 28.42  |
| 183             | Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)<br>ແພລເປື່ອຍຂອງກະພາບອາຫາດດູໂອເດັ່ນໆ<br>ໂຮຄອ່ນໆ ທີ່ ຂອງຫົ່ວ່າງ ດູໂອເດັ່ນໆ                         | ຮວມ  | 40,926   | 62.95  | 9,475  | 81.20  | 11,226              | 67.67  | 3,399  | 36.69  | 13,075             | 59.73  | 3,751  | 67.00  |
|                 |   | ໝາຍ  | 26,671   | 83.62  | 6,121  | 106.83 | 7,049               | 87.43  | 2,075  | 45.46  | 9,121              | 83.69  | 2,305  | 87.31  |
|                 |   | ໜູ້ງ | 14,255   | 43.04  | 3,354  | 56.48  | 4,177               | 48.98  | 1,324  | 28.17  | 3,954              | 35.97  | 1,446  | 48.87  |
| 184             | Gastritis and duodenitis (K29)<br>ກະພາບອາຫາດອັກເສບແລະດູໂອເດັ່ນໆອັກເສບ   | ຮວມ  | 97,356   | 149.75 | 17,353 | 148.72 | 23,872              | 143.89 | 15,462 | 166.89 | 33,729             | 154.07 | 6,940  | 123.95 |
|                 |   | ໝາຍ  | 51,337   | 160.96 | 9,218  | 160.88 | 12,378              | 153.53 | 7,751  | 169.81 | 18,434             | 169.15 | 3,556  | 134.69 |
|                 |   | ໜູ້ງ | 46,019   | 138.95 | 8,135  | 136.99 | 11,494              | 134.78 | 7,711  | 164.06 | 15,295             | 139.13 | 3,384  | 114.37 |
| 185             | Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31)<br>ໂຮຄອ່ນໆ ທີ່ ຂອງຫົ່ວ່າງ ດູໂອເດັ່ນໆ ດູໂອເດັ່ນໆ ດູໂອເດັ່ນໆ | ຮວມ  | 167,053  | 256.95 | 31,496 | 269.93 | 31,610              | 190.53 | 31,541 | 340.45 | 65,761             | 300.40 | 6,645  | 118.68 |
|                 |   | ໝາຍ  | 72,527   | 227.40 | 13,513 | 235.84 | 13,642              | 169.21 | 13,490 | 295.55 | 28,624             | 262.65 | 3,258  | 123.40 |
|                 |   | ໜູ້ງ | 94,526   | 285.41 | 17,983 | 302.82 | 17,968              | 210.69 | 18,051 | 384.05 | 37,137             | 337.82 | 3,387  | 114.47 |
| 186             | Diseases of appEndix (K35-K38)<br>ໂຮຄອ່ນໆ ເສັ້າຕິ່ງ   | ຮວມ  | 93,714   | 144.15 | 19,234 | 164.84 | 19,616              | 118.24 | 12,623 | 136.25 | 36,478             | 166.63 | 5,763  | 102.93 |
|                 |   | ໝາຍ  | 44,090   | 138.24 | 9,118  | 159.13 | 9,511               | 117.97 | 6,081  | 133.23 | 16,418             | 150.65 | 2,962  | 112.19 |
|                 |   | ໜູ້ງ | 49,624   | 149.84 | 10,116 | 170.34 | 10,105              | 118.49 | 6,542  | 139.19 | 20,060             | 182.47 | 2,801  | 94.67  |
| 187             | Inguinal hernia (K40)<br>ໄຕເລື່ອນທີ່ປົກເຈັນຫົ່ວ່າງ  | ຮວມ  | 34,319   | 52.79  | 7,686  | 65.87  | 7,312               | 44.07  | 5,426  | 58.57  | 10,690             | 48.83  | 3,205  | 57.24  |
|                 |   | ໝາຍ  | 32,347   | 101.42 | 7,257  | 126.65 | 6,911               | 85.72  | 5,075  | 111.19 | 10,119             | 92.85  | 2,985  | 113.06 |
|                 |   | ໜູ້ງ | 1,972    | 5.95   | 429    | 7.22   | 401                 | 4.70   | 351    | 7.47   | 571                | 5.19   | 220    | 7.44   |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 188              | Other hernia (K41-K46)<br>ไส้เลื่อนอื่น ๆ  | รวม  | 6,282      | 9.66   | 1,191  | 10.21  | 1,677                 | 10.11  | 880    | 9.50   | 1,345              | 6.14   | 1,189    | 21.24  |
|                  |  | ชาย  | 2,819      | 8.84   | 523    | 9.13   | 700                   | 8.68   | 407    | 8.92   | 673                | 6.18   | 516      | 19.54  |
|                  |  | หญิง | 3,463      | 10.46  | 668    | 11.25  | 977                   | 11.46  | 473    | 10.06  | 672                | 6.11   | 673      | 22.75  |
| 189              | Crohn's disease and ulcerative colitis<br>(K50-K51)<br>โรคโกรนและลำไส้ใหญ่อักเสบแพลเปี้ยอย                             | รวม  | 1,192      | 1.83   | 203    | 1.74   | 268                   | 1.62   | 131    | 1.41   | 299                | 1.37   | 291      | 5.20   |
|                  |  | ชาย  | 596        | 1.87   | 84     | 1.47   | 122                   | 1.51   | 75     | 1.64   | 144                | 1.32   | 171      | 6.48   |
|                  |  | หญิง | 596        | 1.80   | 119    | 2.00   | 146                   | 1.71   | 56     | 1.19   | 155                | 1.41   | 120      | 4.06   |
| 190              | Paralytic ileus and intestinal obstruction<br>without hernia (K56)<br>ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน | รวม  | 39,569     | 60.86  | 8,259  | 70.78  | 8,078                 | 48.69  | 4,707  | 50.81  | 14,922             | 68.16  | 3,603    | 64.35  |
|                  |  | ชาย  | 23,704     | 74.32  | 5,010  | 87.44  | 4,777                 | 59.25  | 2,985  | 65.40  | 9,025              | 82.81  | 1,907    | 72.23  |
|                  |  | หญิง | 15,865     | 47.90  | 3,249  | 54.71  | 3,301                 | 38.71  | 1,722  | 36.64  | 5,897              | 53.64  | 1,696    | 57.32  |
| 191              | Diverticular disease of intestine (K57)<br>โรคติ่งเนื้อของลำไส้  | รวม  | 8,031      | 12.35  | 1,756  | 15.05  | 2,001                 | 12.06  | 783    | 8.45   | 2,033              | 9.29   | 1,458    | 26.04  |
|                  |  | ชาย  | 4,131      | 12.95  | 855    | 14.92  | 999                   | 12.39  | 425    | 9.31   | 1,095              | 10.05  | 757      | 28.67  |
|                  |  | หญิง | 3,900      | 11.78  | 901    | 15.17  | 1,002                 | 11.75  | 358    | 7.62   | 938                | 8.53   | 701      | 23.69  |
| 192              | Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67)<br>โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง                  | รวม  | 111,844    | 172.03 | 22,868 | 195.98 | 26,497                | 159.71 | 13,973 | 150.82 | 35,959             | 164.26 | 12,547   | 224.10 |
|                  |  | ชาย  | 61,266     | 192.09 | 12,605 | 219.99 | 13,983                | 173.44 | 7,747  | 169.73 | 20,298             | 186.25 | 6,633    | 251.24 |
|                  |  | หญิง | 50,578     | 152.72 | 10,263 | 172.82 | 12,514                | 146.74 | 6,226  | 132.46 | 15,661             | 142.46 | 5,914    | 199.88 |
| 193              | Alcoholic liver disease (K70)<br>โรคตับเกี่ยวกับอลกอฮอล์   | รวม  | 57,234     | 88.03  | 12,482 | 106.97 | 14,030                | 84.57  | 3,671  | 39.62  | 23,011             | 105.11 | 4,040    | 72.16  |
|                  |  | ชาย  | 45,716     | 143.34 | 10,141 | 176.99 | 10,348                | 128.35 | 3,267  | 71.58  | 18,625             | 170.90 | 3,335    | 126.32 |
|                  |  | หญิง | 11,518     | 34.78  | 2,341  | 39.42  | 3,682                 | 43.17  | 404    | 8.60   | 4,386              | 39.90  | 705      | 23.83  |
| 194              | Other disease of liver (K71-K77)<br>โรคอื่น ๆ ของตับ   | รวม  | 149,005    | 229.19 | 28,989 | 248.44 | 33,631                | 202.71 | 14,161 | 152.85 | 56,795             | 259.44 | 15,429   | 275.57 |
|                  |  | ชาย  | 93,620     | 293.53 | 18,973 | 331.13 | 19,815                | 245.78 | 8,763  | 191.98 | 36,858             | 338.20 | 9,211    | 348.89 |
|                  |  | หญิง | 55,385     | 167.23 | 10,016 | 168.66 | 13,816                | 162.00 | 5,398  | 114.85 | 19,937             | 181.36 | 6,218    | 210.16 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 195              | Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81)<br>โรคนิ่วในระบบนำดีและถุงน้ำดีอักเสบ                                      | รวม  | 67,742     | 104.20 | 12,708 | 108.91 | 14,586                | 87.92  | 5,950  | 64.22  | 27,050             | 123.56 | 7,448    | 133.03 |
|                  |   | ชาย  | 27,356     | 85.77  | 5,003  | 87.32  | 5,710                 | 70.83  | 2,266  | 49.64  | 11,143             | 102.25 | 3,234    | 122.49 |
|                  |   | หญิง | 40,386     | 121.94 | 7,705  | 129.75 | 8,876                 | 104.08 | 3,684  | 78.38  | 15,907             | 144.70 | 4,214    | 142.42 |
| 196              | Acute pancreatitis and other disease of<br>the pancreas (K85-K86)<br>ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน    | รวม  | 20,616     | 31.71  | 4,269  | 36.59  | 5,272                 | 31.78  | 1,998  | 21.57  | 6,690              | 30.56  | 2,387    | 42.63  |
|                  |   | ชาย  | 14,907     | 46.74  | 3,154  | 55.05  | 3,721                 | 46.15  | 1,323  | 28.99  | 5,161              | 47.36  | 1,548    | 58.63  |
|                  |   | หญิง | 5,709      | 17.24  | 1,115  | 18.78  | 1,551                 | 18.19  | 675    | 14.36  | 1,529              | 13.91  | 839      | 28.36  |
| 197              | Other diseases of the digestive system<br>(K82-K83, K87-K93)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร                            | รวม  | 131,609    | 202.43 | 30,200 | 258.82 | 31,868                | 192.09 | 13,981 | 150.91 | 44,020             | 201.08 | 11,540   | 206.11 |
|                  |   | ชาย  | 82,189     | 257.69 | 19,226 | 335.55 | 19,119                | 237.15 | 8,501  | 186.24 | 28,700             | 263.35 | 6,643    | 251.62 |
|                  |   | หญิง | 49,420     | 149.22 | 10,974 | 184.79 | 12,749                | 149.49 | 5,480  | 116.59 | 15,320             | 139.36 | 4,897    | 165.51 |
| 198              | Infection of the skin and subcutaneous<br>tissue (L00-L08)<br>โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง      | รวม  | 142,626    | 219.38 | 26,598 | 227.95 | 31,691                | 191.02 | 23,856 | 257.50 | 53,811             | 245.81 | 6,670    | 119.13 |
|                  |   | ชาย  | 80,035     | 250.94 | 15,257 | 266.28 | 16,924                | 209.92 | 13,264 | 290.60 | 31,005             | 284.50 | 3,585    | 135.79 |
|                  |   | หญิง | 62,591     | 188.99 | 11,341 | 190.97 | 14,767                | 173.15 | 10,592 | 225.35 | 22,806             | 207.45 | 3,085    | 104.27 |
| 199              | Other diseases of the skin and<br>subcutaneous tissue (L10-L99)<br>โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง        | รวม  | 116,441    | 179.10 | 23,971 | 205.44 | 29,881                | 180.11 | 14,397 | 155.40 | 35,572             | 162.49 | 12,620   | 225.40 |
|                  |   | ชาย  | 61,578     | 193.07 | 12,809 | 223.55 | 15,325                | 190.09 | 7,748  | 169.75 | 19,361             | 177.65 | 6,335    | 239.95 |
|                  |   | หญิง | 54,863     | 165.65 | 11,162 | 187.96 | 14,556                | 170.68 | 6,649  | 141.46 | 16,211             | 147.46 | 6,285    | 212.42 |
| 200              | Rheumatoid arthritis and other<br>inflammatory polyarthropathies (M05-M14)<br>ข้ออักเสบรูท์มาร์ตอยและข้ออักเสบหลายข้อ | รวม  | 159,880    | 245.92 | 40,866 | 350.23 | 33,121                | 199.64 | 15,185 | 163.90 | 59,600             | 272.25 | 11,108   | 198.40 |
|                  |   | ชาย  | 104,085    | 326.34 | 26,347 | 459.83 | 21,298                | 264.18 | 10,614 | 232.54 | 38,668             | 354.81 | 7,158    | 271.12 |
|                  |   | หญิง | 55,795     | 168.47 | 14,519 | 244.49 | 11,823                | 138.63 | 4,571  | 97.25  | 20,932             | 190.41 | 3,950    | 133.50 |
| 201              | Arthrosis (M15-M19)<br>โรคข้อเสื่อม   | รวม  | 37,386     | 57.50  | 9,408  | 80.63  | 11,862                | 71.50  | 2,794  | 30.16  | 5,805              | 26.52  | 7,517    | 134.26 |
|                  |   | ชาย  | 8,537      | 26.77  | 2,340  | 40.84  | 2,433                 | 30.18  | 648    | 14.20  | 1,616              | 14.83  | 1,500    | 56.82  |
|                  |   | หญิง | 28,849     | 87.11  | 7,068  | 119.02 | 9,429                 | 110.56 | 2,146  | 45.66  | 4,189              | 38.11  | 6,017    | 203.36 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 202              | Acquired deformities of limbs (M20-M21)<br>ความพิการของแขนขา  | รวม  | 1,918      | 2.95   | 313    | 2.68   | 338                   | 2.04   | 153    | 1.65   | 375                | 1.71   | 739      | 13.20  |
|                  |   | ชาย  | 883        | 2.77   | 133    | 2.32   | 140                   | 1.74   | 85     | 1.86   | 217                | 1.99   | 308      | 11.67  |
|                  |   | หญิง | 1,035      | 3.13   | 180    | 3.03   | 198                   | 2.32   | 68     | 1.45   | 158                | 1.44   | 431      | 14.57  |
| 203              | Other diseorders of joints (M00-M03,<br>M22-M25)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ                                | รวม  | 24,595     | 37.83  | 4,715  | 40.41  | 5,641                 | 34.00  | 2,408  | 25.99  | 8,529              | 38.96  | 3,302    | 58.98  |
|                  |   | ชาย  | 15,314     | 48.01  | 2,714  | 47.37  | 3,596                 | 44.60  | 1,538  | 33.70  | 5,221              | 47.91  | 2,245    | 85.03  |
|                  |   | หญิง | 9,281      | 28.02  | 2,001  | 33.70  | 2,045                 | 23.98  | 870    | 18.51  | 3,308              | 30.09  | 1,057    | 35.72  |
| 204              | Systemic connective tissue disorders<br>(M30-M36)<br>ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาณ                     | รวม  | 25,633     | 39.43  | 5,268  | 45.15  | 5,216                 | 31.44  | 2,601  | 28.07  | 9,278              | 42.38  | 3,270    | 58.40  |
|                  |   | ชาย  | 4,851      | 15.21  | 1,072  | 18.71  | 863                   | 10.70  | 400    | 8.76   | 1,853              | 17.00  | 663      | 25.11  |
|                  |   | หญิง | 20,782     | 62.75  | 4,196  | 70.66  | 4,353                 | 51.04  | 2,201  | 46.83  | 7,425              | 67.54  | 2,607    | 88.11  |
| 205              | Cervical and other intervertebral disc<br>disorders (M50-M51)<br>กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ | รวม  | 8,551      | 13.15  | 1,845  | 15.81  | 1,709                 | 10.30  | 968    | 10.45  | 2,869              | 13.11  | 1,160    | 20.72  |
|                  |   | ชาย  | 4,381      | 13.74  | 890    | 15.53  | 881                   | 10.93  | 503    | 11.02  | 1,524              | 13.98  | 583      | 22.08  |
|                  |   | หญิง | 4,170      | 12.59  | 955    | 16.08  | 828                   | 9.71   | 465    | 9.89   | 1,345              | 12.23  | 577      | 19.50  |
| 206              | Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54)<br>พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ   | รวม  | 61,163     | 94.08  | 16,039 | 137.46 | 12,592                | 75.90  | 5,768  | 62.26  | 19,239             | 87.88  | 7,525    | 134.40 |
|                  |   | ชาย  | 25,491     | 79.92  | 6,514  | 113.69 | 5,013                 | 62.18  | 2,521  | 55.23  | 8,403              | 77.10  | 3,040    | 115.15 |
|                  |   | หญิง | 35,672     | 107.71 | 9,525  | 160.39 | 7,579                 | 88.87  | 3,247  | 69.08  | 10,836             | 98.57  | 4,485    | 151.58 |
| 207              | Soft tissue disorders (M60-M79)<br>เนื้อเยื่อผิดปกติ  | รวม  | 84,804     | 130.44 | 17,509 | 150.06 | 15,398                | 92.81  | 10,992 | 118.65 | 35,861             | 163.81 | 5,044    | 90.09  |
|                  |   | ชาย  | 44,007     | 137.98 | 8,959  | 156.36 | 8,156                 | 101.17 | 5,405  | 118.42 | 18,999             | 174.33 | 2,488    | 94.24  |
|                  |   | หญิง | 40,797     | 123.18 | 8,550  | 143.97 | 7,242                 | 84.92  | 5,587  | 118.87 | 16,862             | 153.38 | 2,556    | 86.39  |
| 208              | Disorders of bone density and structure<br>(M80-M85)<br>ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อรากดูด             | รวม  | 15,814     | 24.32  | 3,380  | 28.97  | 3,189                 | 19.22  | 1,720  | 18.57  | 5,035              | 23.00  | 2,490    | 44.47  |
|                  |   | ชาย  | 5,218      | 16.36  | 996    | 17.38  | 1,068                 | 13.25  | 624    | 13.67  | 1,738              | 15.95  | 792      | 30.00  |
|                  |   | หญิง | 10,596     | 31.99  | 2,384  | 40.14  | 2,121                 | 24.87  | 1,096  | 23.32  | 3,297              | 29.99  | 1,698    | 57.39  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |          | เหนือ   |          | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |          |
|------------------|--|------|------------|----------|---------|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|----------|----------|----------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา    |
| 209              | Osteomyelitis (M86)<br>กระดูกอักเสบ  | รวม  | 10,666     | 16.41    | 2,131   | 18.26    | 2,343                 | 14.12  | 1,092  | 11.79  | 4,228              | 19.31    | 872      | 15.57    |
|                  |  | ชาย  | 6,583      | 20.64    | 1,294   | 22.58    | 1,457                 | 18.07  | 686    | 15.03  | 2,570              | 23.58    | 576      | 21.82    |
|                  |  | หญิง | 4,083      | 12.33    | 837     | 14.09    | 886                   | 10.39  | 406    | 8.64   | 1,658              | 15.08    | 296      | 10.00    |
| 210              | Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาณ | รวม  | 13,275     | 20.42    | 2,539   | 21.76    | 3,262                 | 19.66  | 1,731  | 18.68  | 3,860              | 17.63    | 1,883    | 33.63    |
|                  |  | ชาย  | 6,875      | 21.56    | 1,296   | 22.62    | 1,638                 | 20.32  | 876    | 19.19  | 2,127              | 19.52    | 938      | 35.53    |
|                  |  | หญิง | 6,400      | 19.32    | 1,243   | 20.93    | 1,624                 | 19.04  | 855    | 18.19  | 1,733              | 15.76    | 945      | 31.94    |
| 211              | Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01)<br>กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว                    | รวม  | 4,609      | 7.09     | 750     | 6.43     | 651                   | 3.92   | 937    | 10.11  | 1,979              | 9.04     | 292      | 5.22     |
|                  |  | ชาย  | 2,768      | 8.68     | 443     | 7.73     | 393                   | 4.87   | 561    | 12.29  | 1,216              | 11.16    | 155      | 5.87     |
|                  |  | หญิง | 1,841      | 5.56     | 307     | 5.17     | 258                   | 3.03   | 376    | 8.00   | 763                | 6.94     | 137      | 4.63     |
| 212              | Other glomerular diseases (N02-N08)<br>โรคของหน่วยไตอื่น ๆ   | รวม  | 40,112     | 61.70    | 5,508   | 47.20    | 7,024                 | 42.34  | 6,111  | 65.96  | 16,768             | 76.60    | 4,701    | 83.96    |
|                  |  | ชาย  | 16,024     | 50.24    | 2,266   | 39.55    | 2,864                 | 35.52  | 2,642  | 57.88  | 6,233              | 57.19    | 2,019    | 76.47    |
|                  |  | หญิง | 24,088     | 72.73    | 3,242   | 54.59    | 4,160                 | 48.78  | 3,469  | 73.81  | 10,535             | 95.83    | 2,682    | 90.65    |
| 213              | Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16)<br>โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต   | รวม  | 107,289    | 165.03   | 23,801  | 203.98   | 22,826                | 137.59 | 15,196 | 164.02 | 39,021             | 178.25   | 6,445    | 115.11   |
|                  |  | ชาย  | 39,774     | 124.70   | 9,198   | 160.53   | 7,240                 | 89.80  | 5,019  | 109.96 | 15,919             | 146.07   | 2,398    | 90.83    |
|                  |  | หญิง | 67,515     | 203.86   | 14,603  | 245.90   | 15,586                | 182.76 | 10,177 | 216.52 | 23,102             | 210.15   | 4,047    | 136.78   |
| 214              | Renal failure (N17-N19)<br>ไตวาย   | รวม  | 710,477    | 1,092.81 | 143,177 | 1,227.06 | 156,096               | 940.89 | 72,709 | 784.80 | 288,613            | 1,318.38 | 49,882   | 890.93   |
|                  |  | ชาย  | 354,548    | 1,111.63 | 73,914  | 1,290.00 | 76,761                | 952.13 | 38,371 | 840.65 | 138,948            | 1,274.97 | 26,554   | 1,005.79 |
|                  |  | หญิง | 355,929    | 1,074.70 | 69,263  | 1,166.33 | 79,335                | 930.26 | 34,338 | 730.57 | 149,665            | 1,361.42 | 23,328   | 788.44   |
| 215              | Urolithiasis (N20-N23)<br>นิวไนระบบทางเดินปัสสาวะ  | รวม  | 58,209     | 89.53    | 14,853  | 127.29   | 7,362                 | 44.38  | 7,649  | 82.56  | 25,645             | 117.15   | 2,700    | 48.22    |
|                  |  | ชาย  | 35,903     | 112.57   | 9,666   | 168.70   | 4,156                 | 51.55  | 4,473  | 98.00  | 16,067             | 147.43   | 1,541    | 58.37    |
|                  |  | หญิง | 22,306     | 67.35    | 5,187   | 87.34    | 3,206                 | 37.59  | 3,176  | 67.57  | 9,578              | 87.13    | 1,159    | 39.17    |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการริบินจัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยน้ำหนักจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
 (ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 223              | Disorders of breast (N60-N64)<br>ความผิดปกติของเต้านม  | รวม  | 9,124      | 14.03 | 1,924 | 16.49 | 1,653                 | 9.96  | 1,879 | 20.28 | 2,921              | 13.34 | 747      | 13.34  |
|                  |  | ชาย  | 569        | 1.78  | 118   | 2.06  | 112                   | 1.39  | 107   | 2.34  | 166                | 1.52  | 66       | 2.50   |
|                  |  | หญิง | 8,555      | 25.83 | 1,806 | 30.41 | 1,541                 | 18.07 | 1,772 | 37.70 | 2,755              | 25.06 | 681      | 23.02  |
| 224              | Salphingitis and oophoritis (N70)<br>ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ   | รวม  | 2,693      | 8.13  | 412   | 6.94  | 631                   | 7.40  | 311   | 6.62  | 954                | 8.68  | 385      | 13.01  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 2,693      | 8.13  | 412   | 6.94  | 631                   | 7.40  | 311   | 6.62  | 954                | 8.68  | 385      | 13.01  |
| 225              | Inflammatory disease of cervix uteri (N72)<br>ปากมดลูกอักเสบ   | รวม  | 808        | 2.44  | 198   | 3.33  | 109                   | 1.28  | 87    | 1.85  | 223                | 2.03  | 191      | 6.46   |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 808        | 2.44  | 198   | 3.33  | 109                   | 1.28  | 87    | 1.85  | 223                | 2.03  | 191      | 6.46   |
| 226              | Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77)<br>การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี                                  | รวม  | 21,089     | 63.68 | 3,634 | 61.19 | 4,832                 | 56.66 | 2,998 | 63.78 | 7,441              | 67.69 | 2,184    | 73.81  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 21,089     | 63.68 | 3,634 | 61.19 | 4,832                 | 56.66 | 2,998 | 63.78 | 7,441              | 67.69 | 2,184    | 73.81  |
| 227              | Endometriosis (N80)<br>เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่  | รวม  | 13,682     | 41.31 | 1,954 | 32.90 | 2,083                 | 24.42 | 1,747 | 37.17 | 4,470              | 40.66 | 3,428    | 115.86 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 13,682     | 41.31 | 1,954 | 32.90 | 2,083                 | 24.42 | 1,747 | 37.17 | 4,470              | 40.66 | 3,428    | 115.86 |
| 228              | Female genital prolapse (N81)<br>การหล่อนตัวออกมากของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี   | รวม  | 4,939      | 14.91 | 991   | 16.69 | 964                   | 11.30 | 463   | 9.85  | 1,789              | 16.27 | 732      | 24.74  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 4,939      | 14.91 | 991   | 16.69 | 964                   | 11.30 | 463   | 9.85  | 1,789              | 16.27 | 732      | 24.74  |
| 229              | Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83)<br>ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่ และเอ็นยีดมดลูก | รวม  | 9,328      | 28.17 | 1,485 | 25.01 | 2,127                 | 24.94 | 1,331 | 28.32 | 3,102              | 28.22 | 1,283    | 43.36  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 9,328      | 28.17 | 1,485 | 25.01 | 2,127                 | 24.94 | 1,331 | 28.32 | 3,102              | 28.22 | 1,283    | 43.36  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 230              | Disorder of menstruation (N91-N92)<br>ความผิดปกติของประจำเดือน   | รวม  | 10,113     | 30.54 | 1,616 | 27.21 | 2,060                 | 24.16 | 2,111 | 44.91  | 3,862              | 35.13 | 464      | 15.68 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 10,113     | 30.54 | 1,616 | 27.21 | 2,060                 | 24.16 | 2,111 | 44.91  | 3,862              | 35.13 | 464      | 15.68 |
| 231              | Menopausal and other perimenopausal disorders (N95)<br>การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน                       | รวม  | 4,318      | 13.04 | 861   | 14.50 | 912                   | 10.69 | 806   | 17.15  | 1,448              | 13.17 | 291      | 9.84  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 4,318      | 13.04 | 861   | 14.50 | 912                   | 10.69 | 806   | 17.15  | 1,448              | 13.17 | 291      | 9.84  |
| 232              | Female infertility (N97)<br>ภาวะมีบุตรยากในสตรี  | รวม  | 307        | 0.93  | 36    | 0.61  | 23                    | 0.27  | 58    | 1.23   | 81                 | 0.74  | 109      | 3.68  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 307        | 0.93  | 36    | 0.61  | 23                    | 0.27  | 58    | 1.23   | 81                 | 0.74  | 109      | 3.68  |
| 233              | Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสีบพันธุ์ | รวม  | 24,474     | 73.90 | 4,775 | 80.41 | 4,639                 | 54.40 | 4,420 | 94.04  | 8,015              | 72.91 | 2,625    | 88.72 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 24,474     | 73.90 | 4,775 | 80.41 | 4,639                 | 54.40 | 4,420 | 94.04  | 8,015              | 72.91 | 2,625    | 88.72 |
| 234              | Spontaneous abortion (O03)<br>แท้งเอง  | รวม  | 13,017     | 39.30 | 1,676 | 28.22 | 3,037                 | 35.61 | 3,053 | 64.95  | 4,273              | 38.87 | 978      | 33.05 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 13,017     | 39.30 | 1,676 | 28.22 | 3,037                 | 35.61 | 3,053 | 64.95  | 4,273              | 38.87 | 978      | 33.05 |
| 235              | Medical abortion (O04)<br>การทำแท้งโดยแพทย์  | รวม  | 1,498      | 4.52  | 272   | 4.58  | 205                   | 2.40  | 214   | 4.55   | 712                | 6.48  | 95       | 3.21  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 1,498      | 4.52  | 272   | 4.58  | 205                   | 2.40  | 214   | 4.55   | 712                | 6.48  | 95       | 3.21  |
| 236              | Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08)<br>การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการทำแท้ง                            | รวม  | 28,297     | 85.44 | 4,622 | 77.83 | 6,159                 | 72.22 | 7,323 | 155.80 | 8,436              | 76.74 | 1,757    | 59.38 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 28,297     | 85.44 | 4,622 | 77.83 | 6,159                 | 72.22 | 7,323 | 155.80 | 8,436              | 76.74 | 1,757    | 59.38 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ                | ทั้งประเทศ              |                          | เหนือ                 |                          | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |                          | ใต้                   |                          | ตะวันออกเฉียงเหนือ    |                          | กรุงเทพฯ            |                          |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |  |                    | จำนวน                   | อัตรา                    | จำนวน                 | อัตรา                    | จำนวน                 | อัตรา                    | จำนวน                 | อัตรา                    | จำนวน                 | อัตรา                    | จำนวน               | อัตรา                    |
| 237              | Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16)<br><br>การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด                      | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 24,664<br>0<br>24,664   | 74.47<br>0.00<br>74.47   | 3,515<br>0<br>3,515   | 59.19<br>0.00<br>59.19   | 5,818<br>0<br>5,818   | 68.22<br>0.00<br>68.22   | 6,644<br>0<br>6,644   | 141.36<br>0.00<br>141.36 | 7,311<br>0<br>7,311   | 66.50<br>0.00<br>66.50   | 1,376<br>0<br>1,376 | 46.51<br>0.00<br>46.51   |
| 238              | Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46)<br><br>รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 5,829<br>0<br>5,829     | 17.60<br>0.00<br>17.60   | 948<br>0<br>948       | 15.96<br>0.00<br>15.96   | 1,170<br>0<br>1,170   | 13.72<br>0.00<br>13.72   | 1,418<br>0<br>1,418   | 30.17<br>0.00<br>30.17   | 1,969<br>0<br>1,969   | 17.91<br>0.00<br>17.91   | 324<br>0<br>324     | 10.95<br>0.00<br>10.95   |
| 239              | Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48)<br><br>การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำครรภ์ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 148,810<br>0<br>148,810 | 449.32<br>0.00<br>449.32 | 23,518<br>0<br>23,518 | 396.02<br>0.00<br>396.02 | 32,297<br>0<br>32,297 | 378.71<br>0.00<br>378.71 | 35,473<br>0<br>35,473 | 754.72<br>0.00<br>754.72 | 48,238<br>0<br>48,238 | 438.79<br>0.00<br>438.79 | 9,284<br>0<br>9,284 | 313.78<br>0.00<br>313.78 |
| 240              | Obstructed labour (O64-O66)<br><br>การคลอดติดขัด   | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 24,102<br>0<br>24,102   | 72.77<br>0.00<br>72.77   | 3,727<br>0<br>3,727   | 62.76<br>0.00<br>62.76   | 4,730<br>0<br>4,730   | 55.46<br>0.00<br>55.46   | 4,405<br>0<br>4,405   | 93.72<br>0.00<br>93.72   | 9,866<br>0<br>9,866   | 89.75<br>0.00<br>89.75   | 1,374<br>0<br>1,374 | 46.44<br>0.00<br>46.44   |
| 241              | Postpartum haemorrhage (O72)<br><br>ตกเลือดหลังคลอด  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 12,077<br>0<br>12,077   | 36.47<br>0.00<br>36.47   | 2,031<br>0<br>2,031   | 34.20<br>0.00<br>34.20   | 2,617<br>0<br>2,617   | 30.69<br>0.00<br>30.69   | 3,037<br>0<br>3,037   | 64.61<br>0.00<br>64.61   | 3,855<br>0<br>3,855   | 35.07<br>0.00<br>35.07   | 537<br>0<br>537     | 18.15<br>0.00<br>18.15   |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |          | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|----------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา    | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 242              | Other complications of pregnancy and delivery<br>(O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)<br>ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด  | รวม  | 293,228    | 885.38 | 43,914 | 739.47 | 63,871                | 748.94 | 73,400 | 1,561.64 | 94,597             | 860.50 | 17,446   | 589.64 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00     | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 293,228    | 885.38 | 43,914 | 739.47 | 63,871                | 748.94 | 73,400 | 1,561.64 | 94,597             | 860.50 | 17,446   | 589.64 |
| 243              | Single spontaneous delivery (O80)<br>การคลอดของครรภ์เดียว  | รวม  | 232,601    | 702.32 | 36,085 | 607.64 | 51,680                | 605.99 | 56,169 | 1,195.04 | 78,133             | 710.73 | 10,534   | 356.03 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00     | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 232,601    | 702.32 | 36,085 | 607.64 | 51,680                | 605.99 | 56,169 | 1,195.04 | 78,133             | 710.73 | 10,534   | 356.03 |
| 244              | Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified (O85-O99)<br>ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบรอยในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด        | รวม  | 67,990     | 205.29 | 9,020  | 151.89 | 13,897                | 162.95 | 17,669 | 375.92   | 21,994             | 200.07 | 5,410    | 182.85 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00     | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 67,990     | 205.29 | 9,020  | 151.89 | 13,897                | 162.95 | 17,669 | 375.92   | 21,994             | 200.07 | 5,410    | 182.85 |
| 245              | Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04)<br>ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางมาตรา   | รวม  | 30,315     | 46.63  | 3,779  | 32.39  | 4,723                 | 28.47  | 4,843  | 52.27    | 14,537             | 66.41  | 2,433    | 43.46  |
|                  |  | ชาย  | 15,926     | 49.93  | 1,993  | 34.78  | 2,499                 | 31.00  | 2,593  | 56.81    | 7,573              | 69.49  | 1,268    | 48.03  |
|                  |  | หญิง | 14,389     | 43.45  | 1,786  | 30.07  | 2,224                 | 26.08  | 2,250  | 47.87    | 6,964              | 63.35  | 1,165    | 39.37  |
| 246              | Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07)<br>ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย | รวม  | 69,569     | 107.01 | 10,219 | 87.58  | 17,785                | 107.20 | 12,509 | 135.02   | 20,827             | 95.14  | 8,229    | 146.98 |
|                  |  | ชาย  | 34,619     | 108.54 | 5,127  | 89.48  | 8,944                 | 110.94 | 6,255  | 137.04   | 10,087             | 92.56  | 4,206    | 159.31 |
|                  |  | หญิง | 34,950     | 105.53 | 5,092  | 85.74  | 8,841                 | 103.67 | 6,254  | 133.06   | 10,740             | 97.70  | 4,023    | 135.97 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 247              | Birth trauma (P10-P15)<br>บาดเจ็บจากการคลอด  | รวม  | 8,282      | 12.74  | 1,378  | 11.81  | 2,004                 | 12.08  | 858    | 9.26   | 2,426              | 11.08  | 1,616    | 28.86  |
|                  |  | ชาย  | 4,925      | 15.44  | 833    | 14.54  | 1,201                 | 14.90  | 531    | 11.63  | 1,416              | 12.99  | 944      | 35.76  |
|                  |  | หญิง | 3,357      | 10.14  | 545    | 9.18   | 803                   | 9.42   | 327    | 6.96   | 1,010              | 9.19   | 672      | 22.71  |
| 248              | Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21)<br>ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแօสฟิกเชีย<br>เมื่อแรกเกิด   | รวม  | 13,906     | 21.39  | 1,661  | 14.24  | 3,087                 | 18.61  | 1,948  | 21.03  | 4,808              | 21.96  | 2,402    | 42.90  |
|                  |  | ชาย  | 7,697      | 24.13  | 921    | 16.07  | 1,761                 | 21.84  | 1,123  | 24.60  | 2,588              | 23.75  | 1,304    | 49.39  |
|                  |  | หญิง | 6,209      | 18.75  | 740    | 12.46  | 1,326                 | 15.55  | 825    | 17.55  | 2,220              | 20.19  | 1,098    | 37.11  |
| 249              | Other respiratory disorders originating in the<br>perinatal period (P22-P28)<br>ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด | รวม  | 72,906     | 112.14 | 8,932  | 76.55  | 19,178                | 115.60 | 13,596 | 146.75 | 22,063             | 100.78 | 9,137    | 163.19 |
|                  |  | ชาย  | 43,363     | 135.96 | 5,336  | 93.13  | 11,450                | 142.02 | 8,093  | 177.31 | 13,204             | 121.16 | 5,280    | 199.99 |
|                  |  | หญิง | 29,543     | 89.20  | 3,596  | 60.55  | 7,728                 | 90.62  | 5,503  | 117.08 | 8,859              | 80.59  | 3,857    | 130.36 |
| 250              | Congenital infectious and parasitic diseases<br>(P35-P37)<br>การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรารถิต                         | รวม  | 36,244     | 55.75  | 4,389  | 37.61  | 10,008                | 60.32  | 5,827  | 62.90  | 12,182             | 55.65  | 3,838    | 68.55  |
|                  |  | ชาย  | 19,966     | 62.60  | 2,443  | 42.64  | 5,492                 | 68.12  | 3,248  | 71.16  | 6,652              | 61.04  | 2,131    | 80.72  |
|                  |  | หญิง | 16,278     | 49.15  | 1,946  | 32.77  | 4,516                 | 52.95  | 2,579  | 54.87  | 5,530              | 50.30  | 1,707    | 57.69  |
| 251              | Other infections specific to the perinatal period<br>(P38-P39)<br>การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด               | รวม  | 5,581      | 8.58   | 722    | 6.19   | 1,698                 | 10.23  | 1,031  | 11.13  | 1,714              | 7.83   | 416      | 7.43   |
|                  |  | ชาย  | 3,170      | 9.94   | 427    | 7.45   | 985                   | 12.22  | 562    | 12.31  | 948                | 8.70   | 248      | 9.39   |
|                  |  | หญิง | 2,411      | 7.28   | 295    | 4.97   | 713                   | 8.36   | 469    | 9.98   | 766                | 6.97   | 168      | 5.68   |
| 252              | Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)<br>โรคเม็ดเลือดแตกของ胎兒ในครรภ์และแรกเกิด                                 | รวม  | 8,131      | 12.51  | 896    | 7.68   | 2,785                 | 16.79  | 1,096  | 11.83  | 2,565              | 11.72  | 789      | 14.09  |
|                  |  | ชาย  | 4,182      | 13.11  | 480    | 8.38   | 1,483                 | 18.39  | 527    | 11.55  | 1,300              | 11.93  | 392      | 14.85  |
|                  |  | หญิง | 3,949      | 11.92  | 416    | 7.01   | 1,302                 | 15.27  | 569    | 12.11  | 1,265              | 11.51  | 397      | 13.42  |
| 253              | Other conditions originating in the perinatal period<br>(P08, P29, P50-P54, P56-P96)<br>ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด     | รวม  | 248,064    | 381.56 | 38,309 | 328.32 | 63,716                | 384.06 | 35,784 | 386.24 | 83,213             | 380.12 | 27,042   | 482.99 |
|                  |  | ชาย  | 136,205    | 427.05 | 21,210 | 370.17 | 35,426                | 439.42 | 19,587 | 429.12 | 45,203             | 414.78 | 14,779   | 559.79 |
|                  |  | หญิง | 111,859    | 337.75 | 17,099 | 287.93 | 28,290                | 331.72 | 16,197 | 344.60 | 38,010             | 345.76 | 12,263   | 414.46 |

ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยน้ำหนักจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

**ตาราง 20 ຈຳນວນແລະອັຕຣາຜູ້ປ່າຍໃນຕ່ອປະກາງ 100,000 ດນ (ຮມທຸກກາງວິນຈັຍໂຮດ) ຈຳແນກຕາມສາເຫດກາງປ່າຍ ເພດ ຮາຍກາດ ແລະກຽບທັນທານດາ**  
**(ตารางກາງປ່າຍນັ້ນຊື່ຈຳແນກໂຮດຮ່ວມປະເທດ ຂັບແກ້ໄຂຄົງທີ 10 : 298 ກລຸ່ມໂຮດ ປີ ພ.ສ. 2559) (ຕ່ອ)**

ໜ່າຍໜັບ : ໄຮໂຮດ

| ຮັດສ<br>ກລຸ່ມໂຮດ | ສາເຫດກາງປ່າຍ (ໂຮດ/ກລຸ່ມໂຮດ)   | ເພດ  | ທັງປະເທດ |       | ເໜືອ  |       | ກລາງ (ມີຮ່ວມກຽບທັນທານ) |       | ໄຕ    |       | ຕະວັນອອກເສີຍເໜືອ |       | ກຽບທັນທານ |       |
|------------------|---|------|----------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-----------|-------|
|                  |   |      | ຈຳນວນ    | ອັຕຣາ | ຈຳນວນ | ອັຕຣາ | ຈຳນວນ                  | ອັຕຣາ | ຈຳນວນ | ອັຕຣາ | ຈຳນວນ            | ອັຕຣາ | ຈຳນວນ     | ອັຕຣາ |
| 261              | Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64)<br>ຄວາມຜິດປົກຕິອື່ນ ຖໍ່ອື່ນ ຂອງຮະບບສືບພັນຮູ້ແລະທາງເດີນປັ້ສສາວະ                                   | ຮວມ  | 5,189    | 7.98  | 771   | 6.61  | 813                    | 4.90  | 705   | 7.61  | 1,221            | 5.58  | 1,679     | 29.99 |
|                  |   | ໝາຍ  | 3,316    | 10.40 | 455   | 7.94  | 479                    | 5.94  | 472   | 10.34 | 814              | 7.47  | 1,096     | 41.51 |
|                  |   | ຫຼົງ | 1,873    | 5.66  | 316   | 5.32  | 334                    | 3.92  | 233   | 4.96  | 407              | 3.70  | 583       | 19.70 |
| 262              | Congenital deformities of hip (Q65)<br>ຄວາມພິກາຕະແກ່ກຳນົດຂອງສະໂພກ   | ຮວມ  | 378      | 0.58  | 35    | 0.30  | 48                     | 0.29  | 42    | 0.45  | 96               | 0.44  | 157       | 2.80  |
|                  |   | ໝາຍ  | 131      | 0.41  | 11    | 0.19  | 24                     | 0.30  | 9     | 0.20  | 34               | 0.31  | 53        | 2.01  |
|                  |   | ຫຼົງ | 247      | 0.75  | 24    | 0.40  | 24                     | 0.28  | 33    | 0.70  | 62               | 0.56  | 104       | 3.51  |
| 263              | Congenital deformities of feet (Q66)<br>ຄວາມພິກາຕະແກ່ກຳນົດຂອງເທົ່າ  | ຮວມ  | 2,666    | 4.10  | 314   | 2.69  | 631                    | 3.80  | 452   | 4.88  | 840              | 3.84  | 429       | 7.66  |
|                  |   | ໝາຍ  | 1,342    | 4.21  | 167   | 2.91  | 297                    | 3.68  | 234   | 5.13  | 429              | 3.94  | 215       | 8.14  |
|                  |   | ຫຼົງ | 1,324    | 4.00  | 147   | 2.48  | 334                    | 3.92  | 218   | 4.64  | 411              | 3.74  | 214       | 7.23  |
| 264              | Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79)<br>ຄວາມຜິດປົກຕິແລະຄວາມພິກາຕະແກ່ກຳນົດອື່ນ ຖໍ່ອື່ນ ຂອງຮະບບກລຳມານີ້ແລະໂຄຮງຮ່າງ | ຮວມ  | 5,909    | 9.09  | 869   | 7.45  | 1,007                  | 6.07  | 708   | 7.64  | 1,647            | 7.52  | 1,678     | 29.97 |
|                  |   | ໝາຍ  | 3,221    | 10.10 | 479   | 8.36  | 559                    | 6.93  | 401   | 8.79  | 879              | 8.07  | 903       | 34.20 |
|                  |   | ຫຼົງ | 2,688    | 8.12  | 390   | 6.57  | 448                    | 5.25  | 307   | 6.53  | 768              | 6.99  | 775       | 26.19 |
| 265              | Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)<br>ຄວາມຜິດປົກຕິແຕ່ກຳນົດອື່ນ ຖໍ່ອື່ນ  | ຮວມ  | 10,854   | 16.70 | 1,450 | 12.43 | 1,736                  | 10.46 | 1,590 | 17.16 | 2,583            | 11.80 | 3,495     | 62.42 |
|                  |   | ໝາຍ  | 5,784    | 18.13 | 771   | 13.46 | 926                    | 11.49 | 865   | 18.95 | 1,397            | 12.82 | 1,825     | 69.13 |
|                  |   | ຫຼົງ | 5,070    | 15.31 | 679   | 11.43 | 810                    | 9.50  | 725   | 15.42 | 1,186            | 10.79 | 1,670     | 56.44 |
| 266              | Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99)<br>ຄວາມຜິດປົກຕິຂອງໂຄຣໂນໂໂມທີ່ມີເມື່ອຮ້າສະບັໄວ້ທີ່ອື່ນ   | ຮວມ  | 6,721    | 10.34 | 1,029 | 8.82  | 1,526                  | 9.20  | 993   | 10.72 | 1,887            | 8.62  | 1,286     | 22.97 |
|                  |   | ໝາຍ  | 3,569    | 11.19 | 556   | 9.70  | 769                    | 9.54  | 562   | 12.31 | 959              | 8.80  | 723       | 27.39 |
|                  |   | ຫຼົງ | 3,152    | 9.52  | 473   | 7.96  | 757                    | 8.88  | 431   | 9.17  | 928              | 8.44  | 563       | 19.03 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |          | เหนือ   |          | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |          | ใต้     |          | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|----------|---------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|--------------------|----------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน                 | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา  |
| 267              | Abdominal and pelvic pain (R10)<br>ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน  | รวม  | 30,294     | 46.60    | 8,192   | 70.21    | 5,734                 | 34.56    | 5,941   | 64.13    | 9,382              | 42.86    | 1,045    | 18.66  |
|                  |   | ชาย  | 12,004     | 37.64    | 3,414   | 59.58    | 2,192                 | 27.19    | 2,273   | 49.80    | 3,758              | 34.48    | 367      | 13.90  |
|                  |   | หญิง | 18,290     | 55.23    | 4,778   | 80.46    | 3,542                 | 41.53    | 3,668   | 78.04    | 5,624              | 51.16    | 678      | 22.92  |
| 268              | Fever of unknown origin (R50)<br>ไข้ไม่ทราบสาเหตุ   | รวม  | 97,308     | 149.67   | 20,707  | 177.46   | 15,172                | 91.45    | 13,637  | 147.19   | 42,710             | 195.10   | 5,082    | 90.77  |
|                  |   | ชาย  | 50,434     | 158.13   | 11,072  | 193.24   | 7,647                 | 94.85    | 6,886   | 150.86   | 22,189             | 203.60   | 2,640    | 100.00 |
|                  |   | หญิง | 46,874     | 141.53   | 9,635   | 162.25   | 7,525                 | 88.24    | 6,751   | 143.63   | 20,521             | 186.67   | 2,442    | 82.53  |
| 269              | Senility (R54)<br>痴呆症   | รวม  | 2,139      | 3.29     | 378     | 3.24     | 793                   | 4.78     | 161     | 1.74     | 373                | 1.70     | 434      | 7.75   |
|                  |   | ชาย  | 864        | 2.71     | 150     | 2.62     | 288                   | 3.57     | 77      | 1.69     | 153                | 1.40     | 196      | 7.42   |
|                  |   | หญิง | 1,275      | 3.85     | 228     | 3.84     | 505                   | 5.92     | 84      | 1.79     | 220                | 2.00     | 238      | 8.04   |
| 270              | Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99)<br>อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรั้งสะบุไว้ | รวม  | 768,087    | 1,181.43 | 144,952 | 1,242.27 | 166,225               | 1,001.94 | 119,296 | 1,287.65 | 284,260            | 1,298.50 | 53,354   | 952.94 |
|                  |   | ชาย  | 397,101    | 1,245.05 | 75,911  | 1,324.86 | 85,227                | 1,057.14 | 58,598  | 1,283.80 | 149,111            | 1,368.23 | 28,254   | #####  |
|                  |   | หญิง | 370,986    | 1,120.16 | 69,041  | 1,162.59 | 80,998                | 949.76   | 60,698  | 1,291.40 | 135,149            | 1,229.38 | 25,100   | 848.33 |
| 271              | Fracture of skull and facial bones (S02)กระดูกแทกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า   | รวม  | 34,935     | 53.74    | 5,714   | 48.97    | 10,939                | 65.94    | 5,136   | 55.44    | 9,771              | 44.63    | 3,375    | 60.28  |
|                  |   | ชาย  | 28,271     | 88.64    | 4,636   | 80.91    | 8,770                 | 108.78   | 3,925   | 85.99    | 8,157              | 74.85    | 2,783    | 105.41 |
|                  |   | หญิง | 6,664      | 20.12    | 1,078   | 18.15    | 2,169                 | 25.43    | 1,211   | 25.76    | 1,614              | 14.68    | 592      | 20.01  |
| 272              | Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08)<br>กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก  | รวม  | 29,873     | 45.95    | 7,011   | 60.09    | 8,181                 | 49.31    | 4,190   | 45.23    | 7,967              | 36.39    | 2,524    | 45.08  |
|                  |   | ชาย  | 19,962     | 62.59    | 4,691   | 81.87    | 5,342                 | 66.26    | 2,802   | 61.39    | 5,491              | 50.38    | 1,636    | 61.97  |
|                  |   | หญิง | 9,911      | 29.93    | 2,320   | 39.07    | 2,839                 | 33.29    | 1,388   | 29.53    | 2,476              | 22.52    | 888      | 30.01  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 273              | Fracture of femur (S72)<br>กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว  | รวม  | 40,711     | 62.62  | 10,040 | 86.05  | 11,819                | 71.24  | 5,184  | 55.95  | 9,395              | 42.92  | 4,273    | 76.32  |
|                  |   | ชาย  | 18,362     | 57.57  | 4,050  | 70.68  | 5,582                 | 69.24  | 2,516  | 55.12  | 4,395              | 40.33  | 1,819    | 68.90  |
|                  |   | หญิง | 22,349     | 67.48  | 5,990  | 100.87 | 6,237                 | 73.13  | 2,668  | 56.76  | 5,000              | 45.48  | 2,454    | 82.94  |
| 274              | Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82,<br>S92, T10, T12)<br>กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ   | รวม  | 129,859    | 199.74 | 26,086 | 223.56 | 35,349                | 213.07 | 17,328 | 187.03 | 40,515             | 185.07 | 10,581   | 188.98 |
|                  |   | ชาย  | 87,721     | 275.04 | 16,941 | 295.67 | 24,019                | 297.93 | 11,464 | 251.16 | 27,913             | 256.13 | 7,384    | 279.68 |
|                  |   | หญิง | 42,138     | 127.23 | 9,145  | 153.99 | 11,330                | 132.85 | 5,864  | 124.76 | 12,602             | 114.63 | 3,197    | 108.05 |
| 275              | Fracture involving multiple body regions (T02)<br>กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย   | รวม  | 94         | 0.14   | 5      | 0.04   | 8                     | 0.05   | 25     | 0.27   | 51                 | 0.23   | 5        | 0.09   |
|                  |   | ชาย  | 65         | 0.20   | 3      | 0.05   | 6                     | 0.07   | 18     | 0.39   | 35                 | 0.32   | 3        | 0.11   |
|                  |   | หญิง | 29         | 0.09   | 2      | 0.03   | 2                     | 0.02   | 7      | 0.15   | 16                 | 0.15   | 2        | 0.07   |
| 276              | Dislocations, sprains and strains of specified and<br>multiple body regions (S03, S13, S23, S33,<br>S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03)<br>กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุ<br>เฉพาะ | รวม  | 20,175     | 31.03  | 3,814  | 32.69  | 5,368                 | 32.36  | 2,789  | 30.10  | 6,322              | 28.88  | 1,882    | 33.61  |
|                  |   | ชาย  | 13,610     | 42.67  | 2,458  | 42.90  | 3,662                 | 45.42  | 1,790  | 39.22  | 4,381              | 40.20  | 1,319    | 49.96  |
|                  |   | หญิง | 6,565      | 19.82  | 1,356  | 22.83  | 1,706                 | 20.00  | 999    | 21.25  | 1,941              | 17.66  | 563      | 19.03  |
| 277              | Injury of eye and orbit (S05)<br>การบาดเจ็บของตาและเปลือกตา   | รวม  | 11,474     | 17.65  | 2,523  | 21.62  | 2,694                 | 16.24  | 1,701  | 18.36  | 3,904              | 17.83  | 652      | 11.65  |
|                  |   | ชาย  | 8,861      | 27.78  | 1,928  | 33.65  | 2,042                 | 25.33  | 1,374  | 30.10  | 3,041              | 27.90  | 476      | 18.03  |
|                  |   | หญิง | 2,613      | 7.89   | 595    | 10.02  | 652                   | 7.65   | 327    | 6.96   | 863                | 7.85   | 176      | 5.95   |
| 278              | Intracranial injury (S06)<br>การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ   | รวม  | 85,106     | 130.91 | 16,036 | 137.43 | 19,260                | 116.09 | 13,055 | 140.91 | 32,470             | 148.32 | 4,285    | 76.53  |
|                  |   | ชาย  | 61,290     | 192.16 | 11,600 | 202.45 | 13,855                | 171.85 | 8,771  | 192.16 | 23,912             | 219.41 | 3,152    | 119.39 |
|                  |   | หญิง | 23,816     | 71.91  | 4,436  | 74.70  | 5,405                 | 63.38  | 4,284  | 91.15  | 8,558              | 77.85  | 1,133    | 38.29  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 279              | Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37)<br>การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ  | รวม  | 23,707     | 36.46  | 4,214  | 36.11  | 6,207                 | 37.41  | 4,196  | 45.29  | 7,203              | 32.90  | 1,887    | 33.70  |
|                  |   | ชาย  | 19,303     | 60.52  | 3,407  | 59.46  | 5,051                 | 62.65  | 3,418  | 74.88  | 5,925              | 54.37  | 1,502    | 56.89  |
|                  |   | หญิง | 4,404      | 13.30  | 807    | 13.59  | 1,156                 | 13.55  | 778    | 16.55  | 1,278              | 11.63  | 385      | 13.01  |
| 280              | Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05)<br>การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขา<br>บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ  | รวม  | 6,321      | 9.72   | 1,311  | 11.24  | 1,703                 | 10.27  | 759    | 8.19   | 2,172              | 9.92   | 376      | 6.72   |
|                  |   | ชาย  | 5,133      | 16.09  | 1,056  | 18.43  | 1,359                 | 16.86  | 599    | 13.12  | 1,800              | 16.52  | 319      | 12.08  |
|                  |   | หญิง | 1,188      | 3.59   | 255    | 4.29   | 344                   | 4.03   | 160    | 3.40   | 372                | 3.38   | 57       | 1.93   |
| 281              | Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14 )<br>การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย | รวม  | 200,281    | 308.06 | 38,408 | 329.17 | 49,069                | 295.77 | 30,738 | 331.78 | 69,464             | 317.31 | 12,602   | 225.08 |
|                  |   | ชาย  | 143,737    | 450.66 | 27,191 | 474.56 | 34,041                | 422.24 | 21,353 | 467.81 | 51,770             | 475.04 | 9,382    | 355.36 |
|                  |   | หญิง | 56,544     | 170.73 | 11,217 | 188.88 | 15,028                | 176.21 | 9,385  | 199.67 | 17,694             | 160.95 | 3,220    | 108.83 |
| 282              | Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย  | รวม  | 6,406      | 9.85   | 1,069  | 9.16   | 1,513                 | 9.12   | 1,343  | 14.50  | 2,096              | 9.57   | 385      | 6.88   |
|                  |   | ชาย  | 3,812      | 11.95  | 648    | 11.31  | 937                   | 11.62  | 736    | 16.12  | 1,249              | 11.46  | 242      | 9.17   |
|                  |   | หญิง | 2,594      | 7.83   | 421    | 7.09   | 576                   | 6.75   | 607    | 12.91  | 847                | 7.70   | 143      | 4.83   |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 283              | Burns and corrosions (T20-T32)<br>แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน  | รวม  | 22,314     | 34.32  | 4,104  | 35.17  | 5,383                 | 32.45  | 3,227  | 34.83  | 8,208              | 37.49  | 1,392    | 24.86  |
|                  |  | ชาย  | 14,379     | 45.08  | 2,631  | 45.92  | 3,424                 | 42.47  | 2,119  | 46.42  | 5,341              | 49.01  | 864      | 32.73  |
|                  |  | หญิง | 7,935      | 23.96  | 1,473  | 24.80  | 1,959                 | 22.97  | 1,108  | 23.57  | 2,867              | 26.08  | 528      | 17.85  |
| 284              | Poisoing by drugs and biological substances<br>(T36-T50)<br>การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีวิตดุ  | รวม  | 30,207     | 46.46  | 6,503  | 55.73  | 7,906                 | 47.65  | 4,343  | 46.88  | 9,569              | 43.71  | 1,886    | 33.69  |
|                  |  | ชาย  | 12,399     | 38.88  | 2,644  | 46.15  | 3,057                 | 37.92  | 1,809  | 39.63  | 4,094              | 37.57  | 795      | 30.11  |
|                  |  | หญิง | 17,808     | 53.77  | 3,859  | 64.98  | 4,849                 | 56.86  | 2,534  | 53.91  | 5,475              | 49.80  | 1,091    | 36.87  |
| 285              | Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal<br>as to source (T51-T65)<br>การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา  | รวม  | 43,542     | 66.97  | 8,021  | 68.74  | 12,190                | 73.48  | 9,718  | 104.89 | 12,782             | 58.39  | 831      | 14.84  |
|                  |  | ชาย  | 25,366     | 79.53  | 4,760  | 83.08  | 6,949                 | 86.19  | 5,826  | 127.64 | 7,389              | 67.80  | 442      | 16.74  |
|                  |  | หญิง | 18,176     | 54.88  | 3,261  | 54.91  | 5,241                 | 61.45  | 3,892  | 82.81  | 5,393              | 49.06  | 389      | 13.15  |
| 286              | Maltreatment syndromes (T74)<br>กลุ่มอาการจากการทารุณ  | รวม  | 413        | 0.64   | 99     | 0.85   | 85                    | 0.51   | 53     | 0.57   | 142                | 0.65   | 34       | 0.61   |
|                  |  | ชาย  | 73         | 0.23   | 12     | 0.21   | 18                    | 0.22   | 15     | 0.33   | 21                 | 0.19   | 7        | 0.27   |
|                  |  | หญิง | 340        | 1.03   | 87     | 1.47   | 67                    | 0.79   | 38     | 0.81   | 121                | 1.10   | 27       | 0.91   |
| 287              | Other and unspecified effects of external causes<br>(T33-T35, T66-T73, T75-T78)<br>อื่น ๆ และที่ไม่ได้ระบุลงของสาเหตุภายนอก  | รวม  | 32,597     | 50.14  | 5,954  | 51.03  | 9,074                 | 54.69  | 5,601  | 60.46  | 10,908             | 49.83  | 1,060    | 18.93  |
|                  |  | ชาย  | 18,526     | 58.09  | 3,364  | 58.71  | 5,190                 | 64.38  | 3,126  | 68.49  | 6,228              | 57.15  | 618      | 23.41  |
|                  |  | หญิง | 14,071     | 42.49  | 2,590  | 43.61  | 3,884                 | 45.54  | 2,475  | 52.66  | 4,680              | 42.57  | 442      | 14.94  |
| 288              | Certain early complications of trauma and<br>complications of surgical and medical care, note<br>Elsewhere classified (T79-T88)<br>ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและ<br>ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรม<br>ที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น | รวม  | 142,362    | 218.97 | 26,729 | 229.07 | 30,642                | 184.70 | 16,299 | 175.93 | 50,802             | 232.06 | 17,890   | 319.53 |
|                  |  | ชาย  | 80,674     | 252.94 | 15,581 | 271.93 | 17,056                | 211.56 | 9,235  | 202.33 | 29,397             | 269.74 | 9,405    | 356.23 |
|                  |  | หญิง | 61,688     | 186.26 | 11,148 | 187.72 | 13,586                | 159.31 | 7,064  | 150.29 | 21,405             | 194.71 | 8,485    | 286.78 |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

**หน่วยนับ : รายโรค**

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 289              | Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98)<br><br>ผลกระทบล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมา                          | รวม  | 2,391         | 3.68   | 599    | 5.13   | 676                   | 4.07   | 283    | 3.05   | 472                | 2.16   | 361      | 6.45   |
|                  |   | ชาย  | 1,793         | 5.62   | 462    | 8.06   | 471                   | 5.84   | 210    | 4.60   | 370                | 3.40   | 280      | 10.61  |
|                  |   | หญิง | 598           | 1.81   | 137    | 2.31   | 205                   | 2.40   | 73     | 1.55   | 102                | 0.93   | 81       | 2.74   |
| 290              | Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13)<br><br>บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและขันสูตร  | รวม  | 46,446        | 71.44  | 14,842 | 127.20 | 12,739                | 76.79  | 8,718  | 94.10  | 7,121              | 32.53  | 3,026    | 54.05  |
|                  |   | ชาย  | 18,262        | 57.26  | 6,372  | 111.21 | 4,437                 | 55.04  | 2,596  | 56.87  | 3,347              | 30.71  | 1,510    | 57.19  |
|                  |   | หญิง | 28,184        | 85.10  | 8,470  | 142.63 | 8,302                 | 97.35  | 6,122  | 130.25 | 3,774              | 34.33  | 1,516    | 51.24  |
| 291              | Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21)<br><br>การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ   | รวม  | 2,809         | 4.32   | 183    | 1.57   | 1,019                 | 6.14   | 730    | 7.88   | 655                | 2.99   | 222      | 3.97   |
|                  |   | ชาย  | 1,311         | 4.11   | 80     | 1.40   | 462                   | 5.73   | 333    | 7.30   | 322                | 2.95   | 114      | 4.32   |
|                  |   | หญิง | 1,498         | 4.52   | 103    | 1.73   | 557                   | 6.53   | 397    | 8.45   | 333                | 3.03   | 108      | 3.65   |
| 292              | Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29)<br><br>บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวนেื่องกับโรคติดต่อ | รวม  | 95,379        | 146.71 | 6,122  | 52.47  | 22,310                | 134.48 | 26,757 | 288.81 | 34,209             | 156.27 | 5,981    | 106.83 |
|                  |   | ชาย  | 49,071        | 153.85 | 3,064  | 53.48  | 11,473                | 142.31 | 13,767 | 301.62 | 17,677             | 162.20 | 3,090    | 117.04 |
|                  |   | หญิง | 46,308        | 139.82 | 3,058  | 51.49  | 10,837                | 127.07 | 12,990 | 276.37 | 16,532             | 150.38 | 2,891    | 97.71  |
| 293              | Contraceptive management (Z30)<br><br>การรับบริการคุมกำเนิด   | รวม  | 79,533        | 122.33 | 13,001 | 111.42 | 24,359                | 146.83 | 9,352  | 100.94 | 26,968             | 123.19 | 5,853    | 104.54 |
|                  |   | ชาย  | 53            | 0.17   | 20     | 0.35   | 7                     | 0.09   | 3      | 0.07   | 15                 | 0.14   | 8        | 0.30   |
|                  |   | หญิง | 79,480        | 239.98 | 12,981 | 218.59 | 24,352                | 285.55 | 9,349  | 198.91 | 26,953             | 245.18 | 5,845    | 197.55 |
| 294              | Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36)<br><br>การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำ  | รวม  | 20,147        | 60.83  | 1,549  | 26.08  | 3,470                 | 40.69  | 5,822  | 123.87 | 7,800              | 70.95  | 1,506    | 50.90  |
|                  |   | ชาย  | 0             | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 20,147        | 60.83  | 1,549  | 26.08  | 3,470                 | 40.69  | 5,822  | 123.87 | 7,800              | 70.95  | 1,506    | 50.90  |

**ตาราง 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร  
(ตารางการป่วยนับซึ่งจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค ปี พ.ศ. 2559) (ต่อ)**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |          | เหนือ  |          | กลาง ('ไม่รวมกรุงเทพฯ) |          | ใต้     |          | ตะวันออกเฉียงเหนือ |          | กรุงเทพฯ |          |
|------------------|--|------|------------|----------|--------|----------|------------------------|----------|---------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา    | จำนวน  | อัตรา    | จำนวน                  | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน              | อัตรา    | จำนวน    | อัตรา    |
| 295              | Liveborn infants according to place of birth<br>(Z38)<br>การเกิดของหากตามสถานที่เกิด   | รวม  | 559,774    | 861.01   | 81,422 | 697.81   | 146,109                | 880.69   | 109,366 | 1,180.47 | 178,620            | 815.94   | 44,257   | 790.46   |
|                  |  | ชาย  | 289,153    | 906.59   | 42,044 | 733.78   | 75,861                 | 940.96   | 56,303  | 1,233.52 | 91,883             | 843.11   | 23,062   | 873.52   |
|                  |  | หญิง | 270,621    | 817.12   | 39,378 | 663.09   | 70,248                 | 823.71   | 53,063  | 1,128.96 | 86,737             | 789.00   | 21,195   | 716.35   |
| 296              | Postpartum care and examination (Z39)<br>การดูแลและการตรวจหลังคลอด   | รวม  | 2,036      | 6.15     | 324    | 5.46     | 331                    | 3.88     | 560     | 11.91    | 768                | 6.99     | 53       | 1.79     |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00     | 0      | 0.00     | 0                      | 0.00     | 0       | 0.00     | 0                  | 0.00     | 0        | 0.00     |
|                  |  | หญิง | 2,036      | 6.15     | 324    | 5.46     | 331                    | 3.88     | 560     | 11.91    | 768                | 6.99     | 53       | 1.79     |
| 297              | Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54,<br>Z40-Z54)<br>บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ | รวม  | 340,086    | 523.10   | 71,661 | 614.15   | 72,403                 | 436.42   | 30,715  | 331.53   | 108,658            | 496.35   | 56,649   | 1,011.79 |
|                  |  | ชาย  | 171,352    | 537.25   | 34,942 | 609.83   | 37,372                 | 463.55   | 16,592  | 363.51   | 55,441             | 508.72   | 27,005   | 1,022.87 |
|                  |  | หญิง | 168,734    | 509.48   | 36,719 | 618.32   | 35,031                 | 410.77   | 14,123  | 300.48   | 53,217             | 484.09   | 29,644   | 1,001.91 |
| 298              | Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99)<br>บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น   | รวม  | 494,737    | 760.98   | 79,034 | 677.34   | 109,071                | 657.44   | 101,928 | 1,100.19 | 158,024            | 721.85   | 46,680   | 833.74   |
|                  |  | ชาย  | 69,245     | 217.11   | 12,568 | 219.35   | 13,772                 | 170.82   | 7,194   | 157.61   | 20,887             | 191.66   | 14,824   | 561.49   |
|                  |  | หญิง | 425,492    | 1,284.74 | 66,466 | 1,119.23 | 95,299                 | 1,117.45 | 94,734  | 2,015.54 | 137,137            | 1,247.46 | 31,856   | 1,076.67 |

รวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกองลากสุขภาพสุราษฎร์ธานี (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

# ผู้ป่วยใน

(เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกสาเหตุการป่วย  
เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2559

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |           | เหนือ     |         | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |          | ใต้       |           | ตะวันออกเฉียงเหนือ |           | กรุงเทพฯ |          |
|------------------|---|------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|
|                  |   |      | จำนวน         | อัตรา     | จำนวน     | อัตรา   | จำนวน                 | อัตรา    | จำนวน     | อัตรา     | จำนวน              | อัตรา     | จำนวน    | อัตรา    |
| 001              | Cholera (A00)<br>อหิวาตกโรค   | รวม  | 6,970,219     | 10,721.19 | 1,336,690 | ######_ | 1,567,518             | 9,448.41 | 1,108,301 | 11,962.74 | 2,451,893          | 11,200.24 | 505,817  | 9,034.26 |
|                  |   | ชาย  | 3,315,702     | 10,395.85 | 647,791   | ######_ | 740,859               | 9,189.45 | 505,826   | 11,081.92 | 1,175,634          | 10,787.48 | 245,592  | 9,302.32 |
|                  |   | หญิง | 3,654,517     | 11,034.50 | 688,899   | ######_ | 826,659               | 9,693.20 | 602,475   | 12,818.13 | 1,276,259          | 11,609.43 | 260,225  | 8,795.08 |
| 002              | Typhoid and paratyphoid fever<br>(A01)<br>ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม  | รวม  | 91            | 0.14      | 10        | 0.09    | 22                    | 0.13     | 18        | 0.19      | 30                 | 0.14      | 11       | 0.20     |
|                  |   | ชาย  | 53            | 0.17      | 7         | 0.12    | 12                    | 0.15     | 12        | 0.26      | 17                 | 0.16      | 5        | 0.19     |
|                  |   | หญิง | 38            | 0.11      | 3         | 0.05    | 10                    | 0.12     | 6         | 0.13      | 13                 | 0.12      | 6        | 0.20     |
| 003              | Shigellosis (A03)<br>โรคปิดจากเชื้อซิเกลลา  | รวม  | 3,386         | 5.21      | 272       | 2.33    | 163                   | 0.98     | 2,482     | 26.79     | 451                | 2.06      | 18       | 0.32     |
|                  |   | ชาย  | 1,811         | 5.68      | 154       | 2.69    | 92                    | 1.14     | 1,308     | 28.66     | 245                | 2.25      | 12       | 0.45     |
|                  |   | หญิง | 1,575         | 4.76      | 118       | 1.99    | 71                    | 0.83     | 1,174     | 24.98     | 206                | 1.87      | 6        | 0.20     |
| 004              | Amoebiasis (A06)<br>โรคปิดมีตัว   | รวม  | 137           | 0.21      | 26        | 0.22    | 32                    | 0.19     | 22        | 0.24      | 46                 | 0.21      | 11       | 0.20     |
|                  |   | ชาย  | 64            | 0.20      | 14        | 0.24    | 14                    | 0.17     | 11        | 0.24      | 21                 | 0.19      | 4        | 0.15     |
|                  |   | หญิง | 73            | 0.22      | 12        | 0.20    | 18                    | 0.21     | 11        | 0.23      | 25                 | 0.23      | 7        | 0.24     |
| 005              | Diarrhoea and gastroenteritis of<br>presumed infectious origin (A09)<br>อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ<br>ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ | รวม  | 2,719         | 4.18      | 882       | 7.56    | 391                   | 2.36     | 787       | 8.49      | 642                | 2.93      | 17       | 0.30     |
|                  |   | ชาย  | 1,204         | 3.77      | 379       | 6.61    | 190                   | 2.36     | 343       | 7.51      | 281                | 2.58      | 11       | 0.42     |
|                  |   | หญิง | 1,515         | 4.57      | 503       | 8.47    | 201                   | 2.36     | 444       | 9.45      | 361                | 3.28      | 6        | 0.20     |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |       | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|---------------|-------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 006              | Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08)<br>โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ | รวม  | 54,782        | 84.26 | 12,653 | 108.44 | 11,063                | 66.68 | 5,884 | 63.51 | 22,824             | 104.26 | 2,358    | 42.12 |
|                  |  | ชาย  | 26,202        | 82.15 | 6,170  | 107.68 | 5,341                 | 66.25 | 3,024 | 66.25 | 10,421             | 95.62  | 1,246    | 47.19 |
|                  |  | หญิง | 28,580        | 86.29 | 6,483  | 109.17 | 5,722                 | 67.09 | 2,860 | 60.85 | 12,403             | 112.82 | 1,112    | 37.58 |
| 007              | Respiratory tuberculosis (A15-A16)<br>วัณโรคทางเดินหายใจ                             | รวม  | 35,728        | 54.95 | 5,936  | 50.87  | 7,761                 | 46.78 | 4,196 | 45.29 | 16,184             | 73.93  | 1,651    | 29.49 |
|                  |  | ชาย  | 25,026        | 78.46 | 4,257  | 74.30  | 5,608                 | 69.56 | 3,063 | 67.11 | 10,920             | 100.20 | 1,178    | 44.62 |
|                  |  | หญิง | 10,702        | 32.31 | 1,679  | 28.27  | 2,153                 | 25.25 | 1,133 | 24.11 | 5,264              | 47.88  | 473      | 15.99 |
| 008              | Other Tuberculosis (A17-A19)<br>วัณโรคอื่น ๆ   | รวม  | 7,294         | 11.22 | 1,255  | 10.76  | 1,321                 | 7.96  | 734   | 7.92  | 3,423              | 15.64  | 561      | 10.02 |
|                  |  | ชาย  | 4,405         | 13.81 | 786    | 13.72  | 771                   | 9.56  | 457   | 10.01 | 2,048              | 18.79  | 343      | 12.99 |
|                  |  | หญิง | 2,889         | 8.72  | 469    | 7.90   | 550                   | 6.45  | 277   | 5.89  | 1,375              | 12.51  | 218      | 7.37  |
| 009              | Plaque (A20)<br>กਪโรค  | รวม  | 0             | 0.00  | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0             | 0.00  | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 0             | 0.00  | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00  |
| 010              | Brucellosis (A23)<br>โรคติดเชื้อบรูเซลลา   | รวม  | 8             | 0.01  | 3      | 0.03   | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.00   | 3        | 0.05  |
|                  |  | ชาย  | 6             | 0.02  | 2      | 0.03   | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01   | 2        | 0.08  |
|                  |  | หญิง | 2             | 0.01  | 1      | 0.02   | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00   | 1        | 0.03  |
| 011              | Leprosy (A30)<br>โรคเรือง  | รวม  | 50            | 0.08  | 6      | 0.05   | 9                     | 0.05  | 13    | 0.14  | 19                 | 0.09   | 3        | 0.05  |
|                  |  | ชาย  | 29            | 0.09  | 3      | 0.05   | 4                     | 0.05  | 8     | 0.18  | 11                 | 0.10   | 3        | 0.11  |
|                  |  | หญิง | 21            | 0.06  | 3      | 0.05   | 5                     | 0.06  | 5     | 0.11  | 8                  | 0.07   | 0        | 0.00  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)                               | เพศ  | ทั่วประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 012              | Tetanus neonatorum (A33)<br>บาดทะยักในเด็กแรกเกิด          | รวม  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 013              | Other tetanus (A34-A35)<br>บาดทะยักอื่น ๆ                  | รวม  | 191        | 0.29  | 55    | 0.47  | 36                    | 0.22  | 11    | 0.12  | 81                 | 0.37  | 8        | 0.14  |
|                  |  | ชาย  | 125        | 0.39  | 36    | 0.63  | 27                    | 0.33  | 10    | 0.22  | 45                 | 0.41  | 7        | 0.27  |
|                  |  | หญิง | 66         | 0.20  | 19    | 0.32  | 9                     | 0.11  | 1     | 0.02  | 36                 | 0.33  | 1        | 0.03  |
| 014              | Diphtheria (A36)<br>โรคคอตีบ                               | รวม  | 37         | 0.06  | 9     | 0.08  | 7                     | 0.04  | 15    | 0.16  | 6                  | 0.03  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 20         | 0.06  | 7     | 0.12  | 3                     | 0.04  | 9     | 0.20  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 17         | 0.05  | 2     | 0.03  | 4                     | 0.05  | 6     | 0.13  | 5                  | 0.05  | 0        | 0.00  |
| 015              | Whooping cough (A37)<br>โรคไอกรน                           | รวม  | 54         | 0.08  | 4     | 0.03  | 9                     | 0.05  | 24    | 0.26  | 11                 | 0.05  | 6        | 0.11  |
|                  |  | ชาย  | 24         | 0.08  | 2     | 0.03  | 4                     | 0.05  | 8     | 0.18  | 7                  | 0.06  | 3        | 0.11  |
|                  |  | หญิง | 30         | 0.09  | 2     | 0.03  | 5                     | 0.06  | 16    | 0.34  | 4                  | 0.04  | 3        | 0.10  |
| 016              | Meningococcal infection (A39)<br>การติดเชื้อเมนingoค็อกค์ส | รวม  | 78         | 0.12  | 11    | 0.09  | 20                    | 0.12  | 20    | 0.22  | 23                 | 0.11  | 4        | 0.07  |
|                  |  | ชาย  | 47         | 0.15  | 8     | 0.14  | 11                    | 0.14  | 8     | 0.18  | 16                 | 0.15  | 4        | 0.15  |
|                  |  | หญิง | 31         | 0.09  | 3     | 0.05  | 9                     | 0.11  | 12    | 0.26  | 7                  | 0.06  | 0        | 0.00  |
| 017              | Septicemia (A40-A41)<br>โลหิตเป็นพิษ                       | รวม  | 39,659     | 61.00 | 8,139 | 69.75 | 9,462                 | 57.03 | 4,391 | 47.40 | 15,029             | 68.65 | 2,638    | 47.12 |
|                  |  | ชาย  | 19,828     | 62.17 | 4,282 | 74.73 | 4,344                 | 53.88 | 2,219 | 48.62 | 7,708              | 70.73 | 1,275    | 48.29 |
|                  |  | หญิง | 19,831     | 59.88 | 3,857 | 64.95 | 5,118                 | 60.01 | 2,172 | 46.21 | 7,321              | 66.60 | 1,363    | 46.07 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|---------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------------|--------|----------|-------|
|               |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 018           | Other bacterial diseases ( A21-A22, A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49 ) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ   | รวม  | 41,472     | 63.79 | 5,171 | 44.32 | 3,984                 | 24.01 | 8,702 | 93.93  | 23,062             | 105.35 | 553      | 9.88  |
|               |   | ชาย  | 24,032     | 75.35 | 2,993 | 52.24 | 2,143                 | 26.58 | 5,017 | 109.92 | 13,594             | 124.74 | 285      | 10.79 |
|               |   | หญิง | 17,440     | 52.66 | 2,178 | 36.68 | 1,841                 | 21.59 | 3,685 | 78.40  | 9,468              | 86.13  | 268      | 9.06  |
| 019           | Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด  | รวม  | 414        | 0.64  | 50    | 0.43  | 154                   | 0.93  | 25    | 0.27   | 92                 | 0.42   | 93       | 1.66  |
|               |   | ชาย  | 225        | 0.71  | 25    | 0.44  | 79                    | 0.98  | 13    | 0.28   | 56                 | 0.51   | 52       | 1.97  |
|               |   | หญิง | 189        | 0.57  | 25    | 0.42  | 75                    | 0.88  | 12    | 0.26   | 36                 | 0.33   | 41       | 1.39  |
| 020           | Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม   | รวม  | 64         | 0.10  | 9     | 0.08  | 9                     | 0.05  | 13    | 0.14   | 29                 | 0.13   | 4        | 0.07  |
|               |   | ชาย  | 46         | 0.14  | 6     | 0.10  | 6                     | 0.07  | 10    | 0.22   | 21                 | 0.19   | 3        | 0.11  |
|               |   | หญิง | 18         | 0.05  | 3     | 0.05  | 3                     | 0.04  | 3     | 0.06   | 8                  | 0.07   | 1        | 0.03  |
| 021           | Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ  | รวม  | 557        | 0.86  | 82    | 0.70  | 93                    | 0.56  | 121   | 1.31   | 224                | 1.02   | 37       | 0.66  |
|               |   | ชาย  | 355        | 1.11  | 59    | 1.03  | 63                    | 0.78  | 60    | 1.31   | 145                | 1.33   | 28       | 1.06  |
|               |   | หญิง | 202        | 0.61  | 23    | 0.39  | 30                    | 0.35  | 61    | 1.30   | 79                 | 0.72   | 9        | 0.30  |
| 022           | Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน  | รวม  | 272        | 0.42  | 36    | 0.31  | 77                    | 0.46  | 23    | 0.25   | 118                | 0.54   | 18       | 0.32  |
|               |   | ชาย  | 179        | 0.56  | 30    | 0.52  | 49                    | 0.61  | 12    | 0.26   | 82                 | 0.75   | 6        | 0.23  |
|               |   | หญิง | 93         | 0.28  | 6     | 0.10  | 28                    | 0.33  | 11    | 0.23   | 36                 | 0.33   | 12       | 0.41  |
| 023           | Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลamydiae | รวม  | 32         | 0.05  | 6     | 0.05  | 6                     | 0.04  | 11    | 0.12   | 6                  | 0.03   | 3        | 0.05  |
|               |   | ชาย  | 21         | 0.07  | 3     | 0.05  | 4                     | 0.05  | 10    | 0.22   | 4                  | 0.04   | 0        | 0.00  |
|               |   | หญิง | 11         | 0.03  | 3     | 0.05  | 2                     | 0.02  | 1     | 0.02   | 2                  | 0.02   | 3        | 0.10  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 024              | Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก | รวม  | 773           | 1.19  | 151   | 1.29  | 191                   | 1.15  | 95    | 1.03  | 279                | 1.27  | 57       | 1.02  |
|                  |  | ชาย  | 349           | 1.09  | 79    | 1.38  | 80                    | 0.99  | 22    | 0.48  | 132                | 1.21  | 36       | 1.36  |
|                  |  | หญิง | 424           | 1.28  | 72    | 1.21  | 111                   | 1.30  | 73    | 1.55  | 147                | 1.34  | 21       | 0.71  |
| 025              | Relapsing fever (A68) โรคไข้กลับซ้ำ  | รวม  | 1             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 1             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 0             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 026              | Trachoma (A71) ริดสีดวงตา  | รวม  | 1             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 1             | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
| 027              | Typhus fever (A75) ไข้รากระดูกใหญ่   | รวม  | 9,780         | 15.04 | 3,438 | 29.46 | 595                   | 3.59  | 2,731 | 29.48 | 2,940              | 13.43 | 76       | 1.36  |
|                  |  | ชาย  | 5,494         | 17.23 | 1,932 | 33.72 | 349                   | 4.33  | 1,599 | 35.03 | 1,571              | 14.42 | 43       | 1.63  |
|                  |  | หญิง | 4,286         | 12.94 | 1,506 | 25.36 | 246                   | 2.88  | 1,132 | 24.08 | 1,369              | 12.45 | 33       | 1.12  |
| 028              | Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน   | รวม  | 5             | 0.01  | 3     | 0.03  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 2                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 2             | 0.01  | 1     | 0.02  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 3             | 0.01  | 2     | 0.03  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
| 029              | Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า  | รวม  | 9             | 0.01  | 1     | 0.01  | 3                     | 0.02  | 2     | 0.02  | 2                  | 0.01  | 1        | 0.02  |
|                  |  | ชาย  | 6             | 0.02  | 0     | 0.00  | 2                     | 0.02  | 1     | 0.02  | 2                  | 0.02  | 1        | 0.04  |
|                  |  | หญิง | 3             | 0.01  | 1     | 0.02  | 1                     | 0.01  | 1     | 0.02  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 030              | Viral encephalitis (A83-A86)<br>สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส   | รวม  | 677        | 1.04   | 113    | 0.97   | 147                   | 0.89  | 81     | 0.87   | 275                | 1.26   | 61       | 1.09  |
|                  |   | ชาย  | 378        | 1.19   | 68     | 1.19   | 66                    | 0.82  | 44     | 0.96   | 167                | 1.53   | 33       | 1.25  |
|                  |   | หญิง | 299        | 0.90   | 45     | 0.76   | 81                    | 0.95  | 37     | 0.79   | 108                | 0.98   | 28       | 0.95  |
| 031              | Yellow fever (A95)<br>ไข้เหลือง   | รวม  | 5          | 0.01   | 2      | 0.02   | 0                     | 0.00  | 3      | 0.03   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 2          | 0.01   | 1      | 0.02   | 0                     | 0.00  | 1      | 0.02   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 3          | 0.01   | 1      | 0.02   | 0                     | 0.00  | 2      | 0.04   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00  |
| 032              | Other arthropod-borne viral fevers<br>and viral haemorrhagic fevers<br>(A90-A94, A96-A99)<br>ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและ<br>ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ | รวม  | 101,809    | 156.60 | 11,652 | 99.86  | 13,490                | 81.31 | 46,873 | 505.94 | 26,678             | 121.87 | 3,116    | 55.65 |
|                  |   | ชาย  | 51,287     | 160.80 | 5,758  | 100.49 | 6,990                 | 86.70 | 23,229 | 508.91 | 13,638             | 125.14 | 1,672    | 63.33 |
|                  |   | หญิง | 50,522     | 152.55 | 5,894  | 99.25  | 6,500                 | 76.22 | 23,644 | 503.04 | 13,040             | 118.62 | 1,444    | 48.80 |
| 033              | Herpesviral infection (B00)<br>ヘルペスウイルス   | รวม  | 2,070      | 3.18   | 463    | 3.97   | 476                   | 2.87  | 236    | 2.55   | 769                | 3.51   | 126      | 2.25  |
|                  |   | ชาย  | 1,042      | 3.27   | 224    | 3.91   | 241                   | 2.99  | 110    | 2.41   | 405                | 3.72   | 62       | 2.35  |
|                  |   | หญิง | 1,028      | 3.10   | 239    | 4.02   | 235                   | 2.76  | 126    | 2.68   | 364                | 3.31   | 64       | 2.16  |
| 034              | Varicella and zoster (B01-B02)<br>อีสุกอีสและยังสวัสดิ์   | รวม  | 5,478      | 8.43   | 973    | 8.34   | 1,174                 | 7.08  | 944    | 10.19  | 2,090              | 9.55   | 297      | 5.30  |
|                  |   | ชาย  | 2,579      | 8.09   | 479    | 8.36   | 553                   | 6.86  | 440    | 9.64   | 960                | 8.81   | 147      | 5.57  |
|                  |   | หญิง | 2,899      | 8.75   | 494    | 8.32   | 621                   | 7.28  | 504    | 10.72  | 1,130              | 10.28  | 150      | 5.07  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|---------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|               |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 035           | Measles (B05)<br>หัด  | รวม  | 2,352      | 3.62  | 34    | 0.29  | 135                   | 0.81  | 1,999 | 21.58 | 93                 | 0.42  | 91       | 1.63  |
|               |   | ชาย  | 1,255      | 3.93  | 22    | 0.38  | 85                    | 1.05  | 1,041 | 22.81 | 59                 | 0.54  | 48       | 1.82  |
|               |   | หญิง | 1,097      | 3.31  | 12    | 0.20  | 50                    | 0.59  | 958   | 20.38 | 34                 | 0.31  | 43       | 1.45  |
| 036           | Rubella (B06)<br>หัดเยอรมัน   | รวม  | 26         | 0.04  | 5     | 0.04  | 8                     | 0.05  | 6     | 0.06  | 6                  | 0.03  | 1        | 0.02  |
|               |   | ชาย  | 16         | 0.05  | 3     | 0.05  | 3                     | 0.04  | 4     | 0.09  | 5                  | 0.05  | 1        | 0.04  |
|               |   | หญิง | 10         | 0.03  | 2     | 0.03  | 5                     | 0.06  | 2     | 0.04  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
| 037           | Acute hepatitis B (B16)<br>ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี   | รวม  | 1,023      | 1.57  | 214   | 1.83  | 249                   | 1.50  | 114   | 1.23  | 408                | 1.86  | 38       | 0.68  |
|               |   | ชาย  | 656        | 2.06  | 135   | 2.36  | 156                   | 1.93  | 79    | 1.73  | 262                | 2.40  | 24       | 0.91  |
|               |   | หญิง | 367        | 1.11  | 79    | 1.33  | 93                    | 1.09  | 35    | 0.74  | 146                | 1.33  | 14       | 0.47  |
| 038           | Other viral hepatitis (B15, B17-B19)<br>ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ                                   | รวม  | 5,401      | 8.31  | 1,085 | 9.30  | 1,161                 | 7.00  | 410   | 4.43  | 2,465              | 11.26 | 280      | 5.00  |
|               |   | ชาย  | 3,232      | 10.13 | 637   | 11.12 | 653                   | 8.10  | 245   | 5.37  | 1,524              | 13.98 | 173      | 6.55  |
|               |   | หญิง | 2,169      | 6.55  | 448   | 7.54  | 508                   | 5.96  | 165   | 3.51  | 941                | 8.56  | 107      | 3.62  |
| 039           | Human immunodeficiency virus<br>[HIV] disease (B20-B24)<br>ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV) | รวม  | 28,346     | 43.60 | 4,856 | 41.62 | 7,914                 | 47.70 | 3,690 | 39.83 | 9,725              | 44.42 | 2,161    | 38.60 |
|               |   | ชาย  | 17,514     | 54.91 | 3,010 | 52.53 | 4,823                 | 59.82 | 2,284 | 50.04 | 5,971              | 54.79 | 1,426    | 54.01 |
|               |   | หญิง | 10,832     | 32.71 | 1,846 | 31.09 | 3,091                 | 36.24 | 1,406 | 29.91 | 3,754              | 34.15 | 735      | 24.84 |
| 040           | Mumps (B26)<br>คางทูม   | รวม  | 106        | 0.16  | 16    | 0.14  | 19                    | 0.11  | 26    | 0.28  | 41                 | 0.19  | 4        | 0.07  |
|               |   | ชาย  | 60         | 0.19  | 8     | 0.14  | 12                    | 0.15  | 16    | 0.35  | 22                 | 0.20  | 2        | 0.08  |
|               |   | หญิง | 46         | 0.14  | 8     | 0.13  | 7                     | 0.08  | 10    | 0.21  | 19                 | 0.17  | 2        | 0.07  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 041              | Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34 )<br>โรคจากไวรัสอื่น | รวม  | 45,208     | 69.54 | 8,429 | 72.24 | 11,345                | 68.38 | 9,791 | 105.68 | 13,506             | 61.70 | 2,137    | 38.17 |
|                  |   | ชาย  | 24,080     | 75.50 | 4,618 | 80.60 | 6,104                 | 75.71 | 5,105 | 111.84 | 7,083              | 64.99 | 1,170    | 44.32 |
|                  |   | หญิง | 21,128     | 63.79 | 3,811 | 64.17 | 5,241                 | 61.45 | 4,686 | 99.70  | 6,423              | 58.43 | 967      | 32.68 |
| 042              | Mycoses (B35-B49)<br>โรคติดเชื้อราก   | รวม  | 2,310      | 3.55  | 439   | 3.76  | 451                   | 2.72  | 253   | 2.73   | 877                | 4.01  | 290      | 5.18  |
|                  |   | ชาย  | 1,331      | 4.17  | 245   | 4.28  | 276                   | 3.42  | 143   | 3.13   | 492                | 4.51  | 175      | 6.63  |
|                  |   | หญิง | 979        | 2.96  | 194   | 3.27  | 175                   | 2.05  | 110   | 2.34   | 385                | 3.50  | 115      | 3.89  |
| 043              | Malaria (B50-B54)<br>มาลาเรีย   | รวม  | 3,139      | 4.83  | 276   | 2.37  | 462                   | 2.78  | 1,823 | 19.68  | 551                | 2.52  | 27       | 0.48  |
|                  |   | ชาย  | 2,021      | 6.34  | 188   | 3.28  | 325                   | 4.03  | 1,006 | 22.04  | 485                | 4.45  | 17       | 0.64  |
|                  |   | หญิง | 1,118      | 3.38  | 88    | 1.48  | 137                   | 1.61  | 817   | 17.38  | 66                 | 0.60  | 10       | 0.34  |
| 044              | Leishmaniasis (B55)<br>โรคลิขมานเนีย  | รวม  | 25         | 0.04  | 12    | 0.10  | 0                     | 0.00  | 13    | 0.14   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 25         | 0.08  | 12    | 0.21  | 0                     | 0.00  | 13    | 0.28   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 045              | Trypanosomiasis (B56-B57)<br>โรคทริปานโซเมียม   | รวม  | 8          | 0.01  | 1     | 0.01  | 0                     | 0.00  | 3     | 0.03   | 4                  | 0.02  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 4          | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 2     | 0.04   | 2                  | 0.02  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 4          | 0.01  | 1     | 0.02  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.02   | 2                  | 0.02  | 0        | 0.00  |
| 046              | Schistosomiasis (B65)<br>โรคติดเชื้อซิสโตโซม  | รวม  | 4          | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 1     | 0.01   | 1                  | 0.00  | 1        | 0.02  |
|                  |   | ชาย  | 3          | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.02   | 1                  | 0.01  | 1        | 0.04  |
|                  |   | หญิง | 1          | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)                         | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 047              | Other fluke infections (B66)<br>โรคพยาธิใบไม้ อื่น ๆ | รวม  | 79         | 0.12  | 31    | 0.27  | 4                     | 0.02  | 1     | 0.01  | 43                 | 0.20  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 33         | 0.10  | 12    | 0.21  | 3                     | 0.04  | 0     | 0.00  | 18                 | 0.17  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 46         | 0.14  | 19    | 0.32  | 1                     | 0.01  | 1     | 0.02  | 25                 | 0.23  | 0        | 0.00  |
| 048              | Echinococcosis (B67)<br>โรคพยาธิอีโนโคค็อกซ์         | รวม  | 2          | 0.00  | 1     | 0.01  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.01  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 1          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 1     | 0.02  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 1          | 0.00  | 1     | 0.02  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 049              | Dracunculiasis (B72)<br>โรคพยาธิตราคันคูลัส          | รวม  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 050              | Onchocerciasis (B73)<br>โรคพยาธิอนโคเซอร์ดา          | รวม  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 051              | Filariasis (B74)<br>โรคพยาธิพิลาเรีย                 | รวม  | 9          | 0.01  | 1     | 0.01  | 1                     | 0.01  | 4     | 0.04  | 1                  | 0.00  | 2        | 0.04  |
|                  |  | ชาย  | 7          | 0.02  | 1     | 0.02  | 0                     | 0.00  | 4     | 0.09  | 1                  | 0.01  | 1        | 0.04  |
|                  |  | หญิง | 2          | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 1        | 0.03  |
| 052              | Hookworm diseases (B76)<br>โรคพยาธิปากขอ             | รวม  | 101        | 0.16  | 13    | 0.11  | 20                    | 0.12  | 43    | 0.46  | 25                 | 0.11  | 0        | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 55         | 0.17  | 5     | 0.09  | 12                    | 0.15  | 28    | 0.61  | 10                 | 0.09  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 46         | 0.14  | 8     | 0.13  | 8                     | 0.09  | 15    | 0.32  | 15                 | 0.14  | 0        | 0.00  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 053              | Other helminthiases (B68-B71, B75, B77-B83)<br>โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ   | รวม  | 2,291      | 3.52  | 455   | 3.90  | 133                   | 0.80  | 172   | 1.86  | 1,493              | 6.82  | 38       | 0.68  |
|                  |   | ชาย  | 1,462      | 4.58  | 314   | 5.48  | 88                    | 1.09  | 92    | 2.02  | 951                | 8.73  | 17       | 0.64  |
|                  |   | หญิง | 829        | 2.50  | 141   | 2.37  | 45                    | 0.53  | 80    | 1.70  | 542                | 4.93  | 21       | 0.71  |
| 054              | Sequelae of tuberculosis (B90)<br>ผลตามหลังวัณโรค   | รวม  | 347        | 0.53  | 56    | 0.48  | 69                    | 0.42  | 48    | 0.52  | 154                | 0.70  | 20       | 0.36  |
|                  |   | ชาย  | 232        | 0.73  | 43    | 0.75  | 52                    | 0.65  | 34    | 0.74  | 90                 | 0.83  | 13       | 0.49  |
|                  |   | หญิง | 115        | 0.35  | 13    | 0.22  | 17                    | 0.20  | 14    | 0.30  | 64                 | 0.58  | 7        | 0.24  |
| 055              | Sequelae of poliomyelitis (B91)<br>ผลตามหลังโรคโปลิโอ   | รวม  | 2          | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 1          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                  | 0.01  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 1          | 0.00  | 0     | 0.00  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 056              | Sequelae of leprosy (B92)<br>ผลตามหลังโรคเรือน  | รวม  | 1          | 0.00  | 1     | 0.01  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 1          | 0.00  | 1     | 0.02  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 057              | Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)<br>โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ | รวม  | 3,322      | 5.11  | 797   | 6.83  | 426                   | 2.57  | 1,335 | 14.41 | 628                | 2.87  | 136      | 2.43  |
|                  |   | ชาย  | 1,909      | 5.99  | 457   | 7.98  | 248                   | 3.08  | 796   | 17.44 | 337                | 3.09  | 71       | 2.69  |
|                  |   | หญิง | 1,413      | 4.27  | 340   | 5.73  | 178                   | 2.09  | 539   | 11.47 | 291                | 2.65  | 65       | 2.20  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|---------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|               |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 058           | Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)<br>เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย  | รวม  | 19,069     | 29.33 | 2,835 | 24.30 | 4,699                 | 28.32 | 2,300 | 24.83 | 5,415              | 24.74 | 3,820    | 68.23  |
|               |  | ชาย  | 13,776     | 43.19 | 2,037 | 35.55 | 3,626                 | 44.98 | 1,759 | 38.54 | 3,444              | 31.60 | 2,910    | 110.22 |
|               |  | หญิง | 5,293      | 15.98 | 798   | 13.44 | 1,073                 | 12.58 | 541   | 11.51 | 1,971              | 17.93 | 910      | 30.76  |
| 059           | Malignant neoplasm of oesophagus (C15)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร   | รวม  | 7,746      | 11.91 | 1,173 | 10.05 | 2,627                 | 15.83 | 1,262 | 13.62 | 1,418              | 6.48  | 1,266    | 22.61  |
|               |  | ชาย  | 6,781      | 21.26 | 1,001 | 17.47 | 2,284                 | 28.33 | 1,116 | 24.45 | 1,238              | 11.36 | 1,142    | 43.26  |
|               |  | หญิง | 965        | 2.91  | 172   | 2.90  | 343                   | 4.02  | 146   | 3.11  | 180                | 1.64  | 124      | 4.19   |
| 060           | Malignant neoplasm of stomach (C16)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร   | รวม  | 9,490      | 14.60 | 2,502 | 21.44 | 1,937                 | 11.68 | 634   | 6.84  | 3,061              | 13.98 | 1,356    | 24.22  |
|               |  | ชาย  | 5,310      | 16.65 | 1,330 | 23.21 | 1,082                 | 13.42 | 407   | 8.92  | 1,759              | 16.14 | 732      | 27.73  |
|               |  | หญิง | 4,180      | 12.62 | 1,172 | 19.74 | 855                   | 10.03 | 227   | 4.83  | 1,302              | 11.84 | 624      | 21.09  |
| 061           | Malignant neoplasm of colon (C18)<br>เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่  | รวม  | 44,144     | 67.90 | 8,795 | 75.38 | 9,789                 | 59.00 | 5,175 | 55.86 | 13,154             | 60.09 | 7,231    | 129.15 |
|               |  | ชาย  | 22,635     | 70.97 | 4,451 | 77.68 | 4,992                 | 61.92 | 2,668 | 58.45 | 6,500              | 59.64 | 4,024    | 152.42 |
|               |  | หญิง | 21,509     | 64.94 | 4,344 | 73.15 | 4,797                 | 56.25 | 2,507 | 53.34 | 6,654              | 60.53 | 3,207    | 108.39 |
| 062           | Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)<br>เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เรคตัมและซิก มอยด์ เรคตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก | รวม  | 32,383     | 49.81 | 6,836 | 58.59 | 5,926                 | 35.72 | 3,080 | 33.24 | 10,777             | 49.23 | 5,764    | 102.95 |
|               |  | ชาย  | 18,735     | 58.74 | 3,991 | 69.65 | 3,506                 | 43.49 | 1,877 | 41.12 | 6,083              | 55.82 | 3,278    | 124.16 |
|               |  | หญิง | 13,648     | 41.21 | 2,845 | 47.91 | 2,420                 | 28.38 | 1,203 | 25.59 | 4,694              | 42.70 | 2,486    | 84.02  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |       | เหนือ |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 063              | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ                              | รวม  | 41,730     | 64.19 | 9,250 | 79.27  | 6,028                 | 36.33 | 2,672 | 28.84 | 17,482             | 79.86  | 6,298    | 112.49 |
|                  |  | ชาย  | 29,016     | 90.97 | 6,568 | 114.63 | 4,398                 | 54.55 | 1,882 | 41.23 | 11,708             | 107.43 | 4,460    | 168.93 |
|                  |  | หญิง | 12,714     | 38.39 | 2,682 | 45.16  | 1,630                 | 19.11 | 790   | 16.81 | 5,774              | 52.52  | 1,838    | 62.12  |
| 064              | Malignant neoplasm of pancreas (C25)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน   | รวม  | 4,349      | 6.69  | 1,019 | 8.73   | 1,023                 | 6.17  | 498   | 5.38  | 871                | 3.98   | 938      | 16.75  |
|                  |  | ชาย  | 2,178      | 6.83  | 466   | 8.13   | 526                   | 6.52  | 288   | 6.31  | 458                | 4.20   | 440      | 16.67  |
|                  |  | หญิง | 2,171      | 6.56  | 553   | 9.31   | 497                   | 5.83  | 210   | 4.47  | 413                | 3.76   | 498      | 16.83  |
| 065              | Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ                        | รวม  | 5,545      | 8.53  | 1,031 | 8.84   | 753                   | 4.54  | 494   | 5.33  | 2,388              | 10.91  | 879      | 15.70  |
|                  |  | ชาย  | 2,806      | 8.80  | 507   | 8.85   | 310                   | 3.85  | 240   | 5.26  | 1,343              | 12.32  | 406      | 15.38  |
|                  |  | หญิง | 2,739      | 8.27  | 524   | 8.82   | 443                   | 5.19  | 254   | 5.40  | 1,045              | 9.51   | 473      | 15.99  |
| 066              | Malignant neoplasm of larynx (C32)<br>เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง  | รวม  | 3,747      | 5.76  | 564   | 4.83   | 1,060                 | 6.39  | 527   | 5.69  | 879                | 4.02   | 717      | 12.81  |
|                  |  | ชาย  | 3,478      | 10.90 | 511   | 8.92   | 984                   | 12.21 | 496   | 10.87 | 818                | 7.51   | 669      | 25.34  |
|                  |  | หญิง | 269        | 0.81  | 53    | 0.89   | 76                    | 0.89  | 31    | 0.66  | 61                 | 0.55   | 48       | 1.62   |
| 067              | Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด                                | รวม  | 31,179     | 47.96 | 8,511 | 72.94  | 6,406                 | 38.61 | 3,412 | 36.83 | 8,936              | 40.82  | 3,914    | 69.91  |
|                  |  | ชาย  | 19,360     | 60.70 | 5,097 | 88.96  | 4,092                 | 50.76 | 2,218 | 48.59 | 5,614              | 51.51  | 2,339    | 88.59  |
|                  |  | หญิง | 11,819     | 35.69 | 3,414 | 57.49  | 2,314                 | 27.13 | 1,194 | 25.40 | 3,322              | 30.22  | 1,575    | 53.23  |
| 068              | Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะซ่องอก | รวม  | 2,061      | 3.17  | 361   | 3.09   | 378                   | 2.28  | 152   | 1.64  | 529                | 2.42   | 641      | 11.45  |
|                  |  | ชาย  | 1,390      | 4.36  | 247   | 4.31   | 271                   | 3.36  | 83    | 1.82  | 370                | 3.40   | 419      | 15.87  |
|                  |  | หญิง | 671        | 2.03  | 114   | 1.92   | 107                   | 1.25  | 69    | 1.47  | 159                | 1.45   | 222      | 7.50   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|---------------|---|------|------------|-------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|               |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 069           | Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41)<br>เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ  | รวม  | 2,642      | 4.06  | 326   | 2.79   | 300                   | 1.81  | 262   | 2.83  | 881                | 4.02  | 873      | 15.59  |
|               |   | ชาย  | 1,470      | 4.61  | 186   | 3.25   | 166                   | 2.06  | 135   | 2.96  | 505                | 4.63  | 478      | 18.11  |
|               |   | หญิง | 1,172      | 3.54  | 140   | 2.36   | 134                   | 1.57  | 127   | 2.70  | 376                | 3.42  | 395      | 13.35  |
| 070           | Malignant melanoma of skin (C43)<br>เนื้องอกร้ายที่เมลามีโนม่าของผิวหนัง                                  | รวม  | 563        | 0.87  | 103   | 0.88   | 109                   | 0.66  | 52    | 0.56  | 183                | 0.84  | 116      | 2.07   |
|               |   | ชาย  | 291        | 0.91  | 48    | 0.84   | 60                    | 0.74  | 26    | 0.57  | 104                | 0.95  | 53       | 2.01   |
|               |   | หญิง | 272        | 0.82  | 55    | 0.93   | 49                    | 0.57  | 26    | 0.55  | 79                 | 0.72  | 63       | 2.13   |
| 071           | Other malignant neoplasm of skin (C44)<br>เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ                                    | รวม  | 1,984      | 3.05  | 410   | 3.51   | 425                   | 2.56  | 212   | 2.29  | 593                | 2.71  | 344      | 6.14   |
|               |   | ชาย  | 962        | 3.02  | 208   | 3.63   | 231                   | 2.87  | 97    | 2.13  | 268                | 2.46  | 158      | 5.98   |
|               |   | หญิง | 1,022      | 3.09  | 202   | 3.40   | 194                   | 2.27  | 115   | 2.45  | 325                | 2.96  | 186      | 6.29   |
| 072           | Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49)<br>เนื้องอกร้ายที่เมโลไซเรียลและเนื้อยื่ออ่อน | รวม  | 4,256      | 6.55  | 838   | 7.18   | 617                   | 3.72  | 444   | 4.79  | 1,139              | 5.20  | 1,218    | 21.75  |
|               |   | ชาย  | 1,882      | 5.90  | 341   | 5.95   | 235                   | 2.91  | 224   | 4.91  | 554                | 5.08  | 528      | 20.00  |
|               |   | หญิง | 2,374      | 7.17  | 497   | 8.37   | 382                   | 4.48  | 220   | 4.68  | 585                | 5.32  | 690      | 23.32  |
| 073           | Malignant neoplasm of breast (C50)<br>เนื้องอกร้ายที่เต้านม   | รวม  | 32,037     | 49.28 | 8,395 | 71.95  | 6,148                 | 37.06 | 3,456 | 37.30 | 9,168              | 41.88 | 4,870    | 86.98  |
|               |   | ชาย  | 267        | 0.84  | 40    | 0.70   | 50                    | 0.62  | 31    | 0.68  | 87                 | 0.80  | 59       | 2.23   |
|               |   | หญิง | 31,770     | 95.93 | 8,355 | 140.69 | 6,098                 | 71.50 | 3,425 | 72.87 | 9,081              | 82.60 | 4,811    | 162.60 |
| 074           | Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)<br>เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก                                       | รวม  | 16,166     | 48.81 | 3,302 | 55.60  | 4,038                 | 47.35 | 1,637 | 34.83 | 4,063              | 36.96 | 3,126    | 105.65 |
|               |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|               |   | หญิง | 16,166     | 48.81 | 3,302 | 55.60  | 4,038                 | 47.35 | 1,637 | 34.83 | 4,063              | 36.96 | 3,126    | 105.65 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 075              | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุส่วนของมดลูก | รวม  | 8,546      | 25.80 | 1,353 | 22.78 | 1,530                 | 17.94 | 623   | 13.25 | 2,540              | 23.10 | 2,500    | 84.49  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 8,546      | 25.80 | 1,353 | 22.78 | 1,530                 | 17.94 | 623   | 13.25 | 2,540              | 23.10 | 2,500    | 84.49  |
| 076              | Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง            | รวม  | 16,902     | 51.03 | 2,556 | 43.04 | 2,579                 | 30.24 | 1,190 | 25.32 | 5,774              | 52.52 | 4,803    | 162.33 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 16,902     | 51.03 | 2,556 | 43.04 | 2,579                 | 30.24 | 1,190 | 25.32 | 5,774              | 52.52 | 4,803    | 162.33 |
| 077              | Malignant neoplasm of prostate (C61)<br>เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก  | รวม  | 5,969      | 18.71 | 1,147 | 20.02 | 1,125                 | 13.95 | 931   | 20.40 | 1,445              | 13.26 | 1,321    | 50.04  |
|                  |   | ชาย  | 5,969      | 18.71 | 1,147 | 20.02 | 1,125                 | 13.95 | 931   | 20.40 | 1,445              | 13.26 | 1,321    | 50.04  |
|                  |   | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
| 078              | Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย                  | รวม  | 1,849      | 5.80  | 231   | 4.03  | 351                   | 4.35  | 254   | 5.56  | 743                | 6.82  | 270      | 10.23  |
|                  |   | ชาย  | 1,849      | 5.80  | 231   | 4.03  | 351                   | 4.35  | 254   | 5.56  | 743                | 6.82  | 270      | 10.23  |
|                  |   | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00   |
| 079              | Malignant neoplasm of bladder (C67)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ  | รวม  | 8,289      | 12.75 | 1,567 | 13.43 | 1,489                 | 8.98  | 1,401 | 15.12 | 2,129              | 9.73  | 1,703    | 30.42  |
|                  |   | ชาย  | 6,565      | 20.58 | 1,136 | 19.83 | 1,155                 | 14.33 | 1,211 | 26.53 | 1,745              | 16.01 | 1,318    | 49.92  |
|                  |   | หญิง | 1,724      | 5.21  | 431   | 7.26  | 334                   | 3.92  | 190   | 4.04  | 384                | 3.49  | 385      | 13.01  |
| 080              | Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ                          | รวม  | 2,534      | 3.90  | 531   | 4.55  | 361                   | 2.18  | 319   | 3.44  | 713                | 3.26  | 610      | 10.90  |
|                  |   | ชาย  | 1,666      | 5.22  | 342   | 5.97  | 215                   | 2.67  | 197   | 4.32  | 518                | 4.75  | 394      | 14.92  |
|                  |   | หญิง | 868        | 2.62  | 189   | 3.18  | 146                   | 1.71  | 122   | 2.60  | 195                | 1.77  | 216      | 7.30   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 081              | Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)<br>เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ  | รวม  | 764        | 1.18  | 132   | 1.13  | 44                    | 0.27  | 97    | 1.05  | 139                | 0.63  | 352      | 6.29   |
|                  |   | ชาย  | 395        | 1.24  | 84    | 1.47  | 26                    | 0.32  | 53    | 1.16  | 68                 | 0.62  | 164      | 6.21   |
|                  |   | หญิง | 369        | 1.11  | 48    | 0.81  | 18                    | 0.21  | 44    | 0.94  | 71                 | 0.65  | 188      | 6.35   |
| 082              | Malignant neoplasm of brain (C71)<br>เนื้องอกร้ายของสมอง  | รวม  | 3,551      | 5.46  | 535   | 4.59  | 496                   | 2.99  | 497   | 5.36  | 1,003              | 4.58  | 1,020    | 18.22  |
|                  |   | ชาย  | 1,986      | 6.23  | 265   | 4.62  | 288                   | 3.57  | 308   | 6.75  | 528                | 4.84  | 597      | 22.61  |
|                  |   | หญิง | 1,565      | 4.73  | 270   | 4.55  | 208                   | 2.44  | 189   | 4.02  | 475                | 4.32  | 423      | 14.30  |
| 083              | Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)<br>เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาท   | รวม  | 370        | 0.57  | 55    | 0.47  | 95                    | 0.57  | 54    | 0.58  | 99                 | 0.45  | 67       | 1.20   |
|                  |   | ชาย  | 163        | 0.51  | 29    | 0.51  | 28                    | 0.35  | 33    | 0.72  | 38                 | 0.35  | 35       | 1.33   |
|                  |   | หญิง | 207        | 0.63  | 26    | 0.44  | 67                    | 0.79  | 21    | 0.45  | 61                 | 0.55  | 32       | 1.08   |
| 084              | Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)<br>เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง | รวม  | 28,715     | 44.17 | 5,553 | 47.59 | 5,249                 | 31.64 | 2,417 | 26.09 | 8,958              | 40.92 | 6,538    | 116.77 |
|                  |   | ชาย  | 12,516     | 39.24 | 2,522 | 44.02 | 2,288                 | 28.38 | 1,131 | 24.78 | 3,987              | 36.58 | 2,588    | 98.03  |
|                  |   | หญิง | 16,199     | 48.91 | 3,031 | 51.04 | 2,961                 | 34.72 | 1,286 | 27.36 | 4,971              | 45.22 | 3,950    | 133.50 |
| 085              | Hodgkin's disease (C81)<br>โรคยอดกินส์  | รวม  | 1,659      | 2.55  | 251   | 2.15  | 272                   | 1.64  | 172   | 1.86  | 465                | 2.12  | 499      | 8.91   |
|                  |   | ชาย  | 1,016      | 3.19  | 165   | 2.88  | 152                   | 1.89  | 108   | 2.37  | 297                | 2.73  | 294      | 11.14  |
|                  |   | หญิง | 643        | 1.94  | 86    | 1.45  | 120                   | 1.41  | 64    | 1.36  | 168                | 1.53  | 205      | 6.93   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 086              | Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)<br>เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไซโรคอดกินส์  | รวม  | 15,906     | 24.47 | 2,699 | 23.13 | 2,774                 | 16.72 | 1,467 | 15.83 | 5,355              | 24.46 | 3,611    | 64.50 |
|                  |   | ชาย  | 9,167      | 28.74 | 1,644 | 28.69 | 1,600                 | 19.85 | 802   | 17.57 | 3,105              | 28.49 | 2,016    | 76.36 |
|                  |   | หญิง | 6,739      | 20.35 | 1,055 | 17.77 | 1,174                 | 13.77 | 665   | 14.15 | 2,250              | 20.47 | 1,595    | 53.91 |
| 087              | Leukaemia (C91-C95)<br>ลิวโคเมีย  | รวม  | 18,284     | 28.12 | 3,151 | 27.00 | 3,698                 | 22.29 | 2,490 | 26.88 | 6,191              | 28.28 | 2,754    | 49.19 |
|                  |   | ชาย  | 10,175     | 31.90 | 1,732 | 30.23 | 1,959                 | 24.30 | 1,346 | 29.49 | 3,543              | 32.51 | 1,595    | 60.41 |
|                  |   | หญิง | 8,109      | 24.48 | 1,419 | 23.89 | 1,739                 | 20.39 | 1,144 | 24.34 | 2,648              | 24.09 | 1,159    | 39.17 |
| 088              | Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoitic and related tissue (C88-C90, C96)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ | รวม  | 4,403      | 6.77  | 721   | 6.18  | 737                   | 4.44  | 459   | 4.95  | 1,672              | 7.64  | 814      | 14.54 |
|                  |   | ชาย  | 2,237      | 7.01  | 384   | 6.70  | 369                   | 4.58  | 213   | 4.67  | 885                | 8.12  | 386      | 14.62 |
|                  |   | หญิง | 2,166      | 6.54  | 337   | 5.67  | 368                   | 4.32  | 246   | 5.23  | 787                | 7.16  | 428      | 14.47 |
| 089              | Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)<br>มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก   | รวม  | 1,378      | 4.16  | 211   | 3.55  | 351                   | 4.12  | 173   | 3.68  | 519                | 4.72  | 124      | 4.19  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 1,378      | 4.16  | 211   | 3.55  | 351                   | 4.12  | 173   | 3.68  | 519                | 4.72  | 124      | 4.19  |
| 090              | Benign neoplasm of skin (D22-D23)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง  | รวม  | 742        | 1.14  | 103   | 0.88  | 73                    | 0.44  | 142   | 1.53  | 281                | 1.28  | 143      | 2.55  |
|                  |   | ชาย  | 277        | 0.87  | 38    | 0.66  | 27                    | 0.33  | 50    | 1.10  | 98                 | 0.90  | 64       | 2.42  |
|                  |   | หญิง | 465        | 1.40  | 65    | 1.09  | 46                    | 0.54  | 92    | 1.96  | 183                | 1.66  | 79       | 2.67  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | พื้นประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 091              | Benign neoplasm of breast (D24)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม   | รวม  | 1,239      | 1.91  | 183   | 1.57  | 272                   | 1.64  | 213   | 2.30  | 422                | 1.93  | 149      | 2.66  |
|                  |   | ชาย  | 4          | 0.01  | 1     | 0.02  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 2                  | 0.02  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 1,235      | 3.73  | 182   | 3.06  | 271                   | 3.18  | 213   | 4.53  | 420                | 3.82  | 149      | 5.04  |
| 092              | Leiomyoma of uterus (D25)<br>โอลิโอมิโอนาทึมดลูก  | รวม  | 17,871     | 53.96 | 2,550 | 42.94 | 3,252                 | 38.13 | 2,312 | 49.19 | 7,467              | 67.92 | 2,290    | 77.40 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 17,871     | 53.96 | 2,550 | 42.94 | 3,252                 | 38.13 | 2,312 | 49.19 | 7,467              | 67.92 | 2,290    | 77.40 |
| 093              | Benigh neoplasm of ovary (D27)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่  | รวม  | 2,215      | 6.69  | 414   | 6.97  | 337                   | 3.95  | 332   | 7.06  | 710                | 6.46  | 422      | 14.26 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 2,215      | 6.69  | 414   | 6.97  | 337                   | 3.95  | 332   | 7.06  | 710                | 6.46  | 422      | 14.26 |
| 094              | Benigh neoplasm of urinary organs<br>(D30)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ   | รวม  | 158        | 0.24  | 30    | 0.26  | 44                    | 0.27  | 15    | 0.16  | 36                 | 0.16  | 33       | 0.59  |
|                  |   | ชาย  | 77         | 0.24  | 14    | 0.24  | 27                    | 0.33  | 13    | 0.28  | 16                 | 0.15  | 7        | 0.27  |
|                  |   | หญิง | 81         | 0.24  | 16    | 0.27  | 17                    | 0.20  | 2     | 0.04  | 20                 | 0.18  | 26       | 0.88  |
| 095              | Benigh neoplasm of brain and other<br>parts of central nervous system (D33)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของ<br>ระบบประสาทส่วนกลาง | รวม  | 1,171      | 1.80  | 209   | 1.79  | 270                   | 1.63  | 148   | 1.60  | 232                | 1.06  | 312      | 5.57  |
|                  |   | ชาย  | 507        | 1.59  | 78    | 1.36  | 120                   | 1.49  | 63    | 1.38  | 113                | 1.04  | 133      | 5.04  |
|                  |   | หญิง | 664        | 2.00  | 131   | 2.21  | 150                   | 1.76  | 85    | 1.81  | 119                | 1.08  | 179      | 6.05  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 096              | Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48)<br>เนื้องอกไมร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกทางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม | รวม  | 39,692        | 61.05  | 7,346  | 62.96  | 7,586                 | 45.73  | 4,763  | 51.41  | 13,534             | 61.82  | 6,463    | 115.43 |
|                  |  | ชาย  | 16,790        | 52.64  | 3,212  | 56.06  | 3,153                 | 39.11  | 2,069  | 45.33  | 5,831              | 53.50  | 2,525    | 95.64  |
|                  |  | หญิง | 22,902        | 69.15  | 4,134  | 69.61  | 4,433                 | 51.98  | 2,694  | 57.32  | 7,703              | 70.07  | 3,938    | 133.10 |
| 097              | Iron deficiency anaemia (D50)<br>โลหิตขาดจากการขาดธาตุเหล็ก  | รวม  | 10,719        | 16.49  | 2,044  | 17.52  | 2,868                 | 17.29  | 1,213  | 13.09  | 4,226              | 19.30  | 368      | 6.57   |
|                  |  | ชาย  | 3,621         | 11.35  | 745    | 13.00  | 936                   | 11.61  | 383    | 8.39   | 1,423              | 13.06  | 134      | 5.08   |
|                  |  | หญิง | 7,098         | 21.43  | 1,299  | 21.87  | 1,932                 | 22.65  | 830    | 17.66  | 2,803              | 25.50  | 234      | 7.91   |
| 098              | Other anaemia (D51-D64)<br>โลหิตขาดอื่น ๆ  | รวม  | 139,517       | 214.60 | 37,778 | 323.77 | 28,123                | 169.51 | 13,604 | 146.84 | 54,635             | 249.57 | 5,377    | 96.04  |
|                  |  | ชาย  | 59,720        | 187.24 | 17,164 | 299.56 | 11,673                | 144.79 | 5,723  | 125.38 | 22,599             | 207.37 | 2,561    | 97.00  |
|                  |  | หญิง | 79,797        | 240.94 | 20,614 | 347.12 | 16,450                | 192.89 | 7,881  | 167.67 | 32,036             | 291.41 | 2,816    | 95.18  |
| 099              | Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77)<br>ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด  | รวม  | 20,491        | 31.52  | 4,033  | 34.56  | 4,399                 | 26.52  | 2,355  | 25.42  | 7,871              | 35.95  | 1,833    | 32.74  |
|                  |  | ชาย  | 9,672         | 30.33  | 1,893  | 33.04  | 1,873                 | 23.23  | 1,076  | 23.57  | 3,942              | 36.17  | 888      | 33.63  |
|                  |  | หญิง | 10,819        | 32.67  | 2,140  | 36.04  | 2,526                 | 29.62  | 1,279  | 27.21  | 3,929              | 35.74  | 945      | 31.94  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 100              | Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)<br>ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน | รวม  | 901        | 1.39   | 140    | 1.20   | 181                   | 1.09   | 75     | 0.81   | 195                | 0.89   | 310      | 5.54  |
|                  |   | ชาย  | 703        | 2.20   | 106    | 1.85   | 164                   | 2.03   | 63     | 1.38   | 165                | 1.51   | 205      | 7.76  |
|                  |   | หญิง | 198        | 0.60   | 34     | 0.57   | 17                    | 0.20   | 12     | 0.26   | 30                 | 0.27   | 105      | 3.55  |
| 101              | Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02)<br>การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมรั้ยรอยด์ | รวม  | 35         | 0.05   | 6      | 0.05   | 9                     | 0.05   | 6      | 0.06   | 12                 | 0.05   | 2        | 0.04  |
|                  |   | ชาย  | 9          | 0.03   | 2      | 0.03   | 6                     | 0.07   | 0      | 0.00   | 1                  | 0.01   | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 26         | 0.08   | 4      | 0.07   | 3                     | 0.04   | 6      | 0.13   | 11                 | 0.10   | 2        | 0.07  |
| 102              | Thyrotoxicosis (E05)<br>โรคพิษร้ายรอยด์   | รวม  | 4,768      | 7.33   | 712    | 6.10   | 1,004                 | 6.05   | 572    | 6.17   | 2,042              | 9.33   | 438      | 7.82  |
|                  |   | ชาย  | 1,390      | 4.36   | 168    | 2.93   | 327                   | 4.06   | 166    | 3.64   | 591                | 5.42   | 138      | 5.23  |
|                  |   | หญิง | 3,378      | 10.20  | 544    | 9.16   | 677                   | 7.94   | 406    | 8.64   | 1,451              | 13.20  | 300      | 10.14 |
| 103              | Other disorders of thyroid (E03-E04,<br>E06-E07)<br>ความผิดปกติของต่อมรั้ยรอยด์อื่น ๆ                   | รวม  | 8,314      | 12.79  | 1,510  | 12.94  | 1,394                 | 8.40   | 1,255  | 13.55  | 3,071              | 14.03  | 1,084    | 19.36 |
|                  |   | ชาย  | 1,107      | 3.47   | 204    | 3.56   | 190                   | 2.36   | 165    | 3.61   | 376                | 3.45   | 172      | 6.51  |
|                  |   | หญิง | 7,207      | 21.76  | 1,306  | 21.99  | 1,204                 | 14.12  | 1,090  | 23.19  | 2,695              | 24.51  | 912      | 30.82 |
| 104              | Diabetes mellitus (E10-E14)<br>เบาหวาน  | รวม  | 109,145    | 167.88 | 19,311 | 165.50 | 24,858                | 149.83 | 13,389 | 144.52 | 46,374             | 211.84 | 5,213    | 93.11 |
|                  |   | ชาย  | 42,696     | 133.87 | 8,101  | 141.38 | 9,377                 | 116.31 | 5,306  | 116.25 | 17,654             | 161.99 | 2,258    | 85.53 |
|                  |   | หญิง | 66,449     | 200.64 | 11,210 | 188.77 | 15,481                | 181.53 | 8,083  | 171.97 | 28,720             | 261.25 | 2,955    | 99.87 |
| 105              | Malnutrition (E40-E46)<br>ทุพโภชนาการ   | รวม  | 473        | 0.73   | 69     | 0.59   | 104                   | 0.63   | 140    | 1.51   | 71                 | 0.32   | 89       | 1.59  |
|                  |   | ชาย  | 259        | 0.81   | 33     | 0.58   | 54                    | 0.67   | 95     | 2.08   | 25                 | 0.23   | 52       | 1.97  |
|                  |   | หญิง | 214        | 0.65   | 36     | 0.61   | 50                    | 0.59   | 45     | 0.96   | 46                 | 0.42   | 37       | 1.25  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | พื้นประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 106              | Vitamin A deficiency (E50)<br>การขาดวิตามินเอ   | รวม  | 10         | 0.02  | 2     | 0.02  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 6                  | 0.03  | 1        | 0.02  |
|                  |   | ชาย  | 2          | 0.01  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 2                  | 0.02  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 8          | 0.02  | 2     | 0.03  | 1                     | 0.01  | 0     | 0.00  | 4                  | 0.04  | 1        | 0.03  |
| 107              | Other vitamin deficiencies (E51-E56)<br>การขาดวิตามินอื่น ๆ   | รวม  | 309        | 0.48  | 66    | 0.57  | 65                    | 0.39  | 27    | 0.29  | 112                | 0.51  | 39       | 0.70  |
|                  |   | ชาย  | 223        | 0.70  | 45    | 0.79  | 44                    | 0.55  | 20    | 0.44  | 87                 | 0.80  | 27       | 1.02  |
|                  |   | หญิง | 86         | 0.26  | 21    | 0.35  | 21                    | 0.25  | 7     | 0.15  | 25                 | 0.23  | 12       | 0.41  |
| 108              | Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64)<br>ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ | รวม  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 109              | Obesity (E66)<br>โรคอ้วน  | รวม  | 645        | 0.99  | 91    | 0.78  | 57                    | 0.34  | 140   | 1.51  | 67                 | 0.31  | 290      | 5.18  |
|                  |   | ชาย  | 315        | 0.99  | 54    | 0.94  | 23                    | 0.29  | 64    | 1.40  | 29                 | 0.27  | 145      | 5.49  |
|                  |   | หญิง | 330        | 1.00  | 37    | 0.62  | 34                    | 0.40  | 76    | 1.62  | 38                 | 0.35  | 145      | 4.90  |
| 110              | Volume depletion (E86)<br>การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย  | รวม  | 812        | 1.25  | 202   | 1.73  | 197                   | 1.19  | 97    | 1.05  | 212                | 0.97  | 104      | 1.86  |
|                  |   | ชาย  | 378        | 1.19  | 93    | 1.62  | 91                    | 1.13  | 50    | 1.10  | 92                 | 0.84  | 52       | 1.97  |
|                  |   | หญิง | 434        | 1.31  | 109   | 1.84  | 106                   | 1.24  | 47    | 1.00  | 120                | 1.09  | 52       | 1.76  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ          | ทั่วประเทศไทย        |                     | เหนือ               |                      | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |                     | ใต้               |                   | ตะวันออกเฉียงเหนือ   |                      | กรุงเทพฯ          |                   |
|------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  |              | จำนวน                | อัตรา               | จำนวน               | อัตรา                | จำนวน                 | อัตรา               | จำนวน             | อัตรา             | จำนวน                | อัตรา                | จำนวน             | อัตรา             |
| 111              | Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90)<br>ความผิดปกติของต่อมรைท์ท่อ โภชนาการและเมะทะบลอกิอื่น ๆ                | รวม ชาย หญิง | 76,041 31,477 44,564 | 116.96 98.69 134.56 | 19,472 8,260 11,212 | 166.88 144.16 188.80 | 17,927 7,138 10,789   | 108.06 88.54 126.51 | 6,499 2,554 3,945 | 70.15 55.95 83.93 | 28,056 11,816 16,240 | 128.16 108.42 147.73 | 4,087 1,709 2,378 | 73.00 64.73 80.37 |
| 112              | Dementia (F00-F03)<br>สมองเสื่อม   | รวม ชาย หญิง | 1,353 650 703        | 2.08 2.04 2.12      | 242 115 127         | 2.07 2.01 2.14       | 339 170 169           | 2.04 2.11 1.98      | 111 54 57         | 1.20 1.18 1.21    | 470 222 248          | 2.15 2.04 2.26       | 191 89 102        | 3.41 3.37 3.45    |
| 113              | Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)<br>ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลกอฮอล์   | รวม ชาย หญิง | 42,644 38,809 3,835  | 65.59 121.68 11.58  | 10,550 9,595 955    | 90.42 167.46 16.08   | 6,774 5,984 790       | 40.83 74.22 9.26    | 2,018 1,900 118   | 21.78 41.63 2.51  | 22,190 20,303 1,887  | 101.36 186.30 17.17  | 1,112 1,027 85    | 19.86 38.90 2.87  |
| 114              | Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)<br>ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ | รวม ชาย หญิง | 10,508 9,343 1,165   | 16.16 29.29 3.52    | 1,604 1,351 253     | 13.75 23.58 4.26     | 2,771 2,435 336       | 16.70 30.20 3.94    | 2,097 1,973 124   | 22.63 43.23 2.64  | 3,025 2,747 278      | 13.82 25.21 2.53     | 1,011 837 174     | 18.06 31.70 5.88  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 115              | Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)<br>จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลง     | รวม  | 34,612     | 53.24 | 5,207 | 44.63 | 6,035                 | 36.38 | 4,217 | 45.52 | 15,054             | 68.77 | 4,099    | 73.21 |
|                  |   | ชาย  | 23,209     | 72.77 | 3,261 | 56.91 | 3,601                 | 44.67 | 3,102 | 67.96 | 10,694             | 98.13 | 2,551    | 96.62 |
|                  |   | หญิง | 11,403     | 34.43 | 1,946 | 32.77 | 2,434                 | 28.54 | 1,115 | 23.72 | 4,360              | 39.66 | 1,548    | 52.32 |
| 116              | Mood(affective) disorders (F30-F39)<br>ความผิดปกติทางอารมณ์   | รวม  | 11,515     | 17.71 | 2,940 | 25.20 | 1,776                 | 10.71 | 1,783 | 19.25 | 4,107              | 18.76 | 909      | 16.24 |
|                  |   | ชาย  | 3,679      | 11.53 | 934   | 16.30 | 626                   | 7.76  | 608   | 13.32 | 1,147              | 10.52 | 364      | 13.79 |
|                  |   | หญิง | 7,836      | 23.66 | 2,006 | 33.78 | 1,150                 | 13.48 | 1,175 | 25.00 | 2,960              | 26.93 | 545      | 18.42 |
| 117              | Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48)<br>โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ     | รวม  | 7,587      | 11.67 | 1,564 | 13.40 | 1,396                 | 8.41  | 1,254 | 13.54 | 3,006              | 13.73 | 367      | 6.55  |
|                  |   | ชาย  | 2,286      | 7.17  | 431   | 7.52  | 568                   | 7.05  | 376   | 8.24  | 761                | 6.98  | 150      | 5.68  |
|                  |   | หญิง | 5,301      | 16.01 | 1,133 | 19.08 | 828                   | 9.71  | 878   | 18.68 | 2,245              | 20.42 | 217      | 7.33  |
| 118              | Mental retardation (F70-F79)<br>ภาวะปัญญาอ่อน   | รวม  | 3,367      | 5.18  | 175   | 1.50  | 377                   | 2.27  | 93    | 1.00  | 303                | 1.38  | 2,419    | 43.21 |
|                  |   | ชาย  | 2,113      | 6.62  | 94    | 1.64  | 246                   | 3.05  | 38    | 0.83  | 171                | 1.57  | 1,564    | 59.24 |
|                  |   | หญิง | 1,254      | 3.79  | 81    | 1.36  | 131                   | 1.54  | 55    | 1.17  | 132                | 1.20  | 855      | 28.90 |
| 119              | Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99)<br>ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ | รวม  | 11,139     | 17.13 | 2,329 | 19.96 | 2,506                 | 15.11 | 629   | 6.79  | 1,780              | 8.13  | 3,895    | 69.57 |
|                  |   | ชาย  | 7,354      | 23.06 | 1,603 | 27.98 | 1,807                 | 22.41 | 360   | 7.89  | 985                | 9.04  | 2,599    | 98.44 |
|                  |   | หญิง | 3,785      | 11.43 | 726   | 12.23 | 699                   | 8.20  | 269   | 5.72  | 795                | 7.23  | 1,296    | 43.80 |
| 120              | Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09)<br>การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง         | รวม  | 12,561     | 19.32 | 2,857 | 24.49 | 2,316                 | 13.96 | 1,061 | 11.45 | 5,568              | 25.43 | 759      | 13.56 |
|                  |   | ชาย  | 7,641      | 23.96 | 1,805 | 31.50 | 1,373                 | 17.03 | 635   | 13.91 | 3,430              | 31.47 | 398      | 15.08 |
|                  |   | หญิง | 4,920      | 14.86 | 1,052 | 17.71 | 943                   | 11.06 | 426   | 9.06  | 2,138              | 19.45 | 361      | 12.20 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศไทย |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 121              | Parkinson's disease (G20)<br>โรคพาคินซัน   | รวม  | 1,188         | 1.83  | 221   | 1.89  | 217                   | 1.31  | 97    | 1.05  | 503                | 2.30  | 150      | 2.68  |
|                  |  | ชาย  | 598           | 1.87  | 104   | 1.82  | 113                   | 1.40  | 37    | 0.81  | 261                | 2.39  | 83       | 3.14  |
|                  |  | หญิง | 590           | 1.78  | 117   | 1.97  | 104                   | 1.22  | 60    | 1.28  | 242                | 2.20  | 67       | 2.26  |
| 122              | Alzheimer's disease (G30)<br>โรคแอลไซเมอร์   | รวม  | 530           | 0.82  | 156   | 1.34  | 109                   | 0.66  | 43    | 0.46  | 120                | 0.55  | 102      | 1.82  |
|                  |  | ชาย  | 201           | 0.63  | 69    | 1.20  | 36                    | 0.45  | 14    | 0.31  | 47                 | 0.43  | 35       | 1.33  |
|                  |  | หญิง | 329           | 0.99  | 87    | 1.47  | 73                    | 0.86  | 29    | 0.62  | 73                 | 0.66  | 67       | 2.26  |
| 123              | Multiple sclerosis (G35)<br>มัลติเพล สเคลโลโรสิส   | รวม  | 240           | 0.37  | 62    | 0.53  | 27                    | 0.16  | 38    | 0.41  | 68                 | 0.31  | 45       | 0.80  |
|                  |  | ชาย  | 35            | 0.11  | 7     | 0.12  | 8                     | 0.10  | 5     | 0.11  | 4                  | 0.04  | 11       | 0.42  |
|                  |  | หญิง | 205           | 0.62  | 55    | 0.93  | 19                    | 0.22  | 33    | 0.70  | 64                 | 0.58  | 34       | 1.15  |
| 124              | Epilepsy (G40-G41)<br>ลมบ้าหมู   | รวม  | 39,628        | 60.95 | 8,201 | 70.28 | 9,203                 | 55.47 | 5,830 | 62.93 | 13,885             | 63.43 | 2,509    | 44.81 |
|                  |  | ชาย  | 25,331        | 79.42 | 5,302 | 92.53 | 5,966                 | 74.00 | 3,673 | 80.47 | 8,874              | 81.43 | 1,516    | 57.42 |
|                  |  | หญิง | 14,297        | 43.17 | 2,899 | 48.82 | 3,237                 | 37.96 | 2,157 | 45.89 | 5,011              | 45.58 | 993      | 33.56 |
| 125              | Migraine and other headache syndromes (G43-G44)<br>โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ                      | รวม  | 9,164         | 14.10 | 1,460 | 12.51 | 1,703                 | 10.27 | 1,746 | 18.85 | 3,999              | 18.27 | 256      | 4.57  |
|                  |  | ชาย  | 3,038         | 9.53  | 474   | 8.27  | 534                   | 6.62  | 585   | 12.82 | 1,352              | 12.41 | 93       | 3.52  |
|                  |  | หญิง | 6,126         | 18.50 | 986   | 16.60 | 1,169                 | 13.71 | 1,161 | 24.70 | 2,647              | 24.08 | 163      | 5.51  |
| 126              | Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)<br>โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่ม | รวม  | 9,848         | 15.15 | 1,876 | 16.08 | 2,502                 | 15.08 | 1,567 | 16.91 | 3,170              | 14.48 | 733      | 13.09 |
|                  |  | ชาย  | 5,401         | 16.93 | 1,039 | 18.13 | 1,396                 | 17.32 | 881   | 19.30 | 1,694              | 15.54 | 391      | 14.81 |
|                  |  | หญิง | 4,447         | 13.43 | 837   | 14.09 | 1,106                 | 12.97 | 686   | 14.60 | 1,476              | 13.43 | 342      | 11.56 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 127              | Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)<br>ความผิดปกติของสันประสาท รากประสาท  | รวม  | 4,623      | 7.11  | 734   | 6.29  | 847                   | 5.11  | 728   | 7.86  | 1,634              | 7.46  | 680      | 12.15 |
|                  |  | ชาย  | 1,806      | 5.66  | 302   | 5.27  | 341                   | 4.23  | 215   | 4.71  | 661                | 6.07  | 287      | 10.87 |
|                  |  | หญิง | 2,817      | 8.51  | 432   | 7.27  | 506                   | 5.93  | 513   | 10.91 | 973                | 8.85  | 393      | 13.28 |
| 128              | Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83)<br>สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ                                   | รวม  | 4,874      | 7.50  | 885   | 7.58  | 985                   | 5.94  | 853   | 9.21  | 1,499              | 6.85  | 652      | 11.65 |
|                  |  | ชาย  | 2,967      | 9.30  | 573   | 10.00 | 580                   | 7.19  | 501   | 10.98 | 916                | 8.41  | 397      | 15.04 |
|                  |  | หญิง | 1,907      | 5.76  | 312   | 5.25  | 405                   | 4.75  | 352   | 7.49  | 583                | 5.30  | 255      | 8.62  |
| 129              | Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)<br>โรคของระบบประสาಥอื่น ๆ | รวม  | 25,990     | 39.98 | 5,365 | 45.98 | 4,416                 | 26.62 | 2,188 | 23.62 | 11,241             | 51.35 | 2,780    | 49.65 |
|                  |  | ชาย  | 16,311     | 51.14 | 3,361 | 58.66 | 2,677                 | 33.20 | 1,274 | 27.91 | 7,484              | 68.67 | 1,515    | 57.38 |
|                  |  | หญิง | 9,679      | 29.22 | 2,004 | 33.75 | 1,739                 | 20.39 | 914   | 19.45 | 3,757              | 34.18 | 1,265    | 42.75 |
| 130              | Inflammation of eyelid (H00-H01)<br>การอักเสบของหนังตา   | รวม  | 1,681      | 2.59  | 302   | 2.59  | 328                   | 1.98  | 281   | 3.03  | 705                | 3.22  | 65       | 1.16  |
|                  |  | ชาย  | 819        | 2.57  | 148   | 2.58  | 144                   | 1.79  | 148   | 3.24  | 349                | 3.20  | 30       | 1.14  |
|                  |  | หญิง | 862        | 2.60  | 154   | 2.59  | 184                   | 2.16  | 133   | 2.83  | 356                | 3.24  | 35       | 1.18  |
| 131              | Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13)<br>เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตา                       | รวม  | 9,746      | 14.99 | 1,793 | 15.37 | 2,203                 | 13.28 | 755   | 8.15  | 4,742              | 21.66 | 253      | 4.52  |
|                  |  | ชาย  | 3,477      | 10.90 | 679   | 11.85 | 847                   | 10.51 | 281   | 6.16  | 1,535              | 14.08 | 135      | 5.11  |
|                  |  | หญิง | 6,269      | 18.93 | 1,114 | 18.76 | 1,356                 | 15.90 | 474   | 10.08 | 3,207              | 29.17 | 118      | 3.99  |
| 132              | Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19)<br>กระ杰กตาอักเสบและความผิดปกติของตา                               | รวม  | 6,494      | 9.99  | 1,209 | 10.36 | 1,383                 | 8.34  | 683   | 7.37  | 2,422              | 11.06 | 797      | 14.24 |
|                  |  | ชาย  | 3,935      | 12.34 | 753   | 13.14 | 807                   | 10.01 | 438   | 9.60  | 1,501              | 13.77 | 436      | 16.51 |
|                  |  | หญิง | 2,559      | 7.73  | 456   | 7.68  | 576                   | 6.75  | 245   | 5.21  | 921                | 8.38  | 361      | 12.20 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | พื้นประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 133              | Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28)<br>ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ | รวม  | 207,137    | 318.61 | 43,538 | 373.13 | 59,031                | 355.82 | 21,779 | 235.08 | 60,302             | 275.46 | 22,487   | 401.63 |
|                  |   | ชาย  | 88,803     | 278.43 | 19,194 | 334.99 | 24,154                | 299.60 | 9,304  | 203.84 | 26,136             | 239.82 | 10,015   | 379.34 |
|                  |   | หญิง | 118,334    | 357.30 | 24,344 | 409.93 | 34,877                | 408.96 | 12,475 | 265.42 | 34,166             | 310.79 | 12,472   | 421.53 |
| 134              | Retinal detachments and breaks (H33)<br>จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา                     | รวม  | 5,681      | 8.74   | 892    | 7.64   | 1,466                 | 8.84   | 549    | 5.93   | 1,024              | 4.68   | 1,750    | 31.26  |
|                  |   | ชาย  | 3,423      | 10.73  | 517    | 9.02   | 899                   | 11.15  | 318    | 6.97   | 617                | 5.66   | 1,072    | 40.60  |
|                  |   | หญิง | 2,258      | 6.82   | 375    | 6.31   | 567                   | 6.65   | 231    | 4.91   | 407                | 3.70   | 678      | 22.92  |
| 135              | Glaucoma (H40-H42)<br>ต้อหิน  | รวม  | 6,916      | 10.64  | 1,724  | 14.78  | 1,351                 | 8.14   | 648    | 6.99   | 2,081              | 9.51   | 1,112    | 19.86  |
|                  |   | ชาย  | 3,067      | 9.62   | 704    | 12.29  | 598                   | 7.42   | 317    | 6.95   | 811                | 7.44   | 637      | 24.13  |
|                  |   | หญิง | 3,849      | 11.62  | 1,020  | 17.18  | 753                   | 8.83   | 331    | 7.04   | 1,270              | 11.55  | 475      | 16.05  |
| 136              | Strabismus (H49-H50)<br>ตาเหล่  | รวม  | 1,944      | 2.99   | 206    | 1.77   | 319                   | 1.92   | 298    | 3.22   | 467                | 2.13   | 654      | 11.68  |
|                  |   | ชาย  | 916        | 2.87   | 102    | 1.78   | 170                   | 2.11   | 146    | 3.20   | 201                | 1.84   | 297      | 11.25  |
|                  |   | หญิง | 1,028      | 3.10   | 104    | 1.75   | 149                   | 1.75   | 152    | 3.23   | 266                | 2.42   | 357      | 12.07  |
| 137              | Disorders of refraction and accommodation (H52)<br>ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง                 | รวม  | 69         | 0.11   | 13     | 0.11   | 13                    | 0.08   | 9      | 0.10   | 24                 | 0.11   | 10       | 0.18   |
|                  |   | ชาย  | 34         | 0.11   | 3      | 0.05   | 7                     | 0.09   | 5      | 0.11   | 13                 | 0.12   | 6        | 0.23   |
|                  |   | หญิง | 35         | 0.11   | 10     | 0.17   | 6                     | 0.07   | 4      | 0.09   | 11                 | 0.10   | 4        | 0.14   |
| 138              | Blindness and low vision (H54)<br>ตาบอดและสายตาเสื่อมทาง  | รวม  | 360        | 0.55   | 46     | 0.39   | 167                   | 1.01   | 23     | 0.25   | 55                 | 0.25   | 69       | 1.23   |
|                  |   | ชาย  | 155        | 0.49   | 24     | 0.42   | 68                    | 0.84   | 13     | 0.28   | 22                 | 0.20   | 28       | 1.06   |
|                  |   | หญิง | 205        | 0.62   | 22     | 0.37   | 99                    | 1.16   | 10     | 0.21   | 33                 | 0.30   | 41       | 1.39   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 139              | Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)                            | รวม  | 15,934     | 24.51 | 2,589 | 22.19 | 3,230                 | 19.47 | 1,906 | 20.57 | 5,057              | 23.10 | 3,152    | 56.30 |
|                  |  | ชาย  | 7,022      | 22.02 | 1,113 | 19.42 | 1,409                 | 17.48 | 936   | 20.51 | 2,106              | 19.32 | 1,458    | 55.22 |
|                  | โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ   | หญิง | 8,912      | 26.91 | 1,476 | 24.85 | 1,821                 | 21.35 | 970   | 20.64 | 2,951              | 26.84 | 1,694    | 57.25 |
| 140              | Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75)<br>ทุ้นกลางอักเสบและความผิดปกติของทุ้นกลางและปุ่มูกหูอื่น ๆ | รวม  | 4,695      | 7.22  | 898   | 7.70  | 797                   | 4.80  | 1,041 | 11.24 | 1,290              | 5.89  | 669      | 11.95 |
|                  |  | ชาย  | 2,329      | 7.30  | 393   | 6.86  | 428                   | 5.31  | 529   | 11.59 | 639                | 5.86  | 340      | 12.88 |
|                  |  | หญิง | 2,366      | 7.14  | 505   | 8.50  | 369                   | 4.33  | 512   | 10.89 | 651                | 5.92  | 329      | 11.12 |
| 141              | Hearing loss (H90-H91)<br>การสูญเสียการได้ยิน  | รวม  | 661        | 1.02  | 64    | 0.55  | 135                   | 0.81  | 58    | 0.63  | 191                | 0.87  | 213      | 3.80  |
|                  |  | ชาย  | 328        | 1.03  | 37    | 0.65  | 75                    | 0.93  | 25    | 0.55  | 82                 | 0.75  | 109      | 4.13  |
|                  |  | หญิง | 333        | 1.01  | 27    | 0.45  | 60                    | 0.70  | 33    | 0.70  | 109                | 0.99  | 104      | 3.51  |
| 142              | Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)<br>โรคของหูและปุ่มูกหูอื่น ๆ                           | รวม  | 18,824     | 28.95 | 2,915 | 24.98 | 4,540                 | 27.37 | 3,733 | 40.29 | 6,746              | 30.82 | 890      | 15.90 |
|                  |  | ชาย  | 5,606      | 17.58 | 934   | 16.30 | 1,278                 | 15.85 | 1,106 | 24.23 | 1,971              | 18.09 | 317      | 12.01 |
|                  |  | หญิง | 13,218     | 39.91 | 1,981 | 33.36 | 3,262                 | 38.25 | 2,627 | 55.89 | 4,775              | 43.44 | 573      | 19.37 |
| 143              | Acute rheumatic fever (I00-I02)<br>ไข้รุmaticกเฉียบพลัน  | รวม  | 292        | 0.45  | 25    | 0.21  | 43                    | 0.26  | 78    | 0.84  | 111                | 0.51  | 35       | 0.63  |
|                  |  | ชาย  | 153        | 0.48  | 11    | 0.19  | 22                    | 0.27  | 40    | 0.88  | 64                 | 0.59  | 16       | 0.61  |
|                  |  | หญิง | 139        | 0.42  | 14    | 0.24  | 21                    | 0.25  | 38    | 0.81  | 47                 | 0.43  | 19       | 0.64  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 144              | Chronic rheumatic heart disease (I05-I09)<br>โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง       | รวม  | 4,874         | 7.50   | 965    | 8.27   | 994                   | 5.99   | 537    | 5.80   | 1,739              | 7.94  | 639      | 11.41  |
|                  |  | ชาย  | 1,876         | 5.88   | 371    | 6.47   | 369                   | 4.58   | 188    | 4.12   | 703                | 6.45  | 245      | 9.28   |
|                  |  | หญิง | 2,998         | 9.05   | 594    | 10.00  | 625                   | 7.33   | 349    | 7.43   | 1,036              | 9.42  | 394      | 13.32  |
| 145              | Essential (primary) hypertension (I10)<br>ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ    | รวม  | 44,861        | 69.00  | 8,140  | 69.76  | 10,251                | 61.79  | 7,102  | 76.66  | 17,654             | 80.64 | 1,714    | 30.61  |
|                  |  | ชาย  | 16,744        | 52.50  | 3,056  | 53.34  | 3,695                 | 45.83  | 2,489  | 54.53  | 6,826              | 62.63 | 678      | 25.68  |
|                  |  | หญิง | 28,117        | 84.90  | 5,084  | 85.61  | 6,556                 | 76.87  | 4,613  | 98.15  | 10,828             | 98.50 | 1,036    | 35.01  |
| 146              | Other hypertensive diseases (I11-I15)<br>โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ          | รวม  | 2,277         | 3.50   | 400    | 3.43   | 480                   | 2.89   | 491    | 5.30   | 558                | 2.55  | 348      | 6.22   |
|                  |  | ชาย  | 942           | 2.95   | 155    | 2.71   | 183                   | 2.27   | 214    | 4.69   | 252                | 2.31  | 138      | 5.23   |
|                  |  | หญิง | 1,335         | 4.03   | 245    | 4.13   | 297                   | 3.48   | 277    | 5.89   | 306                | 2.78  | 210      | 7.10   |
| 147              | Acute myocardial infarction (I21-I22)<br>กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน       | รวม  | 63,990        | 98.43  | 11,201 | 96.00  | 19,191                | 115.68 | 11,062 | 119.40 | 16,305             | 74.48 | 6,231    | 111.29 |
|                  |  | ชาย  | 38,324        | 120.16 | 5,943  | 103.72 | 11,162                | 138.45 | 7,407  | 162.28 | 9,798              | 89.91 | 4,014    | 152.04 |
|                  |  | หญิง | 25,666        | 77.50  | 5,258  | 88.54  | 8,029                 | 94.15  | 3,655  | 77.76  | 6,507              | 59.19 | 2,217    | 74.93  |
| 148              | Other ischaemic heart diseases (I20,<br>I23-I25)<br>โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ | รวม  | 72,671        | 111.78 | 10,632 | 91.12  | 22,746                | 137.10 | 10,430 | 112.58 | 14,528             | 66.36 | 14,335   | 256.03 |
|                  |  | ชาย  | 44,255        | 138.75 | 5,899  | 102.95 | 13,262                | 164.50 | 7,070  | 154.89 | 8,610              | 79.00 | 9,414    | 356.58 |
|                  |  | หญิง | 28,416        | 85.80  | 4,733  | 79.70  | 9,484                 | 111.21 | 3,360  | 71.49  | 5,918              | 53.83 | 4,921    | 166.32 |
| 149              | Pulmonary embolism (I26)<br>ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด           | รวม  | 1,727         | 2.66   | 264    | 2.26   | 469                   | 2.83   | 254    | 2.74   | 441                | 2.01  | 299      | 5.34   |
|                  |  | ชาย  | 663           | 2.08   | 95     | 1.66   | 173                   | 2.15   | 114    | 2.50   | 171                | 1.57  | 110      | 4.17   |
|                  |  | หญิง | 1,064         | 3.21   | 169    | 2.85   | 296                   | 3.47   | 140    | 2.98   | 270                | 2.46  | 189      | 6.39   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้นที่ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 150              | Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49)<br>ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ  | รวม  | 48,611     | 74.77  | 9,883  | 84.70  | 12,071                | 72.76  | 5,050  | 54.51  | 17,215             | 78.64  | 4,392    | 78.44  |
|                  |   | ชาย  | 19,780     | 62.02  | 3,943  | 68.82  | 4,841                 | 60.05  | 2,116  | 46.36  | 6,921              | 63.51  | 1,959    | 74.20  |
|                  |   | หญิง | 28,831     | 87.05  | 5,940  | 100.02 | 7,230                 | 84.78  | 2,934  | 62.42  | 10,294             | 93.64  | 2,433    | 82.23  |
| 151              | Heart failure (I50)<br>หัวใจล้มเหลว   | รวม  | 99,262     | 152.68 | 20,831 | 178.53 | 28,381                | 171.07 | 16,442 | 177.47 | 26,732             | 122.11 | 6,876    | 122.81 |
|                  |   | ชาย  | 42,052     | 131.85 | 8,455  | 147.56 | 11,486                | 142.47 | 7,241  | 158.64 | 11,857             | 108.80 | 3,013    | 114.12 |
|                  |   | หญิง | 57,210     | 172.74 | 12,376 | 208.40 | 16,895                | 198.11 | 9,201  | 195.76 | 14,875             | 135.31 | 3,863    | 130.56 |
| 152              | Other heart diseases (I27-I43, I51-I52)<br>โรคหัวใจอื่น ๆ   | รวม  | 19,690     | 30.29  | 3,727  | 31.94  | 4,502                 | 27.14  | 2,217  | 23.93  | 6,021              | 27.50  | 3,223    | 57.57  |
|                  |   | ชาย  | 10,797     | 33.85  | 2,098  | 36.62  | 2,494                 | 30.94  | 1,170  | 25.63  | 3,301              | 30.29  | 1,734    | 65.68  |
|                  |   | หญิง | 8,893      | 26.85  | 1,629  | 27.43  | 2,008                 | 23.55  | 1,047  | 22.28  | 2,720              | 24.74  | 1,489    | 50.33  |
| 153              | Intracranial haemorrhage (I60-I62)<br>เลือดออกในสมอง  | รวม  | 40,249     | 61.91  | 8,615  | 73.83  | 11,416                | 68.81  | 4,976  | 53.71  | 11,383             | 52.00  | 3,859    | 68.92  |
|                  |   | ชาย  | 24,106     | 75.58  | 5,146  | 89.81  | 6,845                 | 84.90  | 2,932  | 64.24  | 6,950              | 63.77  | 2,233    | 84.58  |
|                  |   | หญิง | 16,143     | 48.74  | 3,469  | 58.41  | 4,571                 | 53.60  | 2,044  | 43.49  | 4,433              | 40.32  | 1,626    | 54.96  |
| 154              | Cerebral infarction (I63)<br>เนื้อสมองตาย   | รวม  | 89,257     | 137.29 | 15,460 | 132.50 | 24,047                | 144.95 | 12,510 | 135.03 | 30,248             | 138.17 | 6,992    | 124.88 |
|                  |   | ชาย  | 48,337     | 151.55 | 8,300  | 144.86 | 13,031                | 161.63 | 6,876  | 150.64 | 16,247             | 149.08 | 3,883    | 147.08 |
|                  |   | หญิง | 40,920     | 123.55 | 7,160  | 120.57 | 11,016                | 129.17 | 5,634  | 119.87 | 14,001             | 127.36 | 3,109    | 105.08 |
| 155              | Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมัดสติที่ไม่เจ็บกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด | รวม  | 14,169     | 21.79  | 2,869  | 24.59  | 3,100                 | 18.69  | 2,159  | 23.30  | 5,266              | 24.06  | 775      | 13.84  |
|                  |   | ชาย  | 7,626      | 23.91  | 1,542  | 26.91  | 1,707                 | 21.17  | 1,113  | 24.38  | 2,820              | 25.88  | 444      | 16.82  |
|                  |   | หญิง | 6,543      | 19.76  | 1,327  | 22.35  | 1,393                 | 16.33  | 1,046  | 22.25  | 2,446              | 22.25  | 331      | 11.19  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 156              | Other cerebrovascular diseases<br>(I65-I69)<br>โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ  | รวม  | 7,602      | 11.69 | 1,708 | 14.64 | 1,433                 | 8.64  | 1,142 | 12.33 | 2,210              | 10.10 | 1,109    | 19.81 |
|                  |  | ชาย  | 4,118      | 12.91 | 940   | 16.41 | 795                   | 9.86  | 594   | 13.01 | 1,202              | 11.03 | 587      | 22.23 |
|                  |  | หญิง | 3,484      | 10.52 | 768   | 12.93 | 638                   | 7.48  | 548   | 11.66 | 1,008              | 9.17  | 522      | 17.64 |
| 157              | Atherosclerosis (I70)<br>อะเรอเรสเคลอร์อติก  | รวม  | 918        | 1.41  | 125   | 1.07  | 184                   | 1.11  | 113   | 1.22  | 49                 | 0.22  | 447      | 7.98  |
|                  |  | ชาย  | 509        | 1.60  | 59    | 1.03  | 102                   | 1.27  | 75    | 1.64  | 22                 | 0.20  | 251      | 9.51  |
|                  |  | หญิง | 409        | 1.23  | 66    | 1.11  | 82                    | 0.96  | 38    | 0.81  | 27                 | 0.25  | 196      | 6.62  |
| 158              | Other peripheral vascular diseases<br>(I73)<br>โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ                                      | รวม  | 486        | 0.75  | 80    | 0.69  | 99                    | 0.60  | 57    | 0.62  | 111                | 0.51  | 139      | 2.48  |
|                  |  | ชาย  | 305        | 0.96  | 45    | 0.79  | 67                    | 0.83  | 28    | 0.61  | 71                 | 0.65  | 94       | 3.56  |
|                  |  | หญิง | 181        | 0.55  | 35    | 0.59  | 32                    | 0.38  | 29    | 0.62  | 40                 | 0.36  | 45       | 1.52  |
| 159              | Aterial embolism and thrombosis<br>(I74)<br>ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือด                            | รวม  | 3,387      | 5.21  | 649   | 5.56  | 722                   | 4.35  | 484   | 5.22  | 1,060              | 4.84  | 472      | 8.43  |
|                  |  | ชาย  | 1,912      | 5.99  | 351   | 6.13  | 390                   | 4.84  | 298   | 6.53  | 589                | 5.40  | 284      | 10.76 |
|                  |  | หญิง | 1,475      | 4.45  | 298   | 5.02  | 332                   | 3.89  | 186   | 3.96  | 471                | 4.28  | 188      | 6.35  |
| 160              | Other disease of arteries, arterioles<br>and capillaries (I71-I72, I77-I79)<br>โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดง | รวม  | 6,335      | 9.74  | 1,230 | 10.54 | 1,177                 | 7.09  | 862   | 9.30  | 1,763              | 8.05  | 1,303    | 23.27 |
|                  |  | ชาย  | 4,075      | 12.78 | 695   | 12.13 | 732                   | 9.08  | 604   | 13.23 | 1,148              | 10.53 | 896      | 33.94 |
|                  |  | หญิง | 2,260      | 6.82  | 535   | 9.01  | 445                   | 5.22  | 258   | 5.49  | 615                | 5.59  | 407      | 13.76 |
| 161              | Phlebitis, thrombophlebitis,venous<br>embolism and thrombosis (I80-I82)<br>หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำ       | รวม  | 4,543      | 6.99  | 812   | 6.96  | 960                   | 5.79  | 572   | 6.17  | 1,782              | 8.14  | 417      | 7.45  |
|                  |  | ชาย  | 1,796      | 5.63  | 324   | 5.65  | 361                   | 4.48  | 218   | 4.78  | 710                | 6.51  | 183      | 6.93  |
|                  |  | หญิง | 2,747      | 8.29  | 488   | 8.22  | 599                   | 7.02  | 354   | 7.53  | 1,072              | 9.75  | 234      | 7.91  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 162              | Varicose veins of lower extremities (I83)<br>หลอดเลือดดำขอดของรยางค์ส่วนล่าง                                      | รวม  | 1,206      | 1.86   | 190    | 1.63   | 404                   | 2.44   | 157    | 1.69   | 195                | 0.89   | 260      | 4.64  |
|                  |   | ชาย  | 450        | 1.41   | 66     | 1.15   | 158                   | 1.96   | 50     | 1.10   | 84                 | 0.77   | 92       | 3.48  |
|                  |   | หญิง | 756        | 2.28   | 124    | 2.09   | 246                   | 2.88   | 107    | 2.28   | 111                | 1.01   | 168      | 5.68  |
| 163              | Haemorrhoids (I84)<br>ริดสีดวงทวาร  | รวม  | 11,176     | 17.19  | 2,228  | 19.09  | 2,371                 | 14.29  | 1,691  | 18.25  | 3,919              | 17.90  | 967      | 17.27 |
|                  |   | ชาย  | 6,376      | 19.99  | 1,346  | 23.49  | 1,354                 | 16.79  | 960    | 21.03  | 2,201              | 20.20  | 515      | 19.51 |
|                  |   | หญิง | 4,800      | 14.49  | 882    | 14.85  | 1,017                 | 11.93  | 731    | 15.55  | 1,718              | 15.63  | 452      | 15.28 |
| 164              | Other diseases of the circulatory system (I85-I99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต                              | รวม  | 16,228     | 24.96  | 4,844  | 41.51  | 4,231                 | 25.50  | 1,623  | 17.52  | 4,289              | 19.59  | 1,241    | 22.17 |
|                  |   | ชาย  | 9,731      | 30.51  | 2,952  | 51.52  | 2,595                 | 32.19  | 960    | 21.03  | 2,565              | 23.54  | 659      | 24.96 |
|                  |   | หญิง | 6,497      | 19.62  | 1,892  | 31.86  | 1,636                 | 19.18  | 663    | 14.11  | 1,724              | 15.68  | 582      | 19.67 |
| 165              | Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)<br>คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ                         | รวม  | 74,643     | 114.81 | 16,525 | 141.62 | 18,240                | 109.94 | 14,218 | 153.47 | 23,006             | 105.09 | 2,654    | 47.40 |
|                  |   | ชาย  | 38,789     | 121.62 | 8,913  | 155.56 | 9,701                 | 120.33 | 7,186  | 157.43 | 11,663             | 107.02 | 1,326    | 50.23 |
|                  |   | หญิง | 35,854     | 108.26 | 7,612  | 128.18 | 8,539                 | 100.13 | 7,032  | 149.61 | 11,343             | 103.18 | 1,328    | 44.88 |
| 166              | Acute laryngitis and tracheitis (J04)<br>กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน                                   | รวม  | 682        | 1.05   | 115    | 0.99   | 137                   | 0.83   | 65     | 0.70   | 301                | 1.37   | 64       | 1.14  |
|                  |   | ชาย  | 372        | 1.17   | 53     | 0.93   | 70                    | 0.87   | 44     | 0.96   | 171                | 1.57   | 34       | 1.29  |
|                  |   | หญิง | 310        | 0.94   | 62     | 1.04   | 67                    | 0.79   | 21     | 0.45   | 130                | 1.18   | 30       | 1.01  |
| 167              | Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06)<br>การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ | รวม  | 47,440     | 72.97  | 8,131  | 69.68  | 12,159                | 73.29  | 9,239  | 99.72  | 15,865             | 72.47  | 2,046    | 36.54 |
|                  |   | ชาย  | 26,506     | 83.11  | 4,620  | 80.63  | 7,271                 | 90.19  | 4,754  | 104.15 | 8,795              | 80.70  | 1,066    | 40.38 |
|                  |   | หญิง | 20,934     | 63.21  | 3,511  | 59.12  | 4,888                 | 57.32  | 4,485  | 95.42  | 7,070              | 64.31  | 980      | 33.12 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 168              | Influenza (J09-J11)<br>ไข้หวัดใหญ่   | รวม  | 41,556     | 63.92  | 7,263  | 62.25  | 11,835                | 71.34  | 4,563  | 49.25  | 13,545             | 61.87  | 4,350    | 77.69  |
|                  |  | ชาย  | 21,443     | 67.23  | 3,836  | 66.95  | 6,304                 | 78.19  | 2,271  | 49.75  | 6,809              | 62.48  | 2,223    | 84.20  |
|                  |  | หญิง | 20,113     | 60.73  | 3,427  | 57.71  | 5,531                 | 64.86  | 2,292  | 48.76  | 6,736              | 61.27  | 2,127    | 71.89  |
| 169              | Pneumonia (J12-J18)<br>ปอดบวม  | รวม  | 357,284    | 549.55 | 61,052 | 523.23 | 81,427                | 490.81 | 54,867 | 592.22 | 143,799            | 656.87 | 16,139   | 288.25 |
|                  |  | ชาย  | 193,932    | 608.04 | 33,571 | 585.91 | 43,992                | 545.67 | 30,419 | 666.44 | 77,050             | 707.00 | 8,900    | 337.11 |
|                  |  | หญิง | 163,352    | 493.23 | 27,481 | 462.76 | 37,435                | 438.95 | 24,448 | 520.15 | 66,749             | 607.18 | 7,239    | 244.66 |
| 170              | Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)<br>หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก     | รวม  | 155,087    | 238.55 | 29,081 | 249.23 | 32,501                | 195.90 | 28,169 | 304.05 | 60,434             | 276.06 | 4,902    | 87.55  |
|                  |  | ชาย  | 85,203     | 267.14 | 16,140 | 281.69 | 17,626                | 218.63 | 15,684 | 343.61 | 33,010             | 302.90 | 2,743    | 103.90 |
|                  |  | หญิง | 69,884     | 211.01 | 12,941 | 217.92 | 14,875                | 174.42 | 12,485 | 265.63 | 27,424             | 249.46 | 2,159    | 72.97  |
| 171              | Chronic sinusitis (J32)<br>ไซนัสอักเสบเรื้อรัง   | รวม  | 2,610      | 4.01   | 515    | 4.41   | 581                   | 3.50   | 297    | 3.21   | 712                | 3.25   | 505      | 9.02   |
|                  |  | ชาย  | 1,315      | 4.12   | 267    | 4.66   | 298                   | 3.70   | 136    | 2.98   | 343                | 3.15   | 271      | 10.26  |
|                  |  | หญิง | 1,295      | 3.91   | 248    | 4.18   | 283                   | 3.32   | 161    | 3.43   | 369                | 3.36   | 234      | 7.91   |
| 172              | Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34)<br>โรคอื่นของจมูกและไซนัส        | รวม  | 3,184      | 4.90   | 654    | 5.60   | 626                   | 3.77   | 414    | 4.47   | 919                | 4.20   | 571      | 10.20  |
|                  |  | ชาย  | 1,850      | 5.80   | 378    | 6.60   | 367                   | 4.55   | 242    | 5.30   | 524                | 4.81   | 339      | 12.84  |
|                  |  | หญิง | 1,334      | 4.03   | 276    | 4.65   | 259                   | 3.04   | 172    | 3.66   | 395                | 3.59   | 232      | 7.84   |
| 173              | Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิล และต่อมน้ำเหลืองในคอ | รวม  | 7,362      | 11.32  | 1,396  | 11.96  | 1,438                 | 8.67   | 1,043  | 11.26  | 2,267              | 10.36  | 1,218    | 21.75  |
|                  |  | ชาย  | 3,848      | 12.06  | 737    | 12.86  | 745                   | 9.24   | 518    | 11.35  | 1,114              | 10.22  | 734      | 27.80  |
|                  |  | หญิง | 3,514      | 10.61  | 659    | 11.10  | 693                   | 8.13   | 525    | 11.17  | 1,153              | 10.49  | 484      | 16.36  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 174              | Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน  | รวม  | 4,667         | 7.18   | 896    | 7.68   | 828                   | 4.99   | 661    | 7.13   | 1,427              | 6.52   | 855      | 15.27  |
|                  |  | ชาย  | 2,789         | 8.74   | 562    | 9.81   | 495                   | 6.14   | 414    | 9.07   | 839                | 7.70   | 479      | 18.14  |
|                  |  | หญิง | 1,878         | 5.67   | 334    | 5.62   | 333                   | 3.90   | 247    | 5.26   | 588                | 5.35   | 376      | 12.71  |
| 175              | Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44)<br>โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรัง | รวม  | 150,616       | 231.67 | 43,561 | 373.33 | 29,922                | 180.36 | 31,118 | 335.88 | 41,598             | 190.02 | 4,417    | 78.89  |
|                  |  | ชาย  | 111,164       | 348.54 | 27,550 | 480.82 | 23,441                | 290.76 | 23,777 | 520.92 | 33,060             | 303.35 | 3,336    | 126.36 |
|                  |  | หญิง | 39,452        | 119.12 | 16,011 | 269.61 | 6,481                 | 75.99  | 7,341  | 156.19 | 8,538              | 77.67  | 1,081    | 36.54  |
| 176              | Asthma (J45-J46)<br>โรคหืด   | รวม  | 59,268        | 91.16  | 8,898  | 76.26  | 14,232                | 85.79  | 13,223 | 142.73 | 20,089             | 91.77  | 2,826    | 50.47  |
|                  |  | ชาย  | 22,594        | 70.84  | 3,403  | 59.39  | 5,410                 | 67.10  | 4,877  | 106.85 | 7,701              | 70.66  | 1,203    | 45.57  |
|                  |  | หญิง | 36,674        | 110.73 | 5,495  | 92.53  | 8,822                 | 103.44 | 8,346  | 177.57 | 12,388             | 112.69 | 1,623    | 54.85  |
| 177              | Bronchiectasis (J47)<br>โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง   | รวม  | 9,092         | 13.98  | 1,486  | 12.74  | 1,621                 | 9.77   | 1,118  | 12.07  | 4,372              | 19.97  | 495      | 8.84   |
|                  |  | ชาย  | 4,201         | 13.17  | 781    | 13.63  | 762                   | 9.45   | 448    | 9.82   | 1,961              | 17.99  | 249      | 9.43   |
|                  |  | หญิง | 4,891         | 14.77  | 705    | 11.87  | 859                   | 10.07  | 670    | 14.25  | 2,411              | 21.93  | 246      | 8.31   |
| 178              | Pneumoconiosis (J60-J65)<br>โรคฝุ่นสะสมในปอด   | รวม  | 79            | 0.12   | 10     | 0.09   | 10                    | 0.06   | 7      | 0.08   | 44                 | 0.20   | 8        | 0.14   |
|                  |  | ชาย  | 62            | 0.19   | 8      | 0.14   | 4                     | 0.05   | 5      | 0.11   | 42                 | 0.39   | 3        | 0.11   |
|                  |  | หญิง | 17            | 0.05   | 2      | 0.03   | 6                     | 0.07   | 2      | 0.04   | 2                  | 0.02   | 5        | 0.17   |
| 179              | Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ   | รวม  | 44,282        | 68.11  | 9,415  | 80.69  | 10,358                | 62.43  | 5,924  | 63.94  | 14,474             | 66.12  | 4,111    | 73.43  |
|                  |  | ชาย  | 27,038        | 84.77  | 5,689  | 99.29  | 6,239                 | 77.39  | 3,584  | 78.52  | 9,108              | 83.57  | 2,418    | 91.59  |
|                  |  | หญิง | 17,244        | 52.07  | 3,726  | 62.74  | 4,119                 | 48.30  | 2,340  | 49.79  | 5,366              | 48.81  | 1,693    | 57.22  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 180              | Dental caries (K02)<br>ฟันผุ  | รวม  | 957           | 1.47   | 155    | 1.33   | 216                   | 1.30   | 206    | 2.22   | 226                | 1.03   | 154      | 2.75  |
|                  |   | ชาย  | 482           | 1.51   | 73     | 1.27   | 122                   | 1.51   | 104    | 2.28   | 106                | 0.97   | 77       | 2.92  |
|                  |   | หญิง | 475           | 1.43   | 82     | 1.38   | 94                    | 1.10   | 102    | 2.17   | 120                | 1.09   | 77       | 2.60  |
| 181              | Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01,<br>K03-K08)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง    | รวม  | 5,172         | 7.96   | 956    | 8.19   | 1,059                 | 6.38   | 795    | 8.58   | 2,065              | 9.43   | 297      | 5.30  |
|                  |   | ชาย  | 2,469         | 7.74   | 457    | 7.98   | 503                   | 6.24   | 415    | 9.09   | 958                | 8.79   | 136      | 5.15  |
|                  |   | หญิง | 2,703         | 8.16   | 499    | 8.40   | 556                   | 6.52   | 380    | 8.08   | 1,107              | 10.07  | 161      | 5.44  |
| 182              | Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14)<br>โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร | รวม  | 12,068        | 18.56  | 2,192  | 18.79  | 2,020                 | 12.18  | 1,605  | 17.32  | 5,520              | 25.22  | 731      | 13.06 |
|                  |   | ชาย  | 6,072         | 19.04  | 1,099  | 19.18  | 1,034                 | 12.83  | 843    | 18.47  | 2,729              | 25.04  | 367      | 13.90 |
|                  |   | หญิง | 5,996         | 18.10  | 1,093  | 18.41  | 986                   | 11.56  | 762    | 16.21  | 2,791              | 25.39  | 364      | 12.30 |
| 183              | Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)<br>แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม   | รวม  | 28,884        | 44.43  | 6,576  | 56.36  | 7,659                 | 46.17  | 2,160  | 23.31  | 10,285             | 46.98  | 2,204    | 39.37 |
|                  |   | ชาย  | 19,704        | 61.78  | 4,450  | 77.66  | 5,019                 | 62.25  | 1,432  | 31.37  | 7,406              | 67.96  | 1,397    | 52.91 |
|                  |   | หญิง | 9,180         | 27.72  | 2,126  | 35.80  | 2,640                 | 30.96  | 728    | 15.49  | 2,879              | 26.19  | 807      | 27.27 |
| 184              | Gastritis and duodenitis (K29)<br>กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ  | รวม  | 68,222        | 104.94 | 12,162 | 104.23 | 16,577                | 99.92  | 11,557 | 124.74 | 24,597             | 112.36 | 3,329    | 59.46 |
|                  |   | ชาย  | 35,048        | 109.89 | 6,254  | 109.15 | 8,388                 | 104.04 | 5,732  | 125.58 | 13,014             | 119.41 | 1,660    | 62.88 |
|                  |   | หญิง | 33,174        | 100.17 | 5,908  | 99.49  | 8,189                 | 96.02  | 5,825  | 123.93 | 11,583             | 105.36 | 1,669    | 56.41 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 185              | Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31)<br>โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูดโอเดนัม | รวม  | 80,988     | 124.57 | 14,000 | 119.98 | 14,262                | 85.97  | 15,429 | 166.54 | 35,250             | 161.02 | 2,047    | 36.56  |
|                  |   | ชาย  | 36,438     | 114.25 | 6,202  | 108.24 | 6,449                 | 79.99  | 6,829  | 149.61 | 15,943             | 146.29 | 1,015    | 38.45  |
|                  |   | หญิง | 44,550     | 134.51 | 7,798  | 131.31 | 7,813                 | 91.61  | 8,600  | 182.97 | 19,307             | 175.63 | 1,032    | 34.88  |
| 186              | Diseases of appendix (K35-K38)<br>โรคของไส้ติ้ง   | รวม  | 91,940     | 141.42 | 18,931 | 162.24 | 19,270                | 116.15 | 12,360 | 133.41 | 35,788             | 163.48 | 5,591    | 99.86  |
|                  |   | ชาย  | 43,529     | 136.48 | 9,008  | 157.21 | 9,403                 | 116.63 | 6,015  | 131.78 | 16,200             | 148.65 | 2,903    | 109.96 |
|                  |   | หญิง | 48,411     | 146.17 | 9,923  | 167.09 | 9,867                 | 115.70 | 6,345  | 134.99 | 19,588             | 178.18 | 2,688    | 90.85  |
| 187              | Inguinal hernia (K40)<br>ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ   | รวม  | 31,890     | 49.05  | 7,180  | 61.53  | 6,827                 | 41.15  | 5,053  | 54.54  | 9,944              | 45.42  | 2,886    | 51.55  |
|                  |   | ชาย  | 30,115     | 94.42  | 6,797  | 118.63 | 6,461                 | 80.14  | 4,723  | 103.47 | 9,418              | 86.42  | 2,716    | 102.87 |
|                  |   | หญิง | 1,775      | 5.36   | 383    | 6.45   | 366                   | 4.29   | 330    | 7.02   | 526                | 4.78   | 170      | 5.75   |
| 188              | Other hernia (K41-K46)<br>ไส้เลื่อนอื่น ๆ   | รวม  | 3,849      | 5.92   | 793    | 6.80   | 1,007                 | 6.07   | 582    | 6.28   | 822                | 3.75   | 645      | 11.52  |
|                  |   | ชาย  | 1,601      | 5.02   | 333    | 5.81   | 380                   | 4.71   | 238    | 5.21   | 390                | 3.58   | 260      | 9.85   |
|                  |   | หญิง | 2,248      | 6.79   | 460    | 7.75   | 627                   | 7.35   | 344    | 7.32   | 432                | 3.93   | 385      | 13.01  |
| 189              | Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51)<br>โรคโกรนและลำไส้ใหญ่อักเสบแพลเปื้อย                                    | รวม  | 789        | 1.21   | 148    | 1.27   | 175                   | 1.05   | 87     | 0.94   | 210                | 0.96   | 169      | 3.02   |
|                  |   | ชาย  | 385        | 1.21   | 54     | 0.94   | 80                    | 0.99   | 47     | 1.03   | 102                | 0.94   | 102      | 3.86   |
|                  |   | หญิง | 404        | 1.22   | 94     | 1.58   | 95                    | 1.11   | 40     | 0.85   | 108                | 0.98   | 67       | 2.26   |
| 190              | Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56)<br>ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน       | รวม  | 22,881     | 35.19  | 5,292  | 45.35  | 4,763                 | 28.71  | 3,045  | 32.87  | 8,272              | 37.79  | 1,509    | 26.95  |
|                  |   | ชาย  | 14,113     | 44.25  | 3,233  | 56.42  | 2,878                 | 35.70  | 1,956  | 42.85  | 5,241              | 48.09  | 805      | 30.49  |
|                  |   | หญิง | 8,768      | 26.47  | 2,059  | 34.67  | 1,885                 | 22.10  | 1,089  | 23.17  | 3,031              | 27.57  | 704      | 23.79  |

**ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559**

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|-------|-------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 191              | Diverticular disease of intestine (K57)<br>โรคติ่งเนื้อของลำไส้   | รวม  | 5,170         | 7.95   | 1,226  | 10.51  | 1,325                 | 7.99   | 541   | 5.84  | 1,341              | 6.13   | 737      | 13.16  |
|                  |   | ชาย  | 2,549         | 7.99   | 565    | 9.86   | 637                   | 7.90   | 277   | 6.07  | 703                | 6.45   | 367      | 13.90  |
|                  |   | หญิง | 2,621         | 7.91   | 661    | 11.13  | 688                   | 8.07   | 264   | 5.62  | 638                | 5.80   | 370      | 12.51  |
| 192              | Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67)<br>โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุของท้อง            | รวม  | 50,534        | 77.73  | 10,718 | 91.86  | 11,842                | 71.38  | 6,382 | 68.89 | 17,192             | 78.53  | 4,400    | 78.59  |
|                  |   | ชาย  | 28,633        | 89.77  | 6,070  | 105.94 | 6,504                 | 80.67  | 3,535 | 77.45 | 9,973              | 91.51  | 2,551    | 96.62  |
|                  |   | หญิง | 21,901        | 66.13  | 4,648  | 78.27  | 5,338                 | 62.59  | 2,847 | 60.57 | 7,219              | 65.67  | 1,849    | 62.49  |
| 193              | Alcoholic liver disease (K70)<br>โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์   | รวม  | 13,193        | 20.29  | 2,653  | 22.74  | 3,318                 | 20.00  | 969   | 10.46 | 5,459              | 24.94  | 794      | 14.18  |
|                  |   | ชาย  | 10,285        | 32.25  | 2,125  | 37.09  | 2,389                 | 29.63  | 850   | 18.62 | 4,278              | 39.25  | 643      | 24.36  |
|                  |   | หญิง | 2,908         | 8.78   | 528    | 8.89   | 929                   | 10.89  | 119   | 2.53  | 1,181              | 10.74  | 151      | 5.10   |
| 194              | Other disease of liver (K71-K77)<br>โรคอื่น ๆ ของตับ  | รวม  | 30,821        | 47.41  | 6,206  | 53.19  | 6,978                 | 42.06  | 2,948 | 31.82 | 12,521             | 57.20  | 2,168    | 38.72  |
|                  |   | ชาย  | 18,781        | 58.88  | 3,983  | 69.51  | 3,947                 | 48.96  | 1,782 | 39.04 | 7,863              | 72.15  | 1,206    | 45.68  |
|                  |   | หญิง | 12,040        | 36.35  | 2,223  | 37.43  | 3,031                 | 35.54  | 1,166 | 24.81 | 4,658              | 42.37  | 962      | 32.51  |
| 195              | Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81)<br>โรคนิ่วในระบบนำดีและถุงน้ำดีอักเสบ                                | รวม  | 53,816        | 82.78  | 10,361 | 88.80  | 11,487                | 69.24  | 4,625 | 49.92 | 21,860             | 99.86  | 5,483    | 97.93  |
|                  |   | ชาย  | 20,918        | 65.59  | 3,955  | 69.03  | 4,349                 | 53.94  | 1,667 | 36.52 | 8,658              | 79.44  | 2,289    | 86.70  |
|                  |   | หญิง | 32,898        | 99.33  | 6,406  | 107.87 | 7,138                 | 83.70  | 2,958 | 62.93 | 13,202             | 120.09 | 3,194    | 107.95 |
| 196              | Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86)<br>ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน | รวม  | 15,602        | 24.00  | 3,359  | 28.79  | 4,028                 | 24.28  | 1,512 | 16.32 | 5,130              | 23.43  | 1,573    | 28.09  |
|                  |   | ชาย  | 11,522        | 36.13  | 2,539  | 44.31  | 2,889                 | 35.83  | 1,010 | 22.13 | 4,050              | 37.16  | 1,034    | 39.16  |
|                  |   | หญิง | 4,080         | 12.32  | 820    | 13.81  | 1,139                 | 13.36  | 502   | 10.68 | 1,080              | 9.82   | 539      | 18.22  |
| 197              | Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร                         | รวม  | 67,306        | 103.53 | 16,995 | 145.65 | 16,608                | 100.11 | 6,657 | 71.85 | 22,894             | 104.58 | 4,152    | 74.16  |
|                  |   | ชาย  | 43,251        | 135.61 | 11,107 | 193.85 | 10,308                | 127.86 | 4,121 | 90.29 | 15,386             | 141.18 | 2,329    | 88.22  |
|                  |   | หญิง | 24,055        | 72.63  | 5,888  | 99.15  | 6,300                 | 73.87  | 2,536 | 53.96 | 7,508              | 68.30  | 1,823    | 61.61  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 198              | Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08)<br>โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง    | รวม  | 107,116       | 164.76 | 20,111 | 172.36 | 23,091                | 139.18 | 17,772 | 191.83 | 42,229             | 192.90 | 3,913    | 69.89  |
|                  |  | ชาย  | 60,234        | 188.85 | 11,603 | 202.50 | 12,332                | 152.96 | 9,837  | 215.51 | 24,406             | 223.95 | 2,056    | 77.88  |
|                  |  | หญิง | 46,882        | 141.56 | 8,508  | 143.27 | 10,759                | 126.16 | 7,935  | 168.82 | 17,823             | 162.13 | 1,857    | 62.76  |
| 199              | Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99)<br>โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง      | รวม  | 40,598        | 62.45  | 8,008  | 68.63  | 9,939                 | 59.91  | 5,617  | 60.63  | 13,946             | 63.71  | 3,088    | 55.15  |
|                  |  | ชาย  | 20,926        | 65.61  | 4,053  | 70.74  | 4,931                 | 61.16  | 2,926  | 64.10  | 7,468              | 68.53  | 1,548    | 58.63  |
|                  |  | หญิง | 19,672        | 59.40  | 3,955  | 66.60  | 5,008                 | 58.72  | 2,691  | 57.25  | 6,478              | 58.93  | 1,540    | 52.05  |
| 200              | Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14)<br>ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบทลายข้อ | รวม  | 17,472        | 26.87  | 3,885  | 33.30  | 3,164                 | 19.07  | 2,013  | 21.73  | 7,531              | 34.40  | 879      | 15.70  |
|                  |  | ชาย  | 10,409        | 32.64  | 2,300  | 40.14  | 1,843                 | 22.86  | 1,290  | 28.26  | 4,543              | 41.69  | 433      | 16.40  |
|                  |  | หญิง | 7,063         | 21.33  | 1,585  | 26.69  | 1,321                 | 15.49  | 723    | 15.38  | 2,988              | 27.18  | 446      | 15.07  |
| 201              | Arthrosis (M15-M19)<br>โรคข้อเสื่อม  | รวม  | 25,889        | 39.82  | 6,638  | 56.89  | 8,819                 | 53.16  | 1,712  | 18.48  | 2,901              | 13.25  | 5,819    | 103.93 |
|                  |  | ชาย  | 5,117         | 16.04  | 1,461  | 25.50  | 1,566                 | 19.42  | 326    | 7.14   | 734                | 6.74   | 1,030    | 39.01  |
|                  |  | หญิง | 20,772        | 62.72  | 5,177  | 87.18  | 7,253                 | 85.05  | 1,386  | 29.49  | 2,167              | 19.71  | 4,789    | 161.86 |
| 202              | Acquired deformities of limbs (M20-M21)<br>ความพิการของแขนขา   | รวม  | 1,102         | 1.70   | 187    | 1.60   | 181                   | 1.09   | 92     | 0.99   | 194                | 0.89   | 448      | 8.00   |
|                  |  | ชาย  | 477           | 1.50   | 68     | 1.19   | 73                    | 0.91   | 50     | 1.10   | 105                | 0.96   | 181      | 6.86   |
|                  |  | หญิง | 625           | 1.89   | 119    | 2.00   | 108                   | 1.27   | 42     | 0.89   | 89                 | 0.81   | 267      | 9.02   |
| 203              | Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ   | รวม  | 16,541        | 25.44  | 3,340  | 28.62  | 3,530                 | 21.28  | 1,680  | 18.13  | 5,880              | 26.86  | 2,111    | 37.70  |
|                  |  | ชาย  | 10,123        | 31.74  | 1,883  | 32.86  | 2,246                 | 27.86  | 1,074  | 23.53  | 3,481              | 31.94  | 1,439    | 54.51  |
|                  |  | หญิง | 6,418         | 19.38  | 1,457  | 24.53  | 1,284                 | 15.06  | 606    | 12.89  | 2,399              | 21.82  | 672      | 22.71  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 204              | Systemic connective tissue disorders (M30-M36)<br>ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาณ           | รวม  | 9,173      | 14.11 | 1,869 | 16.02 | 1,742                 | 10.50 | 1,088 | 11.74 | 3,066              | 14.01  | 1,408    | 25.15 |
|                  |  | ชาย  | 2,096      | 6.57  | 428   | 7.47  | 414                   | 5.14  | 217   | 4.75  | 653                | 5.99   | 384      | 14.54 |
|                  |  | หญิง | 7,077      | 21.37 | 1,441 | 24.27 | 1,328                 | 15.57 | 871   | 18.53 | 2,413              | 21.95  | 1,024    | 34.61 |
| 205              | Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51)<br>กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสัน | รวม  | 6,476      | 9.96  | 1,504 | 12.89 | 1,279                 | 7.71  | 691   | 7.46  | 2,136              | 9.76   | 866      | 15.47 |
|                  |  | ชาย  | 3,341      | 10.48 | 723   | 12.62 | 659                   | 8.17  | 370   | 8.11  | 1,144              | 10.50  | 445      | 16.86 |
|                  |  | หญิง | 3,135      | 9.47  | 781   | 13.15 | 620                   | 7.27  | 321   | 6.83  | 992                | 9.02   | 421      | 14.23 |
| 206              | Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54)<br>พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ                            | รวม  | 29,902     | 45.99 | 9,217 | 78.99 | 5,860                 | 35.32 | 2,770 | 29.90 | 8,365              | 38.21  | 3,690    | 65.91 |
|                  |  | ชาย  | 11,714     | 36.73 | 3,404 | 59.41 | 2,237                 | 27.75 | 1,186 | 25.98 | 3,430              | 31.47  | 1,457    | 55.19 |
|                  |  | หญิง | 18,188     | 54.92 | 5,813 | 97.89 | 3,623                 | 42.48 | 1,584 | 33.70 | 4,935              | 44.89  | 2,233    | 75.47 |
| 207              | Soft tissue disorders (M60-M79)<br>เนื้อเยื่อผิดปกติ   | รวม  | 46,710     | 71.85 | 9,574 | 82.05 | 8,093                 | 48.78 | 5,825 | 62.87 | 20,540             | 93.83  | 2,678    | 47.83 |
|                  |  | ชาย  | 24,719     | 77.50 | 4,927 | 85.99 | 4,360                 | 54.08 | 2,956 | 64.76 | 11,184             | 102.62 | 1,292    | 48.94 |
|                  |  | หญิง | 21,991     | 66.40 | 4,647 | 78.25 | 3,733                 | 43.77 | 2,869 | 61.04 | 9,356              | 85.11  | 1,386    | 46.84 |
| 208              | Disorders of bone density and structure (M80-M85)<br>ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อ         | รวม  | 5,523      | 8.50  | 1,050 | 9.00  | 1,164                 | 7.02  | 727   | 7.85  | 1,718              | 7.85   | 864      | 15.43 |
|                  |  | ชาย  | 2,748      | 8.62  | 466   | 8.13  | 616                   | 7.64  | 382   | 8.37  | 864                | 7.93   | 420      | 15.91 |
|                  |  | หญิง | 2,775      | 8.38  | 584   | 9.83  | 548                   | 6.43  | 345   | 7.34  | 854                | 7.77   | 444      | 15.01 |
| 209              | Osteomyelitis (M86)<br>กระดูกอักเสบ  | รวม  | 7,952      | 12.23 | 1,658 | 14.21 | 1,661                 | 10.01 | 808   | 8.72  | 3,277              | 14.97  | 548      | 9.79  |
|                  |  | ชาย  | 4,903      | 15.37 | 1,010 | 17.63 | 1,039                 | 12.89 | 518   | 11.35 | 1,974              | 18.11  | 362      | 13.71 |
|                  |  | หญิง | 3,049      | 9.21  | 648   | 10.91 | 622                   | 7.29  | 290   | 6.17  | 1,303              | 11.85  | 186      | 6.29  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 210              | Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประسان | รวม  | 7,809      | 12.01  | 1,497  | 12.83  | 2,049                 | 12.35  | 1,039  | 11.21  | 2,135              | 9.75   | 1,089    | 19.45  |
|                  |  | ชาย  | 4,123      | 12.93  | 773    | 13.49  | 1,040                 | 12.90  | 539    | 11.81  | 1,242              | 11.40  | 529      | 20.04  |
|                  |  | หญิง | 3,686      | 11.13  | 724    | 12.19  | 1,009                 | 11.83  | 500    | 10.64  | 893                | 8.12   | 560      | 18.93  |
| 211              | Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01)<br>กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว                    | รวม  | 3,736      | 5.75   | 593    | 5.08   | 510                   | 3.07   | 808    | 8.72   | 1,611              | 7.36   | 214      | 3.82   |
|                  |  | ชาย  | 2,305      | 7.23   | 364    | 6.35   | 320                   | 3.97   | 493    | 10.80  | 1,019              | 9.35   | 109      | 4.13   |
|                  |  | หญิง | 1,431      | 4.32   | 229    | 3.86   | 190                   | 2.23   | 315    | 6.70   | 592                | 5.39   | 105      | 3.55   |
| 212              | Other glomerular diseases (N02-N08)<br>โรคของหน่วยไตอื่น ๆ   | รวม  | 6,218      | 9.56   | 1,099  | 9.42   | 1,255                 | 7.56   | 1,141  | 12.32  | 2,110              | 9.64   | 613      | 10.95  |
|                  |  | ชาย  | 3,443      | 10.79  | 614    | 10.72  | 718                   | 8.91   | 653    | 14.31  | 1,146              | 10.52  | 312      | 11.82  |
|                  |  | หญิง | 2,775      | 8.38   | 485    | 8.17   | 537                   | 6.30   | 488    | 10.38  | 964                | 8.77   | 301      | 10.17  |
| 213              | Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16)<br>โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต   | รวม  | 73,122     | 112.47 | 17,272 | 148.02 | 15,288                | 92.15  | 10,181 | 109.89 | 27,414             | 125.23 | 2,967    | 52.99  |
|                  |  | ชาย  | 24,870     | 77.98  | 6,326  | 110.41 | 4,379                 | 54.32  | 2,879  | 63.07  | 10,249             | 94.04  | 1,037    | 39.28  |
|                  |  | หญิง | 48,252     | 145.69 | 10,946 | 184.32 | 10,909                | 127.92 | 7,302  | 155.36 | 17,165             | 156.14 | 1,930    | 65.23  |
| 214              | Renal failure (N17-N19)<br>ไตวาย   | รวม  | 144,551    | 222.34 | 30,878 | 264.63 | 25,677                | 154.77 | 11,751 | 126.84 | 70,314             | 321.19 | 5,931    | 105.93 |
|                  |  | ชาย  | 63,369     | 198.68 | 14,564 | 254.18 | 11,711                | 145.26 | 5,509  | 120.69 | 28,781             | 264.09 | 2,804    | 106.21 |
|                  |  | หญิง | 81,182     | 245.12 | 16,314 | 274.71 | 13,966                | 163.76 | 6,242  | 132.80 | 41,533             | 377.80 | 3,127    | 105.69 |
| 215              | Urolithiasis (N20-N23)<br>น้ำในระบบทางเดินปัสสาวะ  | รวม  | 37,863     | 58.24  | 9,314  | 79.82  | 4,427                 | 26.68  | 5,096  | 55.01  | 17,307             | 79.06  | 1,719    | 30.70  |
|                  |  | ชาย  | 23,361     | 73.24  | 6,102  | 106.50 | 2,466                 | 30.59  | 2,985  | 65.40  | 10,849             | 99.55  | 959      | 36.32  |
|                  |  | หญิง | 14,502     | 43.79  | 3,212  | 54.09  | 1,961                 | 22.99  | 2,111  | 44.91  | 6,458              | 58.74  | 760      | 25.69  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | ลง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน               | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 222              | Other disease of male genital organs (N44-N46, N48-N51)<br>โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย                        | รวม  | 8,898      | 27.90 | 1,580 | 27.58 | 1,872               | 23.22 | 1,184 | 25.94 | 3,834              | 35.18 | 428      | 16.21 |
|                  |   | ชาย  | 8,898      | 27.90 | 1,580 | 27.58 | 1,872               | 23.22 | 1,184 | 25.94 | 3,834              | 35.18 | 428      | 16.21 |
|                  |   | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 223              | Disorders of breast (N60-N64)<br>ความผิดปกติของเต้านม   | รวม  | 7,929      | 12.20 | 1,700 | 14.57 | 1,415               | 8.53  | 1,691 | 18.25 | 2,574              | 11.76 | 549      | 9.81  |
|                  |   | ชาย  | 466        | 1.46  | 89    | 1.55  | 97                  | 1.20  | 94    | 2.06  | 141                | 1.29  | 45       | 1.70  |
|                  |   | หญิง | 7,463      | 22.53 | 1,611 | 27.13 | 1,318               | 15.45 | 1,597 | 33.98 | 2,433              | 22.13 | 504      | 17.03 |
| 224              | Salphingitis and oophoritis (N70)<br>ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ  | รวม  | 1,925      | 5.81  | 299   | 5.03  | 477                 | 5.59  | 232   | 4.94  | 708                | 6.44  | 209      | 7.06  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 1,925      | 5.81  | 299   | 5.03  | 477                 | 5.59  | 232   | 4.94  | 708                | 6.44  | 209      | 7.06  |
| 225              | Inflammatory disease of cervix uteri (N72)<br>ปากมดลูกอักเสบ  | รวม  | 203        | 0.61  | 46    | 0.77  | 43                  | 0.50  | 33    | 0.70  | 65                 | 0.59  | 16       | 0.54  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 203        | 0.61  | 46    | 0.77  | 43                  | 0.50  | 33    | 0.70  | 65                 | 0.59  | 16       | 0.54  |
| 226              | Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77)<br>การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี | รวม  | 12,231     | 36.93 | 2,168 | 36.51 | 3,049               | 35.75 | 1,992 | 42.38 | 4,418              | 40.19 | 604      | 20.41 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 12,231     | 36.93 | 2,168 | 36.51 | 3,049               | 35.75 | 1,992 | 42.38 | 4,418              | 40.19 | 604      | 20.41 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 227              | Endometriosis (N80)<br>เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่  | รวม  | 7,757      | 23.42 | 1,230 | 20.71 | 1,253                 | 14.69 | 1,118 | 23.79 | 2,898              | 26.36 | 1,258    | 42.52 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 7,757      | 23.42 | 1,230 | 20.71 | 1,253                 | 14.69 | 1,118 | 23.79 | 2,898              | 26.36 | 1,258    | 42.52 |
| 228              | Female genital prolapse (N81)<br>การหย่อนตัวอวัยวะของอวัยวะสีบพันธุ์<br>สตรี   | รวม  | 3,469      | 10.47 | 715   | 12.04 | 635                   | 7.45  | 292   | 6.21  | 1,287              | 11.71 | 540      | 18.25 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 3,469      | 10.47 | 715   | 12.04 | 635                   | 7.45  | 292   | 6.21  | 1,287              | 11.71 | 540      | 18.25 |
| 229              | Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83)<br>ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเยื่อดมดลูก | รวม  | 5,402      | 16.31 | 880   | 14.82 | 1,269                 | 14.88 | 859   | 18.28 | 1,845              | 16.78 | 549      | 18.56 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 5,402      | 16.31 | 880   | 14.82 | 1,269                 | 14.88 | 859   | 18.28 | 1,845              | 16.78 | 549      | 18.56 |
| 230              | Disorder of menstruation (N91-N92)<br>ความผิดปกติของระดู   | รวม  | 6,276      | 18.95 | 1,056 | 17.78 | 1,338                 | 15.69 | 1,279 | 27.21 | 2,414              | 21.96 | 189      | 6.39  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 6,276      | 18.95 | 1,056 | 17.78 | 1,338                 | 15.69 | 1,279 | 27.21 | 2,414              | 21.96 | 189      | 6.39  |
| 231              | Menopausal and other perimenopausal disorders (N95)<br>การหมดประจำเดือนและความผิดปกติ  | รวม  | 3,615      | 10.92 | 736   | 12.39 | 771                   | 9.04  | 674   | 14.34 | 1,226              | 11.15 | 208      | 7.03  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 3,615      | 10.92 | 736   | 12.39 | 771                   | 9.04  | 674   | 14.34 | 1,226              | 11.15 | 208      | 7.03  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 232              | Female infertility (N97)<br>ภาวะมีบุตรยากในสตรี   | รวม  | 24         | 0.07  | 7     | 0.12  | 4                     | 0.05  | 7     | 0.15   | 4                  | 0.04  | 2        | 0.07  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 24         | 0.07  | 7     | 0.12  | 4                     | 0.05  | 7     | 0.15   | 4                  | 0.04  | 2        | 0.07  |
| 233              | Other disorders of genitourinary tract<br>(N82, N84-N90, N93-N94, N96,<br>N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อ<br>ทางเดินปัสสาวะและสีบพันธุ์ | รวม  | 16,215     | 48.96 | 3,362 | 56.61 | 3,155                 | 36.99 | 3,006 | 63.96  | 5,552              | 50.50 | 1,140    | 38.53 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 16,215     | 48.96 | 3,362 | 56.61 | 3,155                 | 36.99 | 3,006 | 63.96  | 5,552              | 50.50 | 1,140    | 38.53 |
| 234              | Spontaneous abortion (O03)<br>แท้งเอง   | รวม  | 12,619     | 38.10 | 1,634 | 27.52 | 2,962                 | 34.73 | 2,958 | 62.93  | 4,113              | 37.41 | 952      | 32.18 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 12,619     | 38.10 | 1,634 | 27.52 | 2,962                 | 34.73 | 2,958 | 62.93  | 4,113              | 37.41 | 952      | 32.18 |
| 235              | Medical abortion (O04)<br>การทำแท้งโดยแพทย์   | รวม  | 1,065      | 3.22  | 192   | 3.23  | 150                   | 1.76  | 138   | 2.94   | 504                | 4.58  | 81       | 2.74  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 1,065      | 3.22  | 192   | 3.23  | 150                   | 1.76  | 138   | 2.94   | 504                | 4.58  | 81       | 2.74  |
| 236              | Other pregnancies with abortive<br>outcome (O00-O02, O05-O08)<br>การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการทำแท้ง                                | รวม  | 24,931     | 75.28 | 4,196 | 70.66 | 5,623                 | 65.93 | 6,520 | 138.72 | 7,057              | 64.19 | 1,535    | 51.88 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00   | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 24,931     | 75.28 | 4,196 | 70.66 | 5,623                 | 65.93 | 6,520 | 138.72 | 7,057              | 64.19 | 1,535    | 51.88 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 237              | Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยายนม คลอด และระยยหลังคลอด                     | รวม  | 16,313     | 49.26  | 2,255  | 37.97  | 3,836                 | 44.98  | 4,587  | 97.59  | 4,838              | 44.01  | 797      | 26.94  |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 16,313     | 49.26  | 2,255  | 37.97  | 3,836                 | 44.98  | 4,587  | 97.59  | 4,838              | 44.01  | 797      | 26.94  |
| 238              | Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด   | รวม  | 4,348      | 13.13  | 704    | 11.85  | 880                   | 10.32  | 1,112  | 23.66  | 1,420              | 12.92  | 232      | 7.84   |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 4,348      | 13.13  | 704    | 11.85  | 880                   | 10.32  | 1,112  | 23.66  | 1,420              | 12.92  | 232      | 7.84   |
| 239              | Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินกระเพาะ และถุงน้ำครรภ์ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด | รวม  | 122,870    | 371.00 | 19,758 | 332.71 | 27,264                | 319.69 | 29,230 | 621.89 | 39,522             | 359.51 | 7,096    | 239.83 |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 122,870    | 371.00 | 19,758 | 332.71 | 27,264                | 319.69 | 29,230 | 621.89 | 39,522             | 359.51 | 7,096    | 239.83 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 240              | Obstructed labour (O64-O66)<br>การคลอดติดขัด  | รวม  | 21,723     | 65.59  | 3,455  | 58.18  | 4,196                 | 49.20  | 3,874  | 82.42  | 8,971              | 81.60  | 1,227    | 41.47  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 21,723     | 65.59  | 3,455  | 58.18  | 4,196                 | 49.20  | 3,874  | 82.42  | 8,971              | 81.60  | 1,227    | 41.47  |
| 241              | Postpartum haemorrhage (O72)<br>ตกเลือดหลังคลอด   | รวม  | 7,863      | 23.74  | 1,343  | 22.61  | 1,673                 | 19.62  | 2,029  | 43.17  | 2,586              | 23.52  | 232      | 7.84   |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 7,863      | 23.74  | 1,343  | 22.61  | 1,673                 | 19.62  | 2,029  | 43.17  | 2,586              | 23.52  | 232      | 7.84   |
| 242              | Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)<br>ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และ การคลอด | รวม  | 117,244    | 354.01 | 17,371 | 292.51 | 24,267                | 284.55 | 33,765 | 718.38 | 36,465             | 331.70 | 5,376    | 181.70 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 117,244    | 354.01 | 17,371 | 292.51 | 24,267                | 284.55 | 33,765 | 718.38 | 36,465             | 331.70 | 5,376    | 181.70 |
| 243              | Single spontaneous delivery (O80)<br>การคลอดของครรภ์เดียว   | รวม  | 164,961    | 498.09 | 27,136 | 456.95 | 37,390                | 438.43 | 36,433 | 775.14 | 57,555             | 523.55 | 6,447    | 217.90 |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 164,961    | 498.09 | 27,136 | 456.95 | 37,390                | 438.43 | 36,433 | 775.14 | 57,555             | 523.55 | 6,447    | 217.90 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|--------|--------|--------------------|-------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา  |
| 246              | Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย | รวม  | 61,883     | 95.18 | 8,827 | 75.65 | 15,819                | 95.35 | 11,236 | 121.28 | 18,394             | 84.02 | 7,607    | 135.87 |
|                  |   | ชาย  | 30,505     | 95.64 | 4,382 | 76.48 | 7,880                 | 97.74 | 5,560  | 121.81 | 8,786              | 80.62 | 3,897    | 147.61 |
|                  |   | หญิง | 31,378     | 94.74 | 4,445 | 74.85 | 7,939                 | 93.09 | 5,676  | 120.76 | 9,608              | 87.40 | 3,710    | 125.39 |
| 247              | Birth trauma (P10-P15)<br>บาดเจ็บจากการคลอด   | รวม  | 3,430      | 5.28  | 583   | 5.00  | 720                   | 4.34  | 358    | 3.86   | 1,104              | 5.04  | 665      | 11.88  |
|                  |   | ชาย  | 1,958      | 6.14  | 329   | 5.74  | 400                   | 4.96  | 221    | 4.84   | 634                | 5.82  | 374      | 14.17  |
|                  |   | หญิง | 1,472      | 4.44  | 254   | 4.28  | 320                   | 3.75  | 137    | 2.91   | 470                | 4.28  | 291      | 9.84   |
| 248              | Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21)<br>ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะแօสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด  | รวม  | 6,096      | 9.38  | 670   | 5.74  | 1,176                 | 7.09  | 668    | 7.21   | 2,669              | 12.19 | 913      | 16.31  |
|                  |   | ชาย  | 3,303      | 10.36 | 380   | 6.63  | 658                   | 8.16  | 363    | 7.95   | 1,409              | 12.93 | 493      | 18.67  |
|                  |   | หญิง | 2,793      | 8.43  | 290   | 4.88  | 518                   | 6.07  | 305    | 6.49   | 1,260              | 11.46 | 420      | 14.20  |
| 249              | Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28)<br>ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด   | รวม  | 29,968     | 46.10 | 3,165 | 27.12 | 7,993                 | 48.18 | 5,478  | 59.13  | 10,103             | 46.15 | 3,229    | 57.67  |
|                  |   | ชาย  | 18,321     | 57.44 | 1,902 | 33.20 | 4,916                 | 60.98 | 3,319  | 72.71  | 6,264              | 57.48 | 1,920    | 72.72  |
|                  |   | หญิง | 11,647     | 35.17 | 1,263 | 21.27 | 3,077                 | 36.08 | 2,159  | 45.93  | 3,839              | 34.92 | 1,309    | 44.24  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 250              | Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37)<br>การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปาราสิต                         | รวม  | 19,121     | 29.41  | 2,290  | 19.63  | 5,064                 | 30.52  | 2,910  | 31.41  | 7,394              | 33.78  | 1,463    | 26.13  |
|                  |   | ชาย  | 10,320     | 32.36  | 1,246  | 21.75  | 2,687                 | 33.33  | 1,565  | 34.29  | 3,997              | 36.68  | 825      | 31.25  |
|                  |   | หญิง | 8,801      | 26.57  | 1,044  | 17.58  | 2,377                 | 27.87  | 1,345  | 28.62  | 3,397              | 30.90  | 638      | 21.56  |
| 251              | Other infections specific to the perinatal period (P38-P39)<br>การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด               | รวม  | 2,326      | 3.58   | 332    | 2.85   | 654                   | 3.94   | 427    | 4.61   | 800                | 3.65   | 113      | 2.02   |
|                  |   | ชาย  | 1,280      | 4.01   | 188    | 3.28   | 366                   | 4.54   | 224    | 4.91   | 427                | 3.92   | 75       | 2.84   |
|                  |   | หญิง | 1,046      | 3.16   | 144    | 2.42   | 288                   | 3.38   | 203    | 4.32   | 373                | 3.39   | 38       | 1.28   |
| 252              | Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)<br>โรคเม็ดเลือดแตกของ胎児ในครรภ์และแรกเกิด                              | รวม  | 4,844      | 7.45   | 581    | 4.98   | 1,600                 | 9.64   | 671    | 7.24   | 1,556              | 7.11   | 436      | 7.79   |
|                  |   | ชาย  | 2,419      | 7.58   | 308    | 5.38   | 833                   | 10.33  | 315    | 6.90   | 751                | 6.89   | 212      | 8.03   |
|                  |   | หญิง | 2,425      | 7.32   | 273    | 4.60   | 767                   | 8.99   | 356    | 7.57   | 805                | 7.32   | 224      | 7.57   |
| 253              | Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96)                                   | รวม  | 124,566    | 191.60 | 22,067 | 189.12 | 32,070                | 193.31 | 16,981 | 183.29 | 43,122             | 196.98 | 10,326   | 184.43 |
|                  |   | ชาย  | 67,579     | 211.88 | 11,975 | 209.00 | 17,552                | 217.71 | 9,034  | 197.92 | 23,365             | 214.39 | 5,653    | 214.12 |
|                  |   | หญิง | 56,987     | 172.07 | 10,092 | 169.94 | 14,518                | 170.23 | 7,947  | 169.08 | 19,757             | 179.72 | 4,673    | 157.94 |
| 254              | Spina bifida (Q05)<br>กระดูกสันหลังแยก  | รวม  | 266        | 0.41   | 29     | 0.25   | 39                    | 0.24   | 31     | 0.33   | 56                 | 0.26   | 111      | 1.98   |
|                  |   | ชาย  | 119        | 0.37   | 14     | 0.24   | 16                    | 0.20   | 13     | 0.28   | 24                 | 0.22   | 52       | 1.97   |
|                  |   | หญิง | 147        | 0.44   | 15     | 0.25   | 23                    | 0.27   | 18     | 0.38   | 32                 | 0.29   | 59       | 1.99   |
| 255              | Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท | รวม  | 1,034      | 1.59   | 150    | 1.29   | 158                   | 0.95   | 139    | 1.50   | 286                | 1.31   | 301      | 5.38   |
|                  |   | ชาย  | 522        | 1.64   | 84     | 1.47   | 91                    | 1.13   | 65     | 1.42   | 162                | 1.49   | 120      | 4.55   |
|                  |   | หญิง | 512        | 1.55   | 66     | 1.11   | 67                    | 0.79   | 74     | 1.57   | 124                | 1.13   | 181      | 6.12   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 256              | Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต                   | รวม  | 9,351      | 14.38 | 1,253 | 10.74 | 1,423                 | 8.58  | 1,091 | 11.78 | 2,027              | 9.26  | 3,557    | 63.53 |
|                  |  | ชาย  | 4,488      | 14.07 | 618   | 10.79 | 625                   | 7.75  | 515   | 11.28 | 958                | 8.79  | 1,772    | 67.12 |
|                  |  | หญิง | 4,863      | 14.68 | 635   | 10.69 | 798                   | 9.36  | 576   | 12.25 | 1,069              | 9.72  | 1,785    | 60.33 |
| 257              | Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่  | รวม  | 3,127      | 4.81  | 515   | 4.41  | 603                   | 3.63  | 579   | 6.25  | 975                | 4.45  | 455      | 8.13  |
|                  |  | ชาย  | 1,679      | 5.26  | 324   | 5.65  | 338                   | 4.19  | 256   | 5.61  | 520                | 4.77  | 241      | 9.13  |
|                  |  | หญิง | 1,448      | 4.37  | 191   | 3.22  | 265                   | 3.11  | 323   | 6.87  | 455                | 4.14  | 214      | 7.23  |
| 258              | Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ  | รวม  | 146        | 0.22  | 33    | 0.28  | 28                    | 0.17  | 32    | 0.35  | 29                 | 0.13  | 24       | 0.43  |
|                  |  | ชาย  | 78         | 0.24  | 21    | 0.37  | 16                    | 0.20  | 18    | 0.39  | 13                 | 0.12  | 10       | 0.38  |
|                  |  | หญิง | 68         | 0.21  | 12    | 0.20  | 12                    | 0.14  | 14    | 0.30  | 16                 | 0.15  | 14       | 0.47  |
| 259              | Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร  | รวม  | 15,708     | 24.16 | 2,296 | 19.68 | 4,725                 | 28.48 | 1,772 | 19.13 | 4,202              | 19.19 | 2,713    | 48.46 |
|                  |  | ชาย  | 9,441      | 29.60 | 1,391 | 24.28 | 2,883                 | 35.76 | 1,106 | 24.23 | 2,532              | 23.23 | 1,529    | 57.91 |
|                  |  | หญิง | 6,267      | 18.92 | 905   | 15.24 | 1,842                 | 21.60 | 666   | 14.17 | 1,670              | 15.19 | 1,184    | 40.02 |
| 260              | Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง   | รวม  | 1,408      | 4.41  | 241   | 4.21  | 318                   | 3.94  | 195   | 4.27  | 421                | 3.86  | 233      | 8.83  |
|                  |  | ชาย  | 1,408      | 4.41  | 241   | 4.21  | 318                   | 3.94  | 195   | 4.27  | 421                | 3.86  | 233      | 8.83  |
|                  |  | หญิง | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
| 261              | Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ | รวม  | 1,875      | 2.88  | 343   | 2.94  | 232                   | 1.40  | 300   | 3.24  | 435                | 1.99  | 565      | 10.09 |
|                  |  | ชาย  | 1,316      | 4.13  | 220   | 3.84  | 146                   | 1.81  | 223   | 4.89  | 312                | 2.86  | 415      | 15.72 |
|                  |  | หญิง | 559        | 1.69  | 123   | 2.07  | 86                    | 1.01  | 77    | 1.64  | 123                | 1.12  | 150      | 5.07  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 262              | Congenital deformities of hip (Q65)<br>ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก  | รวม  | 214        | 0.33  | 17    | 0.15  | 21                    | 0.13  | 25    | 0.27  | 51                 | 0.23  | 100      | 1.79  |
|                  |  | ชาย  | 66         | 0.21  | 4     | 0.07  | 12                    | 0.15  | 3     | 0.07  | 15                 | 0.14  | 32       | 1.21  |
|                  |  | หญิง | 148        | 0.45  | 13    | 0.22  | 9                     | 0.11  | 22    | 0.47  | 36                 | 0.33  | 68       | 2.30  |
| 263              | Congenital deformities of feet (Q66)<br>ความพิการแต่กำเนิดของเท้า  | รวม  | 1,440      | 2.21  | 179   | 1.53  | 332                   | 2.00  | 267   | 2.88  | 447                | 2.04  | 215      | 3.84  |
|                  |  | ชาย  | 728        | 2.28  | 96    | 1.68  | 150                   | 1.86  | 134   | 2.94  | 227                | 2.08  | 121      | 4.58  |
|                  |  | หญิง | 712        | 2.15  | 83    | 1.40  | 182                   | 2.13  | 133   | 2.83  | 220                | 2.00  | 94       | 3.18  |
| 264              | Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79)<br>ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง | รวม  | 2,930      | 4.51  | 455   | 3.90  | 472                   | 2.85  | 336   | 3.63  | 828                | 3.78  | 839      | 14.99 |
|                  |  | ชาย  | 1,537      | 4.82  | 233   | 4.07  | 248                   | 3.08  | 174   | 3.81  | 440                | 4.04  | 442      | 16.74 |
|                  |  | หญิง | 1,393      | 4.21  | 222   | 3.74  | 224                   | 2.63  | 162   | 3.45  | 388                | 3.53  | 397      | 13.42 |
| 265              | Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)<br>ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ   | รวม  | 4,941      | 7.60  | 724   | 6.20  | 768                   | 4.63  | 777   | 8.39  | 1,200              | 5.48  | 1,472    | 26.29 |
|                  |  | ชาย  | 2,555      | 8.01  | 358   | 6.25  | 401                   | 4.97  | 388   | 8.50  | 640                | 5.87  | 768      | 29.09 |
|                  |  | หญิง | 2,386      | 7.20  | 366   | 6.16  | 367                   | 4.30  | 389   | 8.28  | 560                | 5.09  | 704      | 23.79 |
| 266              | Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99)<br>ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น   | รวม  | 483        | 0.74  | 101   | 0.87  | 110                   | 0.66  | 64    | 0.69  | 110                | 0.50  | 98       | 1.75  |
|                  |  | ชาย  | 215        | 0.67  | 46    | 0.80  | 50                    | 0.62  | 30    | 0.66  | 50                 | 0.46  | 39       | 1.48  |
|                  |  | หญิง | 268        | 0.81  | 55    | 0.93  | 60                    | 0.70  | 34    | 0.72  | 60                 | 0.55  | 59       | 1.99  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศไทย |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน         | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 267              | Abdominal and pelvic pain (R10)<br>ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน  | รวม  | 23,661        | 36.39  | 6,438  | 55.18  | 4,593                 | 27.68  | 4,743  | 51.19  | 7,161              | 32.71  | 726      | 12.97  |
|                  |   | ชาย  | 9,449         | 29.63  | 2,670  | 46.60  | 1,777                 | 22.04  | 1,836  | 40.22  | 2,895              | 26.56  | 271      | 10.26  |
|                  |   | หญิง | 14,212        | 42.91  | 3,768  | 63.45  | 2,816                 | 33.02  | 2,907  | 61.85  | 4,266              | 38.81  | 455      | 15.38  |
| 268              | Fever of unknown origin (R50)<br>ไข้ไม่ทราบสาเหตุ   | รวม  | 59,407        | 91.38  | 12,234 | 104.85 | 8,548                 | 51.52  | 9,663  | 104.30 | 27,155             | 124.04 | 1,807    | 32.27  |
|                  |   | ชาย  | 30,527        | 95.71  | 6,484  | 113.16 | 4,328                 | 53.68  | 4,936  | 108.14 | 13,856             | 127.14 | 923      | 34.96  |
|                  |   | หญิง | 28,880        | 87.20  | 5,750  | 96.83  | 4,220                 | 49.48  | 4,727  | 100.57 | 13,299             | 120.97 | 884      | 29.88  |
| 269              | Senility (R54)<br>ชาภาพ   | รวม  | 0             | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | ชาย  | 0             | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 0             | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 270              | Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99)<br>อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบรจาก การตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสบุไว้ | รวม  | 209,144       | 321.69 | 39,763 | 340.78 | 46,033                | 277.47 | 40,639 | 438.65 | 73,513             | 335.81 | 9,196    | 164.25 |
|                  |   | ชาย  | 100,197       | 314.15 | 19,758 | 344.83 | 22,379                | 277.58 | 18,230 | 399.39 | 35,219             | 323.17 | 4,611    | 174.65 |
|                  |   | หญิง | 108,947       | 328.96 | 20,005 | 336.87 | 23,654                | 277.36 | 22,409 | 476.77 | 38,294             | 348.34 | 4,585    | 154.96 |
| 271              | Fracture of skull and facial bones (S02) กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะ และกระดูกหน้า   | รวม  | 13,588        | 20.90  | 2,134  | 18.29  | 4,240                 | 25.56  | 1,863  | 20.11  | 3,976              | 18.16  | 1,375    | 24.56  |
|                  |   | ชาย  | 10,658        | 33.42  | 1,688  | 29.46  | 3,274                 | 40.61  | 1,345  | 29.47  | 3,249              | 29.81  | 1,102    | 41.74  |
|                  |   | หญิง | 2,930         | 8.85   | 446    | 7.51   | 966                   | 11.33  | 518    | 11.02  | 727                | 6.61   | 273      | 9.23   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|---|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 272              | Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08)<br>กระดูกคอ กระดูก<br>ซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก  | รวม  | 15,726     | 24.19  | 3,906  | 33.48  | 4,200                 | 25.32  | 2,169  | 23.41  | 4,282              | 19.56  | 1,169    | 20.88  |
|                  |   | ชาย  | 9,808      | 30.75  | 2,466  | 43.04  | 2,511                 | 31.15  | 1,354  | 29.66  | 2,795              | 25.65  | 682      | 25.83  |
|                  |   | หญิง | 5,918      | 17.87  | 1,440  | 24.25  | 1,689                 | 19.80  | 815    | 17.34  | 1,487              | 13.53  | 487      | 16.46  |
| 273              | Fracture of femur (S72)<br>กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว  | รวม  | 34,992     | 53.82  | 8,829  | 75.67  | 10,163                | 61.26  | 4,371  | 47.18  | 7,878              | 35.99  | 3,751    | 67.00  |
|                  |   | ชาย  | 14,870     | 46.62  | 3,377  | 58.94  | 4,519                 | 56.05  | 2,009  | 44.01  | 3,471              | 31.85  | 1,494    | 56.59  |
|                  |   | หญิง | 20,122     | 60.76  | 5,452  | 91.81  | 5,644                 | 66.18  | 2,362  | 50.25  | 4,407              | 40.09  | 2,257    | 76.28  |
| 274              | Fracture of other limb bones (S42,<br>S52, S62, S82, S92, T10, T12)<br>กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ   | รวม  | 98,778     | 151.93 | 20,666 | 177.11 | 25,684                | 154.81 | 13,046 | 140.82 | 31,892             | 145.68 | 7,490    | 133.78 |
|                  |   | ชาย  | 65,177     | 204.35 | 13,115 | 228.89 | 17,037                | 211.32 | 8,473  | 185.63 | 21,469             | 197.00 | 5,083    | 192.53 |
|                  |   | หญิง | 33,601     | 101.46 | 7,551  | 127.15 | 8,647                 | 101.39 | 4,573  | 97.29  | 10,423             | 94.81  | 2,407    | 81.35  |
| 275              | Fracture involving multiple body<br>regions (T02)<br>กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย  | รวม  | 19         | 0.03   | 0      | 0.00   | 5                     | 0.03   | 6      | 0.06   | 8                  | 0.04   | 0        | 0.00   |
|                  |   | ชาย  | 14         | 0.04   | 0      | 0.00   | 3                     | 0.04   | 4      | 0.09   | 7                  | 0.06   | 0        | 0.00   |
|                  |   | หญิง | 5          | 0.02   | 0      | 0.00   | 2                     | 0.02   | 2      | 0.04   | 1                  | 0.01   | 0        | 0.00   |
| 276              | Dislocations, sprains and strains of<br>specified and multiple body regions<br>(S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73,<br>S83, S93, T03)<br>กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกาย<br>หลอยแห่งที่ระบุเฉพาะ | รวม  | 11,058     | 17.01  | 2,163  | 18.54  | 2,845                 | 17.15  | 1,650  | 17.81  | 3,523              | 16.09  | 877      | 15.66  |
|                  |   | ชาย  | 7,275      | 22.81  | 1,363  | 23.79  | 1,879                 | 23.31  | 1,025  | 22.46  | 2,397              | 21.99  | 611      | 23.14  |
|                  |   | หญิง | 3,783      | 11.42  | 800    | 13.47  | 966                   | 11.33  | 625    | 13.30  | 1,126              | 10.24  | 266      | 8.99   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|--------|-------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------------|--------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา |
| 277              | Injury of eye and orbit (S05)<br>การบาดเจ็บของตาและเปลือกตา   | รวม  | 7,143      | 10.99  | 1,578 | 13.52  | 1,601                 | 9.65  | 1,153 | 12.45  | 2,464              | 11.26  | 347      | 6.20  |
|                  |   | ชาย  | 5,551      | 17.40  | 1,228 | 21.43  | 1,227                 | 15.22 | 954   | 20.90  | 1,892              | 17.36  | 250      | 9.47  |
|                  |   | หญิง | 1,592      | 4.81   | 350   | 5.89   | 374                   | 4.39  | 199   | 4.23   | 572                | 5.20   | 97       | 3.28  |
| 278              | Intracranial injury (S06)<br>การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ   | รวม  | 51,735     | 79.58  | 9,314 | 79.82  | 11,544                | 69.58 | 8,125 | 87.70  | 20,162             | 92.10  | 2,590    | 46.26 |
|                  |   | ชาย  | 36,006     | 112.89 | 6,574 | 114.73 | 8,037                 | 99.69 | 5,242 | 114.84 | 14,318             | 131.38 | 1,835    | 69.50 |
|                  |   | หญิง | 15,729     | 47.49  | 2,740 | 46.14  | 3,507                 | 41.12 | 2,883 | 61.34  | 5,844              | 53.16  | 755      | 25.52 |
| 279              | Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37)<br>การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ  | รวม  | 10,763     | 16.56  | 1,911 | 16.38  | 2,805                 | 16.91 | 2,000 | 21.59  | 3,274              | 14.96  | 773      | 13.81 |
|                  |   | ชาย  | 8,991      | 28.19  | 1,573 | 27.45  | 2,330                 | 28.90 | 1,674 | 36.67  | 2,779              | 25.50  | 635      | 24.05 |
|                  |   | หญิง | 1,772      | 5.35   | 338   | 5.69   | 475                   | 5.57  | 326   | 6.94   | 495                | 4.50   | 138      | 4.66  |
| 280              | Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05)<br>การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ | รวม  | 4,992      | 7.68   | 1,068 | 9.15   | 1,240                 | 7.47  | 614   | 6.63   | 1,794              | 8.19   | 276      | 4.93  |
|                  |   | ชาย  | 4,057      | 12.72  | 869   | 15.17  | 989                   | 12.27 | 482   | 10.56  | 1,478              | 13.56  | 239      | 9.05  |
|                  |   | หญิง | 935        | 2.82   | 199   | 3.35   | 251                   | 2.94  | 132   | 2.81   | 316                | 2.87   | 37       | 1.25  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 281              | Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14 ) | รวม  | 97,433     | 149.87 | 19,555 | 167.59 | 23,106                | 139.27 | 16,418 | 177.21 | 33,800             | 154.40 | 4,554    | 81.34  |
|                  | การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะ และหลายบริเวณในร่างกาย  | ชาย  | 66,886     | 209.71 | 13,403 | 233.92 | 15,104                | 187.35 | 10,984 | 240.64 | 24,224             | 222.28 | 3,171    | 120.11 |
|                  |  | หญิง | 30,547     | 92.23  | 6,152  | 103.59 | 8,002                 | 93.83  | 5,434  | 115.61 | 9,576              | 87.11  | 1,383    | 46.74  |
| 282              | Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19)<br>ผลของวัตถุแผลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย  | รวม  | 5,526      | 8.50   | 892    | 7.64   | 1,314                 | 7.92   | 1,225  | 13.22  | 1,780              | 8.13   | 315      | 5.63   |
|                  |  | ชาย  | 3,224      | 10.11  | 532    | 9.28   | 802                   | 9.95   | 650    | 14.24  | 1,045              | 9.59   | 195      | 7.39   |
|                  |  | หญิง | 2,302      | 6.95   | 360    | 6.06   | 512                   | 6.00   | 575    | 12.23  | 735                | 6.69   | 120      | 4.06   |
| 283              | Burns and corrosions (T20-T32)<br>แผลจากความร้อนและฤทธิสารกัดกร่อน   | รวม  | 9,548      | 14.69  | 1,751  | 15.01  | 2,208                 | 13.31  | 1,529  | 16.50  | 3,542              | 16.18  | 518      | 9.25   |
|                  |  | ชาย  | 6,057      | 18.99  | 1,096  | 19.13  | 1,391                 | 17.25  | 988    | 21.65  | 2,269              | 20.82  | 313      | 11.86  |
|                  |  | หญิง | 3,491      | 10.54  | 655    | 11.03  | 817                   | 9.58   | 541    | 11.51  | 1,273              | 11.58  | 205      | 6.93   |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|--|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 284              | Poisoing by drugs and biological substances (T36-T50)<br>การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ                                | รวม  | 18,325     | 28.19 | 3,626 | 31.08 | 5,305                 | 31.98 | 2,711 | 29.26  | 5,519              | 25.21 | 1,164    | 20.79 |
|                  |  | ชาย  | 6,910      | 21.67 | 1,349 | 23.54 | 1,866                 | 23.15 | 1,043 | 22.85  | 2,179              | 19.99 | 473      | 17.92 |
|                  |  | หญิง | 11,415     | 34.47 | 2,277 | 38.34 | 3,439                 | 40.32 | 1,668 | 35.49  | 3,340              | 30.38 | 691      | 23.35 |
| 285              | Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65)<br>การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา | รวม  | 38,863     | 59.78 | 7,098 | 60.83 | 11,151                | 67.21 | 8,618 | 93.02  | 11,257             | 51.42 | 739      | 13.20 |
|                  |  | ชาย  | 22,628     | 70.95 | 4,227 | 73.77 | 6,388                 | 79.24 | 5,117 | 112.11 | 6,508              | 59.72 | 388      | 14.70 |
|                  |  | หญิง | 16,235     | 49.02 | 2,871 | 48.35 | 4,763                 | 55.85 | 3,501 | 74.49  | 4,749              | 43.20 | 351      | 11.86 |
| 286              | Maltreatment syndromes (T74)<br>กลุ่มอาการจากการทารุณ  | รวม  | 247        | 0.38  | 75    | 0.64  | 36                    | 0.22  | 22    | 0.24   | 103                | 0.47  | 11       | 0.20  |
|                  |  | ชาย  | 30         | 0.09  | 9     | 0.16  | 7                     | 0.09  | 3     | 0.07   | 10                 | 0.09  | 1        | 0.04  |
|                  |  | หญิง | 217        | 0.66  | 66    | 1.11  | 29                    | 0.34  | 19    | 0.40   | 93                 | 0.85  | 10       | 0.34  |
| 287              | Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78)<br>อื่น ๆ และที่ไม่ได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก     | รวม  | 27,190     | 41.82 | 4,980 | 42.68 | 7,594                 | 45.77 | 4,577 | 49.40  | 9,236              | 42.19 | 803      | 14.34 |
|                  |  | ชาย  | 15,457     | 48.46 | 2,782 | 48.55 | 4,336                 | 53.78 | 2,544 | 55.74  | 5,321              | 48.82 | 474      | 17.95 |
|                  |  | หญิง | 11,733     | 35.43 | 2,198 | 37.01 | 3,258                 | 38.20 | 2,033 | 43.25  | 3,915              | 35.61 | 329      | 11.12 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยพื้น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ          | ทั้งประเทศ        |                   | เหนือ         |                   | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |                   | ใต้         |                | ตะวันออกเฉียงเหนือ |                | กรุงเทพฯ      |                   |
|------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
|                  |   |              | จำนวน             | อัตรา             | จำนวน         | อัตรา             | จำนวน                 | อัตรา             | จำนวน       | อัตรา          | จำนวน              | อัตรา          | จำนวน         | อัตรา             |
| 288              | Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified (T79-T88)<br><br>ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บ บางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรีสั่ง ระบุไว้ที่อื่น | รวม ชาย      | 69,900 40,155     | 107.52 125.90     | 12,809 7,704  | 109.78 134.46     | 14,286 7,986          | 86.11 99.06       | 8,226 4,635 | 88.79 101.55   | 28,617 16,712      | 130.72 153.35  | 5,962 3,118   | 106.49 118.10     |
| 289              | Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98)<br><br>ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากการสาเหตุภายนอกอื่น ๆ   | รวม ชาย หญิง | 0 0 29,745        | 0.00 0.00 89.81   | 0 0 5,105     | 0.00 85.96        | 0 0 6,300             | 0.00 73.87        | 0 0 3,591   | 0.00 76.40     | 0 0 11,905         | 0.00 108.29    | 0 0 2,844     | 0.00 96.12        |
| 290              | Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13)<br><br>บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและขันสูตร  | รวม ชาย หญิง | 6,830 3,297 3,533 | 10.51 10.34 10.67 | 1,667 823 844 | 14.29 14.36 14.21 | 1,924 890 1,034       | 11.60 11.04 12.12 | 802 424 378 | 8.66 9.29 8.04 | 725 361 364        | 3.31 3.31 3.31 | 1,712 799 913 | 30.58 30.26 30.86 |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|------------------|---|------|------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|                  |   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน                 | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| 291              | Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21)<br>การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ   | รวม  | 49         | 0.08  | 3     | 0.03  | 16                    | 0.10  | 8     | 0.09  | 18                 | 0.08  | 4        | 0.07  |
|                  |   | ชาย  | 28         | 0.09  | 2     | 0.03  | 6                     | 0.07  | 5     | 0.11  | 11                 | 0.10  | 4        | 0.15  |
|                  |   | หญิง | 21         | 0.06  | 1     | 0.02  | 10                    | 0.12  | 3     | 0.06  | 7                  | 0.06  | 0        | 0.00  |
| 292              | Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29)<br>บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ | รวม  | 1,675      | 2.58  | 205   | 1.76  | 485                   | 2.92  | 174   | 1.88  | 662                | 3.02  | 149      | 2.66  |
|                  |   | ชาย  | 863        | 2.71  | 102   | 1.78  | 242                   | 3.00  | 86    | 1.88  | 351                | 3.22  | 82       | 3.11  |
|                  |   | หญิง | 812        | 2.45  | 103   | 1.73  | 243                   | 2.85  | 88    | 1.87  | 311                | 2.83  | 67       | 2.26  |
| 293              | Contraceptive management (Z30)<br>การรับบริการคุมกำเนิด   | รวม  | 6,885      | 10.59 | 887   | 7.60  | 2,390                 | 14.41 | 1,029 | 11.11 | 2,205              | 10.07 | 374      | 6.68  |
|                  |   | ชาย  | 45         | 0.14  | 18    | 0.31  | 4                     | 0.05  | 2     | 0.04  | 14                 | 0.13  | 7        | 0.27  |
|                  |   | หญิง | 6,840      | 20.65 | 869   | 14.63 | 2,386                 | 27.98 | 1,027 | 21.85 | 2,191              | 19.93 | 367      | 12.40 |
| 294              | Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36)<br>การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ                             | รวม  | 264        | 0.80  | 26    | 0.44  | 39                    | 0.46  | 87    | 1.85  | 107                | 0.97  | 5        | 0.17  |
|                  |   | ชาย  | 0          | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0     | 0.00  | 0                  | 0.00  | 0        | 0.00  |
|                  |   | หญิง | 264        | 0.80  | 26    | 0.44  | 39                    | 0.46  | 87    | 1.85  | 107                | 0.97  | 5        | 0.17  |

ตาราง 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วยเป็น รายภาค และ กรุงเทพมหานคร (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298) กลุ่มโรค พ.ศ. 2559

หน่วยนับ : รายโรค

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|------------------|--|------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|                  |  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน                 | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| 295              | Liveborn infants according to place of birth (Z38)<br>การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด   | รวม  | 334,383    | 514.33 | 48,825 | 418.44 | 85,826                | 517.33 | 73,681 | 795.30 | 106,259            | 485.39 | 19,792   | 353.50 |
|                  |  | ชาย  | 168,521    | 528.37 | 24,688 | 430.87 | 43,225                | 536.15 | 37,328 | 817.80 | 53,399             | 489.98 | 9,881    | 374.26 |
|                  |  | หญิง | 165,862    | 500.81 | 24,137 | 406.45 | 42,601                | 499.53 | 36,353 | 773.44 | 52,860             | 480.84 | 9,911    | 334.97 |
| 296              | Postpartum care and examination (Z39)<br>การดูแลและการตรวจหลังคลอด   | รวม  | 1,463      | 4.42   | 228    | 3.84   | 222                   | 2.60   | 436    | 9.28   | 530                | 4.82   | 47       | 1.59   |
|                  |  | ชาย  | 0          | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                     | 0.00   | 0      | 0.00   | 0                  | 0.00   | 0        | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 1,463      | 4.42   | 228    | 3.84   | 222                   | 2.60   | 436    | 9.28   | 530                | 4.82   | 47       | 1.59   |
| 297              | Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54)<br>บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือ การบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ | รวม  | 28,252     | 43.46  | 6,110  | 52.36  | 5,788                 | 34.89  | 3,140  | 33.89  | 10,995             | 50.23  | 2,219    | 39.63  |
|                  |  | ชาย  | 17,205     | 53.94  | 3,622  | 63.21  | 3,539                 | 43.90  | 1,825  | 39.98  | 6,978              | 64.03  | 1,241    | 47.01  |
|                  |  | หญิง | 11,047     | 33.36  | 2,488  | 41.90  | 2,249                 | 26.37  | 1,315  | 27.98  | 4,017              | 36.54  | 978      | 33.05  |
| 298              | Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99)<br>บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น   | รวม  | 1,028      | 1.58   | 126    | 1.08   | 244                   | 1.47   | 371    | 4.00   | 255                | 1.16   | 32       | 0.57   |
|                  |  | ชาย  | 451        | 1.41   | 46     | 0.80   | 97                    | 1.20   | 189    | 4.14   | 103                | 0.95   | 16       | 0.61   |
|                  |  | หญิง | 577        | 1.74   | 80     | 1.35   | 147                   | 1.72   | 182    | 3.87   | 152                | 1.38   | 16       | 0.54   |

รวบรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกองการสนับสนุนบริการสุขภาพ (สกส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558      |           | 2559      |           |
|-------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |  |      | จำนวน     | อัตรา     | จำนวน     | อัตรา     |
|                   |  | รวม  | 8,517,257 | 89,754.84 | 8,923,915 | 90,200.64 |
|                   | รวมทุกกลุ่มโรค   | ชาย  | 3,955,414 | 93,674.94 | 4,177,110 | 94,736.51 |
|                   |  | หญิง | 4,561,843 | 86,612.14 | 4,746,805 | 86,553.91 |
| 001               | Cholera (A00)<br>อหิวาตกโรค  | รวม  | 51        | 0.54      | 49        | 0.50      |
|                   |  | ชาย  | 20        | 0.38      | 25        | 0.57      |
|                   |  | หญิง | 31        | 0.59      | 24        | 0.44      |
| 002               | Typhoid and paratyphoid fever (A01)<br>ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม  | รวม  | 702       | 7.40      | 666       | 6.73      |
|                   |  | ชาย  | 298       | 5.66      | 309       | 7.01      |
|                   |  | หญิง | 404       | 7.67      | 357       | 6.51      |
| 003               | Shigellosis (A03)<br>โรคบิดจากเชื้อซิเกลลา   | รวม  | 43        | 0.45      | 59        | 0.60      |
|                   |  | ชาย  | 16        | 0.30      | 27        | 0.61      |
|                   |  | หญิง | 27        | 0.51      | 32        | 0.58      |
| 004               | Amoebiasis (A06)<br>โรคบิดมีตัว  | รวม  | 963       | 10.15     | 1,077     | 10.89     |
|                   |  | ชาย  | 409       | 7.77      | 418       | 9.48      |
|                   |  | หญิง | 554       | 10.52     | 659       | 12.02     |
| 005               | Diarrhoea and gastroenteritis of presumed<br>infectious origin (A09)อาการท้องร่วง กระเพาะ<br>และลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ | รวม  | 117,407   | 1,237.23  | 127,454   | 1,288.27  |
|                   |  | ชาย  | 42,851    | 813.58    | 46,627    | 1,057.50  |
|                   |  | หญิง | 74,556    | 1,415.54  | 80,827    | 1,473.81  |
| 006               | Other intestinal infectious diseases (A02,<br>A04-A05, A07-A08)<br>โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ  | รวม  | 11,718    | 123.48    | 12,736    | 128.73    |
|                   |  | ชาย  | 4,354     | 82.67     | 4,851     | 110.02    |
|                   |  | หญิง | 7,364     | 139.81    | 7,885     | 143.78    |
| 007               | Respiratory tuberculosis (A15-A16)<br>วัณโรคทางเดินหายใจ   | รวม  | 31,257    | 329.39    | 32,359    | 327.08    |
|                   |  | ชาย  | 20,244    | 384.36    | 20,994    | 476.14    |
|                   |  | หญิง | 11,013    | 209.10    | 11,365    | 207.23    |
| 008               | Other Tuberculosis (A17-A19)<br>วัณโรคอื่น ๆ   | รวม  | 5,239     | 55.21     | 5,501     | 55.60     |
|                   |  | ชาย  | 2,881     | 54.70     | 3,030     | 68.72     |
|                   |  | หญิง | 2,358     | 44.77     | 2,471     | 45.06     |
| 009               | Plaque (A20)<br>กาแฟโรค  | รวม  | 0         | 0.00      | 0         | 0.00      |
|                   |  | ชาย  | 0         | 0.00      | 0         | 0.00      |
|                   |  | หญิง | 0         | 0.00      | 0         | 0.00      |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 010               | Brucellosis (A23)<br>โรคติดเชื้อบรูเซลลา  | รวม  | 5      | 0.05   | 3      | 0.03   |
|                   |   | ชาย  | 2      | 0.04   | 2      | 0.05   |
|                   |   | หญิง | 3      | 0.06   | 1      | 0.02   |
| 011               | Leprosy (A30)<br>โรคเรือน   | รวม  | 326    | 3.44   | 278    | 2.81   |
|                   |   | ชาย  | 219    | 4.16   | 170    | 3.86   |
|                   |   | หญิง | 107    | 2.03   | 108    | 1.97   |
| 012               | Tetanus neonatorum (A33)<br>บาดทะยักในเด็กแรกเกิด   | รวม  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | หญิง | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
| 013               | Other tetanus (A34-A35)<br>บาดทะยักอื่น ๆ   | รวม  | 153    | 1.61   | 121    | 1.22   |
|                   |   | ชาย  | 88     | 1.67   | 67     | 1.52   |
|                   |   | หญิง | 65     | 1.23   | 54     | 0.98   |
| 014               | Diphtheria (A36)<br>โรคคอตีบ  | รวม  | 24     | 0.25   | 12     | 0.12   |
|                   |   | ชาย  | 12     | 0.23   | 4      | 0.09   |
|                   |   | หญิง | 12     | 0.23   | 8      | 0.15   |
| 015               | Whooping cough (A37)<br>โรคไอกรน  | รวม  | 1      | 0.01   | 2      | 0.02   |
|                   |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 1      | 0.02   |
|                   |   | หญิง | 1      | 0.02   | 1      | 0.02   |
| 016               | Meningococcal infection (A39)<br>การติดเชื้อเมนingoค็อกค็อกซ์                                   | รวม  | 43     | 0.45   | 26     | 0.26   |
|                   |   | ชาย  | 24     | 0.46   | 9      | 0.20   |
|                   |   | หญิง | 19     | 0.36   | 17     | 0.31   |
| 017               | Septicemia (A40-A41)<br>โลหิตเป็นพิษ  | รวม  | 79,700 | 839.88 | 83,795 | 846.98 |
|                   |   | ชาย  | 37,219 | 706.65 | 39,552 | 897.04 |
|                   |   | หญิง | 42,481 | 806.55 | 44,243 | 806.73 |
| 018               | Other bacterial diseases ( A21-A22,<br>A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49 )<br>โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ | รวม  | 17,448 | 183.87 | 17,716 | 179.07 |
|                   |   | ชาย  | 8,976  | 170.42 | 9,224  | 209.20 |
|                   |   | หญิง | 8,472  | 160.85 | 8,492  | 154.84 |
| 019               | Congenital syphilis (A50)<br>ซิฟิลิสแต่กำเนิด   | รวม  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | หญิง | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558  |       | 2559  |       |
|-------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
|                   |   |      | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา |
| 020               | Early syphilis (A51)<br>ชิฟิลิสระยะเริ่ม  | รวม  | 42    | 0.44  | 51    | 0.52  |
|                   |   | ชาย  | 28    | 0.53  | 29    | 0.66  |
|                   |   | หญิง | 14    | 0.27  | 22    | 0.40  |
| 021               | Other syphilis (A52-A53)<br>ชิฟิลิสวีน ๆ  | รวม  | 926   | 9.76  | 999   | 10.10 |
|                   |   | ชาย  | 532   | 10.10 | 564   | 12.79 |
|                   |   | หญิง | 394   | 7.48  | 435   | 7.93  |
| 022               | Gonococcal infection (A54)<br>การติดเชื้อหนองใน   | รวม  | 16    | 0.17  | 22    | 0.22  |
|                   |   | ชาย  | 7     | 0.13  | 16    | 0.36  |
|                   |   | หญิง | 9     | 0.17  | 6     | 0.11  |
| 023               | Sexually transmitted chlamydial diseases<br>(A55-A56)<br>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย                                    | รวม  | 4     | 0.04  | 7     | 0.07  |
|                   |   | ชาย  | 1     | 0.02  | 6     | 0.14  |
|                   |   | หญิง | 3     | 0.06  | 1     | 0.02  |
| 024               | Other infections with a predominantly sexual<br>mode of transmission (A57-A64)<br>โรคติดเชื้อวีน ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก | รวม  | 307   | 3.24  | 299   | 3.02  |
|                   |   | ชาย  | 109   | 2.07  | 92    | 2.09  |
|                   |   | หญิง | 198   | 3.76  | 207   | 3.77  |
| 025               | Relapsing fever (A68)<br>โรคไข้กลับซ้ำ  | รวม  | 1     | 0.01  | 3     | 0.03  |
|                   |   | ชาย  | 1     | 0.02  | 1     | 0.02  |
|                   |   | หญิง | 0     | 0.00  | 2     | 0.04  |
| 026               | Trachoma (A71)<br>ริดสีดวงตา  | รวม  | 5     | 0.05  | 3     | 0.03  |
|                   |   | ชาย  | 4     | 0.08  | 1     | 0.02  |
|                   |   | หญิง | 1     | 0.02  | 2     | 0.04  |
| 027               | Typhus fever (A75)<br>ไข้รากสาดใหญ่   | รวม  | 3,310 | 34.88 | 2,653 | 26.82 |
|                   |   | ชาย  | 1,623 | 30.81 | 1,326 | 30.07 |
|                   |   | หญิง | 1,687 | 32.03 | 1,327 | 24.20 |
| 028               | Acute poliomyelitis (A80)<br>โรคโปลิโอเนียบพลัน   | รวม  | 40    | 0.42  | 43    | 0.43  |
|                   |   | ชาย  | 24    | 0.46  | 20    | 0.45  |
|                   |   | หญิง | 16    | 0.30  | 23    | 0.42  |
| 029               | Rabies (A82)<br>โรคพิษสุนัขบ้า  | รวม  | 1     | 0.01  | 5     | 0.05  |
|                   |   | ชาย  | 1     | 0.02  | 4     | 0.09  |
|                   |   | หญิง | 0     | 0.00  | 1     | 0.02  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 030               | Viral encephalitis (A83-A86)<br>สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส   | รวม  | 192    | 2.02   | 217    | 2.19   |
|                   |   | ชาย  | 97     | 1.84   | 116    | 2.63   |
|                   |   | หญิง | 95     | 1.80   | 101    | 1.84   |
| 031               | Yellow fever (A95)<br>ไข้เหลือง   | รวม  | 1      | 0.01   | 3      | 0.03   |
|                   |   | ชาย  | 1      | 0.02   | 1      | 0.02   |
|                   |   | หญิง | 0      | 0.00   | 2      | 0.04   |
| 032               | Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99)<br>ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัส | รวม  | 6,141  | 64.71  | 4,352  | 43.99  |
|                   |   | ชาย  | 2,293  | 43.54  | 1,848  | 41.91  |
|                   |   | หญิง | 3,848  | 73.06  | 2,504  | 45.66  |
| 033               | Herpesviral infection (B00)<br>ไวรัส herpes   | รวม  | 1,677  | 17.67  | 1,883  | 19.03  |
|                   |   | ชาย  | 764    | 14.51  | 817    | 18.53  |
|                   |   | หญิง | 913    | 17.33  | 1,066  | 19.44  |
| 034               | Varicella and zoster (B01-B02)<br>อีสุกอีสและสวัสดิ์  | รวม  | 4,698  | 49.51  | 4,652  | 47.02  |
|                   |   | ชาย  | 2,046  | 38.85  | 1,983  | 44.97  |
|                   |   | หญิง | 2,652  | 50.35  | 2,669  | 48.67  |
| 035               | Measles (B05)<br>หัด  | รวม  | 6      | 0.06   | 14     | 0.14   |
|                   |   | ชาย  | 1      | 0.02   | 6      | 0.14   |
|                   |   | หญิง | 5      | 0.09   | 8      | 0.15   |
| 036               | Rubella (B06)<br>หัดเยอรมัน   | รวม  | 3      | 0.03   | 1      | 0.01   |
|                   |   | ชาย  | 1      | 0.02   | 1      | 0.02   |
|                   |   | หญิง | 2      | 0.04   | 0      | 0.00   |
| 037               | Acute hepatitis B (B16)<br>ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี   | รวม  | 1,735  | 18.28  | 1,843  | 18.63  |
|                   |   | ชาย  | 1,016  | 19.29  | 1,083  | 24.56  |
|                   |   | หญิง | 719    | 13.65  | 760    | 13.86  |
| 038               | Other viral hepatitis (B15, B17-B19)<br>ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ   | รวม  | 15,638 | 164.79 | 17,890 | 180.83 |
|                   |   | ชาย  | 8,747  | 166.07 | 10,341 | 234.53 |
|                   |   | หญิง | 6,891  | 130.83 | 7,549  | 137.65 |
| 039               | Human immunodeficiency virus [HIV] disease<br>(B20-B24)<br>ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)   | รวม  | 4,247  | 44.75  | 4,619  | 46.69  |
|                   |   | ชาย  | 2,367  | 44.94  | 2,587  | 58.67  |
|                   |   | หญิง | 1,880  | 35.69  | 2,032  | 37.05  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558  |       | 2559  |       |
|-------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
|                   |  |      | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา |
| 040               | Mumps (B26)<br>คางทูม  | รวม  | 24    | 0.25  | 26    | 0.26  |
|                   |  | ชาย  | 12    | 0.23  | 9     | 0.20  |
|                   |  | หญิง | 12    | 0.23  | 17    | 0.31  |
| 041               | Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04,<br>B07-B09, B25, B27-B34 )<br>โรคจากไวรัสอื่น | รวม  | 3,238 | 34.12 | 3,170 | 32.04 |
|                   |  | ชาย  | 1,250 | 23.73 | 1,238 | 28.08 |
|                   |  | หญิง | 1,988 | 37.74 | 1,932 | 35.23 |
| 042               | Mycoses (B35-B49)<br>โรคติดเชื้อร่า  | รวม  | 7,900 | 83.25 | 8,143 | 82.31 |
|                   |  | ชาย  | 3,975 | 75.47 | 3,957 | 89.74 |
|                   |  | หญิง | 3,925 | 74.52 | 4,186 | 76.33 |
| 043               | Malaria (B50-B54)<br>มาลาเรีย  | รวม  | 286   | 3.01  | 340   | 3.44  |
|                   |  | ชาย  | 167   | 3.17  | 186   | 4.22  |
|                   |  | หญิง | 119   | 2.26  | 154   | 2.81  |
| 044               | Leishmaniasis (B55)<br>โรคลิซมาเนีย  | รวม  | 1     | 0.01  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 1     | 0.02  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 045               | Trypanosomiasis (B56-B57)<br>โรคทริปโนโซม  | รวม  | 11    | 0.12  | 6     | 0.06  |
|                   |  | ชาย  | 5     | 0.09  | 1     | 0.02  |
|                   |  | หญิง | 6     | 0.11  | 5     | 0.09  |
| 046               | Schistosomiasis (B65)<br>โรคติดเชื้อซิสโตโซม   | รวม  | 8     | 0.08  | 5     | 0.05  |
|                   |  | ชาย  | 5     | 0.09  | 4     | 0.09  |
|                   |  | หญิง | 3     | 0.06  | 1     | 0.02  |
| 047               | Other fluke infections (B66)<br>โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ  | รวม  | 388   | 4.09  | 432   | 4.37  |
|                   |  | ชาย  | 207   | 3.93  | 233   | 5.28  |
|                   |  | หญิง | 181   | 3.44  | 199   | 3.63  |
| 048               | Echinococcosis (B67)<br>โรคพยาธิเอโคคีโนคอคคัส   | รวม  | 9     | 0.09  | 9     | 0.09  |
|                   |  | ชาย  | 7     | 0.13  | 6     | 0.14  |
|                   |  | หญิง | 2     | 0.04  | 3     | 0.05  |
| 049               | Dracunculiasis (B72)<br>โรคพยาธิราชันคุลลัส  | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 050               | Onchocerciasis (B73)<br>โรคพยาธิอนโคเซอร์คา   | รวม  | 1      | 0.01   | 0      | 0.00   |
|                   |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | หญิง | 1      | 0.02   | 0      | 0.00   |
| 051               | Filariasis (B74)<br>โรคพยาธิฟิลารีเย  | รวม  | 15     | 0.16   | 8      | 0.08   |
|                   |   | ชาย  | 7      | 0.13   | 5      | 0.11   |
|                   |   | หญิง | 8      | 0.15   | 3      | 0.05   |
| 052               | Hookworm diseases (B76)<br>โรคพยาธิปากขอ  | รวม  | 286    | 3.01   | 246    | 2.49   |
|                   |   | ชาย  | 118    | 2.24   | 98     | 2.22   |
|                   |   | หญิง | 168    | 3.19   | 148    | 2.70   |
| 053               | Other helminthiases (B68-B71, B75, B77-B83)<br>โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ   | รวม  | 3,817  | 40.22  | 3,716  | 37.56  |
|                   |   | ชาย  | 2,438  | 46.29  | 2,416  | 54.79  |
|                   |   | หญิง | 1,379  | 26.18  | 1,300  | 23.70  |
| 054               | Sequelae of tuberculosis (B90)<br>ผลตามหลังวัณโรค   | รวม  | 17,278 | 182.08 | 18,372 | 185.70 |
|                   |   | ชาย  | 10,678 | 202.73 | 11,610 | 263.31 |
|                   |   | หญิง | 6,600  | 125.31 | 6,762  | 123.30 |
| 055               | Sequelae of poliomyelitis (B91)<br>ผลตามหลังโรคโอลิโว   | รวม  | 18     | 0.19   | 19     | 0.19   |
|                   |   | ชาย  | 9      | 0.17   | 11     | 0.25   |
|                   |   | หญิง | 9      | 0.17   | 8      | 0.15   |
| 056               | Sequelae of leprosy (B92)<br>ผลตามหลังโรคเรือน  | รวม  | 52     | 0.55   | 41     | 0.41   |
|                   |   | ชาย  | 33     | 0.63   | 25     | 0.57   |
|                   |   | หญิง | 19     | 0.36   | 16     | 0.29   |
| 057               | Other infectious and parasitic diseases<br>(A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64,<br>B85-B89, B94, B99)โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ | รวม  | 2,096  | 22.09  | 1,930  | 19.51  |
|                   |   | ชาย  | 1,070  | 20.32  | 982    | 22.27  |
|                   |   | หญิง | 1,026  | 19.48  | 948    | 17.29  |
| 058               | Malignant neoplasm of lip, oral cavity and<br>pharynx (C00-C14)<br>เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย                          | รวม  | 11,177 | 117.78 | 11,468 | 115.92 |
|                   |   | ชาย  | 7,304  | 138.68 | 7,726  | 175.23 |
|                   |   | หญิง | 3,873  | 73.53  | 3,742  | 68.23  |
| 059               | Malignant neoplasm of oesophagus (C15)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร  | รวม  | 4,869  | 51.31  | 5,192  | 52.48  |
|                   |   | ชาย  | 4,101  | 77.86  | 4,446  | 100.83 |
|                   |   | หญิง | 768    | 14.58  | 746    | 13.60  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการรินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |  |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 060               | Malignant neoplasm of stomach (C16)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร   | รวม  | 5,841  | 61.55  | 6,058  | 61.23  |
|                   |  | ชาย  | 3,558  | 67.55  | 3,644  | 82.65  |
|                   |  | หญิง | 2,283  | 43.35  | 2,414  | 44.02  |
| 061               | Malignant neoplasm of colon (C18)<br>เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่  | รวม  | 30,265 | 318.93 | 33,489 | 338.50 |
|                   |  | ชาย  | 16,485 | 312.99 | 18,094 | 410.37 |
|                   |  | หญิง | 13,780 | 261.63 | 15,395 | 280.71 |
| 062               | Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)  | รวม  | 20,450 | 215.50 | 22,751 | 229.96 |
|                   |  | ชาย  | 12,420 | 235.81 | 13,836 | 313.80 |
|                   |  | หญิง | 8,030  | 152.46 | 8,915  | 162.56 |
| 063               | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ                              | รวม  | 30,490 | 321.30 | 31,850 | 321.93 |
|                   |  | ชาย  | 19,643 | 372.95 | 20,809 | 471.95 |
|                   |  | หญิง | 10,847 | 205.94 | 11,041 | 201.32 |
| 064               | Malignant neoplasm of pancreas (C25)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน   | รวม  | 3,132  | 33.01  | 3,339  | 33.75  |
|                   |  | ชาย  | 1,605  | 30.47  | 1,661  | 37.67  |
|                   |  | หญิง | 1,527  | 28.99  | 1,678  | 30.60  |
| 065               | Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ                        | รวม  | 4,048  | 42.66  | 4,458  | 45.06  |
|                   |  | ชาย  | 2,005  | 38.07  | 2,243  | 50.87  |
|                   |  | หญิง | 2,043  | 38.79  | 2,215  | 40.39  |
| 066               | Malignant neoplasm of larynx (C32)<br>เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง  | รวม  | 2,914  | 30.71  | 3,076  | 31.09  |
|                   |  | ชาย  | 2,699  | 51.24  | 2,841  | 64.43  |
|                   |  | หญิง | 215    | 4.08   | 235    | 4.29   |
| 067               | Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด                                | รวม  | 28,048 | 295.57 | 28,934 | 292.46 |
|                   |  | ชาย  | 18,306 | 347.56 | 18,628 | 422.48 |
|                   |  | หญิง | 9,742  | 184.96 | 10,306 | 187.92 |
| 068               | Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก | รวม  | 880    | 9.27   | 928    | 9.38   |
|                   |  | ชาย  | 520    | 9.87   | 559    | 12.68  |
|                   |  | หญิง | 360    | 6.84   | 369    | 6.73   |
| 069               | Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41)<br>เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ                         | รวม  | 730    | 7.69   | 715    | 7.23   |
|                   |  | ชาย  | 398    | 7.56   | 403    | 9.14   |
|                   |  | หญิง | 332    | 6.30   | 312    | 5.69   |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรหัสวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 070               | Malignant melanoma of skin (C43)<br>เนื้องอกร้ายที่เมลาม่าในผิวนัง  | รวม  | 516    | 5.44   | 486    | 4.91   |
|                   |   | ชาย  | 259    | 4.92   | 268    | 6.08   |
|                   |   | หญิง | 257    | 4.88   | 218    | 3.98   |
| 071               | Other malignant neoplasm of skin (C44)<br>เนื้องอกร้ายที่ผิวนังอื่น ๆ   | รวม  | 1,894  | 19.96  | 1,948  | 19.69  |
|                   |   | ชาย  | 891    | 16.92  | 958    | 21.73  |
|                   |   | หญิง | 1,003  | 19.04  | 990    | 18.05  |
| 072               | Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49)<br>เนื้องอกร้ายที่เมโซไซเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน            | รวม  | 1,743  | 18.37  | 1,914  | 19.35  |
|                   |   | ชาย  | 638    | 12.11  | 709    | 16.08  |
|                   |   | หญิง | 1,105  | 20.98  | 1,205  | 21.97  |
| 073               | Malignant neoplasm of breast (C50)<br>เนื้องอกร้ายที่เต้านม   | รวม  | 15,701 | 165.46 | 17,082 | 172.66 |
|                   |   | ชาย  | 274    | 5.20   | 266    | 6.03   |
|                   |   | หญิง | 15,427 | 292.90 | 16,816 | 306.63 |
| 074               | Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)<br>เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก   | รวม  | 9,763  | 102.88 | 10,249 | 103.59 |
|                   |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | หญิง | 9,763  | 185.36 | 10,249 | 186.88 |
| 075               | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุส่วนของมดลูก | รวม  | 4,687  | 49.39  | 5,436  | 54.95  |
|                   |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | หญิง | 4,687  | 88.99  | 5,436  | 99.12  |
| 076               | Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง            | รวม  | 7,370  | 77.67  | 7,929  | 80.14  |
|                   |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |   | หญิง | 7,370  | 139.93 | 7,929  | 144.58 |
| 077               | Malignant neoplasm of prostate (C61)<br>เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก  | รวม  | 8,548  | 90.08  | 9,184  | 92.83  |
|                   |   | ชาย  | 8,548  | 162.29 | 9,184  | 208.29 |
|                   |   | หญิง | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
| 078               | Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย                  | รวม  | 922    | 9.72   | 934    | 9.44   |
|                   |   | ชาย  | 922    | 17.51  | 934    | 21.18  |
|                   |   | หญิง | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
| 079               | Malignant neoplasm of bladder (C67)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ  | รวม  | 8,342  | 87.91  | 8,647  | 87.40  |
|                   |   | ชาย  | 6,489  | 123.20 | 6,836  | 155.04 |
|                   |   | หญิง | 1,853  | 35.18  | 1,811  | 33.02  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 080               | Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ  | รวม  | 2,026  | 21.35  | 2,169  | 21.92  |
|                   |   | ชาย  | 1,333  | 25.31  | 1,383  | 31.37  |
|                   |   | หญิง | 693    | 13.16  | 786    | 14.33  |
| 081               | Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)<br>เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ  | รวม  | 141    | 1.49   | 124    | 1.25   |
|                   |   | ชาย  | 73     | 1.39   | 72     | 1.63   |
|                   |   | หญิง | 68     | 1.29   | 52     | 0.95   |
| 082               | Malignant neoplasm of brain (C71)<br>เนื้องอกร้ายของสมอง  | รวม  | 1,215  | 12.80  | 1,182  | 11.95  |
|                   |   | ชาย  | 651    | 12.36  | 624    | 14.15  |
|                   |   | หญิง | 564    | 10.71  | 558    | 10.17  |
| 083               | Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)<br>เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง   | รวม  | 144    | 1.52   | 169    | 1.71   |
|                   |   | ชาย  | 77     | 1.46   | 83     | 1.88   |
|                   |   | หญิง | 67     | 1.27   | 86     | 1.57   |
| 084               | Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)<br>เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีไว้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง | รวม  | 77,077 | 812.24 | 82,910 | 838.03 |
|                   |   | ชาย  | 40,435 | 767.71 | 43,646 | 989.89 |
|                   |   | หญิง | 36,642 | 695.69 | 39,264 | 715.95 |
| 085               | Hodgkin's disease (C81)<br>โรคยอดกินส์  | รวม  | 336    | 3.54   | 387    | 3.91   |
|                   |   | ชาย  | 214    | 4.06   | 235    | 5.33   |
|                   |   | หญิง | 122    | 2.32   | 152    | 2.77   |
| 086               | Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)<br>เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีใช้โรคยอดกินส์  | รวม  | 10,040 | 105.80 | 10,209 | 103.19 |
|                   |   | ชาย  | 5,442  | 103.32 | 5,767  | 130.80 |
|                   |   | หญิง | 4,598  | 87.30  | 4,442  | 81.00  |
| 087               | Leukaemia (C91-C95)<br>ลิวคีเมีย  | รวม  | 5,753  | 60.63  | 6,214  | 62.81  |
|                   |   | ชาย  | 3,138  | 59.58  | 3,303  | 74.91  |
|                   |   | หญิง | 2,615  | 49.65  | 2,911  | 53.08  |
| 088               | Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ  | รวม  | 3,706  | 39.05  | 3,663  | 37.02  |
|                   |   | ชาย  | 1,883  | 35.75  | 1,822  | 41.32  |
|                   |   | หญิง | 1,823  | 34.61  | 1,841  | 33.57  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |  |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 089               | Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)<br>มะเร็งจำเพาะที่ของปากมดลูก  | รวม  | 205    | 2.16   | 208    | 2.10   |
|                   |  | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |  | หญิง | 205    | 3.89   | 208    | 3.79   |
| 090               | Benign neoplasm of skin (D22-D23)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของผิวนัง  | รวม  | 174    | 1.83   | 200    | 2.02   |
|                   |  | ชาย  | 74     | 1.40   | 89     | 2.02   |
|                   |  | หญิง | 100    | 1.90   | 111    | 2.02   |
| 091               | Benign neoplasm of breast (D24)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม  | รวม  | 98     | 1.03   | 95     | 0.96   |
|                   |  | ชาย  | 1      | 0.02   | 1      | 0.02   |
|                   |  | หญิง | 97     | 1.84   | 94     | 1.71   |
| 092               | Leiomyoma of uterus (D25)<br>ໄລໂອມໄໂອມາທີ່ມດຸກ   | รวม  | 1,168  | 12.31  | 1,346  | 13.61  |
|                   |  | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |  | หญิง | 1,168  | 22.18  | 1,346  | 24.54  |
| 093               | Benign neoplasm of ovary (D27)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่   | รวม  | 457    | 4.82   | 507    | 5.12   |
|                   |  | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|                   |  | หญิง | 457    | 8.68   | 507    | 9.24   |
| 094               | Benign neoplasm of urinary organs (D30)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ   | รวม  | 111    | 1.17   | 151    | 1.53   |
|                   |  | ชาย  | 65     | 1.23   | 91     | 2.06   |
|                   |  | หญิง | 46     | 0.87   | 60     | 1.09   |
| 095               | Benign neoplasm of brain and other parts of<br>central nervous system (D33)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบ  | รวม  | 664    | 7.00   | 654    | 6.61   |
|                   |  | ชาย  | 299    | 5.68   | 291    | 6.60   |
|                   |  | หญิง | 365    | 6.93   | 363    | 6.62   |
| 096               | Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of<br>uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21,<br>D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48)เนื้องอกไม่ร้ายจำเพาะ<br>เฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม | รวม  | 24,811 | 261.46 | 26,689 | 269.77 |
|                   |  | ชาย  | 11,620 | 220.62 | 12,570 | 285.09 |
|                   |  | หญิง | 13,191 | 250.45 | 14,119 | 257.45 |
| 097               | Iron deficiency anaemia (D50)<br>โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  | รวม  | 51,532 | 543.04 | 53,260 | 538.34 |
|                   |  | ชาย  | 20,052 | 380.71 | 21,145 | 479.57 |
|                   |  | หญิง | 31,480 | 597.69 | 32,115 | 585.59 |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 098               | Other anaemia (D51-D64)<br>โลหิตจางอื่น ๆ  | รวม  | 356,107 | 3,752.66 | 367,397 | 3,713.55 |
|                   |  | ชาย  | 148,131 | 2,812.45 | 153,890 | 3,490.21 |
|                   |  | หญิง | 207,976 | 3,948.68 | 213,507 | 3,893.12 |
| 099               | Haemorrhagic conditions and other diseases<br>of blood and blood forming organs (D65-D77)<br>ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด | รวม  | 67,641  | 712.80   | 73,383  | 741.74   |
|                   |  | ชาย  | 34,699  | 658.80   | 38,039  | 862.72   |
|                   |  | หญิง | 32,942  | 625.44   | 35,344  | 644.47   |
| 100               | Certain disorders involving the immune<br>mechanism (D80-D89)<br>ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน                                     | รวม  | 154     | 1.62     | 171     | 1.73     |
|                   |  | ชาย  | 73      | 1.39     | 94      | 2.13     |
|                   |  | หญิง | 81      | 1.54     | 77      | 1.40     |
| 101               | Iodine deficiency related thyroid disorders<br>(E00-E02)<br>การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมรั้ยรอยด์                                     | รวม  | 541     | 5.70     | 604     | 6.11     |
|                   |  | ชาย  | 151     | 2.87     | 199     | 4.51     |
|                   |  | หญิง | 390     | 7.40     | 405     | 7.38     |
| 102               | Thyrotoxicosis (E05)<br>โรคพิษรั้ยรอยด์  | รวม  | 14,003  | 147.56   | 14,607  | 147.64   |
|                   |  | ชาย  | 3,283   | 62.33    | 3,536   | 80.20    |
|                   |  | หญิง | 10,720  | 203.53   | 11,071  | 201.87   |
| 103               | Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07)<br>ความผิดปกติของต่อมรั้ยรอยด์อื่น ๆ   | รวม  | 17,275  | 182.04   | 19,848  | 200.62   |
|                   |  | ชาย  | 4,029   | 76.50    | 4,585   | 103.99   |
|                   |  | หญิง | 13,246  | 251.49   | 15,263  | 278.31   |
| 104               | Diabetes mellitus (E10-E14)<br>เบาหวาน   | รวม  | 525,291 | 5,535.52 | 556,702 | 5,627.00 |
|                   |  | ชาย  | 192,611 | 3,656.95 | 206,259 | 4,677.94 |
|                   |  | หญิง | 332,680 | 6,316.33 | 350,443 | 6,390.03 |
| 105               | Malnutrition (E40-E46)<br>ทุพโภชนาการ  | รวม  | 12,242  | 129.01   | 11,565  | 116.90   |
|                   |  | ชาย  | 6,660   | 126.45   | 6,318   | 143.29   |
|                   |  | หญิง | 5,582   | 105.98   | 5,247   | 95.67    |
| 106               | Vitamin A deficiency (E50)<br>การขาดวิตามินเอ  | รวม  | 31      | 0.33     | 32      | 0.32     |
|                   |  | ชาย  | 8       | 0.15     | 14      | 0.32     |
|                   |  | หญิง | 23      | 0.44     | 18      | 0.33     |
| 107               | Other vitamin deficiencies (E51-E56)<br>การขาดวิตามินอื่น ๆ  | รวม  | 961     | 10.13    | 1,191   | 12.04    |
|                   |  | ชาย  | 400     | 7.59     | 452     | 10.25    |
|                   |  | หญิง | 561     | 10.65    | 739     | 13.48    |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558      |           | 2559      |           |
|-------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |  |      | จำนวน     | อัตรา     | จำนวน     | อัตรา     |
| 108               | Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64)<br>ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่อง  | รวม  | 50        | 0.53      | 35        | 0.35      |
|                   |  | ชาย  | 19        | 0.36      | 15        | 0.34      |
|                   |  | หญิง | 31        | 0.59      | 20        | 0.36      |
| 109               | Obesity (E66)<br>โรคอ้วน   | รวม  | 1,895     | 19.97     | 2,043     | 20.65     |
|                   |  | ชาย  | 459       | 8.71      | 504       | 11.43     |
|                   |  | หญิง | 1,436     | 27.26     | 1,539     | 28.06     |
| 110               | Volume depletion (E86)<br>การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย   | รวม  | 18,292    | 192.76    | 13,365    | 135.09    |
|                   |  | ชาย  | 7,517     | 142.72    | 5,487     | 124.44    |
|                   |  | หญิง | 10,775    | 204.58    | 7,878     | 143.65    |
| 111               | Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90)ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ            | รวม  | 1,177,716 | 12,410.77 | 1,236,771 | 12,500.96 |
|                   |  | ชาย  | 497,198   | 9,439.91  | 526,093   | 11,931.75 |
|                   |  | หญิง | 680,518   | 12,920.46 | 710,678   | 12,958.60 |
| 112               | Dementia (F00-F03)<br>สมองเสื่อม   | รวม  | 9,972     | 105.08    | 11,036    | 111.55    |
|                   |  | ชาย  | 4,265     | 80.98     | 4,684     | 106.23    |
|                   |  | หญิง | 5,707     | 108.35    | 6,352     | 115.82    |
| 113               | Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลกอฮอล์                                      | รวม  | 13,974    | 147.26    | 14,840    | 150.00    |
|                   |  | ชาย  | 11,350    | 215.49    | 12,047    | 273.22    |
|                   |  | หญิง | 2,624     | 49.82     | 2,793     | 50.93     |
| 114               | Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้สารตระหนักหลอนต่ออัจฉิตร | รวม  | 1,361     | 14.34     | 1,432     | 14.47     |
|                   |  | ชาย  | 1,115     | 21.17     | 1,162     | 26.35     |
|                   |  | หญิง | 246       | 4.67      | 270       | 4.92      |
| 115               | Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภท และความหลงผิด   | รวม  | 10,289    | 108.43    | 10,867    | 109.84    |
|                   |  | ชาย  | 4,638     | 88.06     | 4,826     | 109.45    |
|                   |  | หญิง | 5,651     | 107.29    | 6,041     | 110.15    |
| 116               | Mood(affective) disorders (F30-F39)<br>ความผิดปกติทางอารมณ์  | รวม  | 12,814    | 135.03    | 13,579    | 137.25    |
|                   |  | ชาย  | 4,022     | 76.36     | 4,274     | 96.93     |
|                   |  | หญิง | 8,792     | 166.93    | 9,305     | 169.67    |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 117               | Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48)<br>โรคประสาท ออาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและภาวะปัญญาอ่อน        | รวม  | 8,318  | 87.66  | 8,016  | 81.02  |
|                   |   | ชาย  | 2,334  | 44.31  | 2,167  | 49.15  |
|                   |   | หญิง | 5,984  | 113.61 | 5,849  | 106.65 |
| 118               | Mental retardation (F70-F79)<br>ภาวะปัญญาอ่อน   | รวม  | 149    | 1.57   | 154    | 1.56   |
|                   |   | ชาย  | 64     | 1.22   | 68     | 1.54   |
|                   |   | หญิง | 85     | 1.61   | 86     | 1.57   |
| 119               | Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99)<br>ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ                     | รวม  | 25,453 | 268.22 | 27,772 | 280.71 |
|                   |   | ชาย  | 12,633 | 239.85 | 13,953 | 316.45 |
|                   |   | หญิง | 12,820 | 243.40 | 13,819 | 251.98 |
| 120               | Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09)<br>การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง                             | รวม  | 6,210  | 65.44  | 6,555  | 66.26  |
|                   |   | ชาย  | 3,411  | 64.76  | 3,576  | 81.10  |
|                   |   | หญิง | 2,799  | 53.14  | 2,979  | 54.32  |
| 121               | Parkinson's disease (G20)<br>โรคพาคินชัน  | รวม  | 14,254 | 150.21 | 15,498 | 156.65 |
|                   |   | ชาย  | 6,735  | 127.87 | 7,409  | 168.04 |
|                   |   | หญิง | 7,519  | 142.76 | 8,089  | 147.50 |
| 122               | Alzheimer's disease (G30)<br>โรคแอลไซเมอร์  | รวม  | 5,818  | 61.31  | 7,039  | 71.15  |
|                   |   | ชาย  | 2,204  | 41.85  | 2,669  | 60.53  |
|                   |   | หญิง | 3,614  | 68.62  | 4,370  | 79.68  |
| 123               | Multiple sclerosis (G35)<br>มัลติเพลิ  sclerovirosis  | รวม  | 52     | 0.55   | 66     | 0.67   |
|                   |   | ชาย  | 19     | 0.36   | 21     | 0.48   |
|                   |   | หญิง | 33     | 0.63   | 45     | 0.82   |
| 124               | Epilepsy (G40-G41)<br>ลมบ้าหมู  | รวม  | 19,578 | 206.31 | 20,663 | 208.86 |
|                   |   | ชาย  | 11,272 | 214.01 | 11,718 | 265.76 |
|                   |   | หญิง | 8,306  | 157.70 | 8,945  | 163.10 |
| 125               | Migraine and other headache syndromes (G43-G44)<br>โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ                                     | รวม  | 4,369  | 46.04  | 3,943  | 39.85  |
|                   |   | ชาย  | 1,480  | 28.10  | 1,315  | 29.82  |
|                   |   | หญิง | 2,889  | 54.85  | 2,628  | 47.92  |
| 126               | Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)<br>โรคเลือดไปเลี้ยงสมอง น้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง | รวม  | 6,847  | 72.15  | 7,218  | 72.96  |
|                   |   | ชาย  | 3,639  | 69.09  | 3,890  | 88.22  |
|                   |   | หญิง | 3,208  | 60.91  | 3,328  | 60.68  |

**ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)**

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|---|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |   |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 127               | Nerve, nerve root and plexus disorders<br>(G50-G59) ความผิดปกติของสันประสาท راك<br>ประสาทและปมประสาท                            | รวม  | 4,848   | 51.09    | 5,327   | 53.84    |
|                   |   | ชาย  | 2,068   | 39.26    | 2,357   | 53.46    |
|                   |   | หญิง | 2,780   | 52.78    | 2,970   | 54.16    |
| 128               | Cerebral palsy and other paralytic syndromes<br>(G80-G83)<br>สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ                                 | รวม  | 20,758  | 218.75   | 23,760  | 240.16   |
|                   |   | ชาย  | 11,524  | 218.80   | 13,204  | 299.47   |
|                   |   | หญิง | 9,234   | 175.32   | 10,556  | 192.48   |
| 129               | Other diseases of the nervous system (G10-G13,<br>G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73,<br>G90-G99) โรคของระบบประสาಥอน ๆ | รวม  | 43,031  | 453.46   | 47,409  | 479.20   |
|                   |   | ชาย  | 20,365  | 386.65   | 22,848  | 518.19   |
|                   |   | หญิง | 22,666  | 430.34   | 24,561  | 447.85   |
| 130               | Inflammation of eyelid (H00-H01)<br>การอักเสบของหนังตา  | รวม  | 585     | 6.16     | 735     | 7.43     |
|                   |   | ชาย  | 223     | 4.23     | 285     | 6.46     |
|                   |   | หญิง | 362     | 6.87     | 450     | 8.21     |
| 131               | Conjunctivitis and other disorders of<br>conjunctiva (H10-H13)<br>เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ               | รวม  | 11,590  | 122.14   | 10,779  | 108.95   |
|                   |   | ชาย  | 4,254   | 80.77    | 4,039   | 91.60    |
|                   |   | หญิง | 7,336   | 139.28   | 6,740   | 122.90   |
| 132               | Keratitis and other disorders of sclera and<br>cornea (H15-H19)<br>กระจากตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและ                      | รวม  | 5,039   | 53.10    | 5,324   | 53.81    |
|                   |   | ชาย  | 2,593   | 49.23    | 2,756   | 62.51    |
|                   |   | หญิง | 2,446   | 46.44    | 2,568   | 46.83    |
| 133               | Cataract and other disorders of sclera and<br>cornea (H25-H28)<br>ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ                          | รวม  | 200,887 | 2,116.95 | 176,963 | 1,788.70 |
|                   |   | ชาย  | 83,068  | 1,577.15 | 73,146  | 1,658.95 |
|                   |   | หญิง | 117,819 | 2,236.94 | 103,817 | 1,893.01 |
| 134               | Retinal detachments and breaks (H33)<br>จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา   | รวม  | 2,722   | 28.68    | 2,644   | 26.72    |
|                   |   | ชาย  | 1,627   | 30.89    | 1,584   | 35.92    |
|                   |   | หญิง | 1,095   | 20.79    | 1,060   | 19.33    |
| 135               | Glaucoma (H40-H42)<br>ต้อหิน  | รวม  | 14,747  | 155.40   | 15,398  | 155.64   |
|                   |   | ชาย  | 6,566   | 124.66   | 7,005   | 158.87   |
|                   |   | หญิง | 8,181   | 155.33   | 8,393   | 153.04   |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |          | 2559    |           |
|-------------------|---|------|---------|----------|---------|-----------|
|                   |   |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา     |
| 136               | Strabismus (H49-H50)<br>ตาเหลื่อม   | รวม  | 521     | 5.49     | 583     | 5.89      |
|                   |   | ชาย  | 250     | 4.75     | 273     | 6.19      |
|                   |   | หญิง | 271     | 5.15     | 310     | 5.65      |
| 137               | Disorders of refraction and accommodation<br>(H52)<br>ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง  | รวม  | 826     | 8.70     | 662     | 6.69      |
|                   |   | ชาย  | 376     | 7.14     | 285     | 6.46      |
|                   |   | หญิง | 450     | 8.54     | 377     | 6.87      |
| 138               | Blindness and low vision (H54)<br>ตาบอดและสายตาเสื่อมลง   | รวม  | 194,162 | 2,046.08 | 170,892 | 1,727.33  |
|                   |   | ชาย  | 79,998  | 1,518.86 | 70,283  | 1,594.01  |
|                   |   | หญิง | 114,164 | 2,167.54 | 100,609 | 1,834.52  |
| 139               | Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06,<br>H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53,<br>H55-H59)โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ | รวม  | 19,723  | 207.84   | 20,891  | 211.16    |
|                   |   | ชาย  | 8,469   | 160.79   | 8,953   | 203.05    |
|                   |   | หญิง | 11,254  | 213.67   | 11,938  | 217.68    |
| 140               | Otitis media and other disorders of middle<br>ear and mastoid (H65-H75) หูชั้นกลางอักเสบ<br>และความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกอกหูอื่น ๆ   | รวม  | 1,598   | 16.84    | 1,636   | 16.54     |
|                   |   | ชาย  | 710     | 13.48    | 795     | 18.03     |
|                   |   | หญิง | 888     | 16.86    | 841     | 15.33     |
| 141               | Hearing loss (H90-H91)<br>การสูญเสียการได้ยิน   | รวม  | 1,476   | 15.55    | 1,507   | 15.23     |
|                   |   | ชาย  | 804     | 15.26    | 794     | 18.01     |
|                   |   | หญิง | 672     | 12.76    | 713     | 13.00     |
| 142               | Other diseases of the ear and mastoid<br>process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)<br>โรคของหูและปุ่มกอกหูอื่น ๆ                                  | รวม  | 15,050  | 158.60   | 14,403  | 145.58    |
|                   |   | ชาย  | 4,654   | 88.36    | 4,531   | 102.76    |
|                   |   | หญิง | 10,396  | 197.38   | 9,872   | 180.01    |
| 143               | Acute rheumatic fever (I00-I02)<br>ไข้รูมาติกเฉียบพลัน  | รวม  | 152     | 1.60     | 167     | 1.69      |
|                   |   | ชาย  | 58      | 1.10     | 62      | 1.41      |
|                   |   | หญิง | 94      | 1.78     | 105     | 1.91      |
| 144               | Chronic rheumatic heart disease (I05-I09)<br>โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง  | รวม  | 13,814  | 145.57   | 14,196  | 143.49    |
|                   |   | ชาย  | 5,238   | 99.45    | 5,388   | 122.20    |
|                   |   | หญิง | 8,576   | 162.83   | 8,808   | 160.61    |
| 145               | Essential (primary) hypertension (I10)<br>ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ   | รวม  | 893,130 | 9,411.80 | 950,830 | 9,610.75  |
|                   |   | ชาย  | 371,584 | 7,054.97 | 399,445 | 9,059.38  |
|                   |   | หญิง | 521,546 | 9,902.18 | 551,385 | 10,054.03 |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 146               | Other hypertensive diseases (I11-I15)<br>โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ  | รวม  | 7,365   | 77.61    | 6,064   | 61.29    |
|                   |  | ชาย  | 3,163   | 60.05    | 2,598   | 58.92    |
|                   |  | หญิง | 4,202   | 79.78    | 3,466   | 63.20    |
| 147               | Acute myocardial infarction (I21-I22)<br>กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน   | รวม  | 58,557  | 617.07   | 58,916  | 595.51   |
|                   |  | ชาย  | 30,744  | 583.71   | 31,064  | 704.53   |
|                   |  | หญิง | 27,813  | 528.06   | 27,852  | 507.86   |
| 148               | Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25)<br>โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ  | รวม  | 185,065 | 1,950.21 | 186,144 | 1,881.50 |
|                   |  | ชาย  | 97,050  | 1,842.61 | 99,020  | 2,245.77 |
|                   |  | หญิง | 88,015  | 1,671.07 | 87,124  | 1,588.63 |
| 149               | Pulmonary embolism (I26)<br>ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด   | รวม  | 2,990   | 31.51    | 3,349   | 33.85    |
|                   |  | ชาย  | 1,027   | 19.50    | 1,267   | 28.74    |
|                   |  | หญิง | 1,963   | 37.27    | 2,082   | 37.96    |
| 150               | Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49)<br>ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ                            | รวม  | 159,628 | 1,682.16 | 171,648 | 1,734.97 |
|                   |  | ชาย  | 73,873  | 1,402.57 | 80,001  | 1,814.42 |
|                   |  | หญิง | 85,755  | 1,628.16 | 91,647  | 1,671.10 |
| 151               | Heart failure (I50)<br>หัวใจล้มเหลว  | รวม  | 137,868 | 1,452.85 | 140,482 | 1,419.96 |
|                   |  | ชาย  | 56,004  | 1,063.30 | 57,912  | 1,313.44 |
|                   |  | หญิง | 81,864  | 1,554.29 | 82,570  | 1,505.59 |
| 152               | Other heart diseases (I27-I43, I51-I52)<br>โรคหัวใจอื่น ๆ  | รวม  | 69,492  | 732.31   | 73,010  | 737.97   |
|                   |  | ชาย  | 30,759  | 584.00   | 32,785  | 743.56   |
|                   |  | หญิง | 38,733  | 735.39   | 40,225  | 733.47   |
| 153               | Intracranial haemorrhage (I60-I62)<br>เลือดออกในสมอง   | รวม  | 29,448  | 310.32   | 31,694  | 320.35   |
|                   |  | ชาย  | 15,586  | 295.92   | 17,131  | 388.53   |
|                   |  | หญิง | 13,862  | 263.19   | 14,563  | 265.54   |
| 154               | Cerebral infarction (I63)<br>เนื้อสมองตาย  | รวม  | 71,417  | 752.59   | 73,796  | 745.91   |
|                   |  | ชาย  | 36,887  | 700.34   | 38,067  | 863.36   |
|                   |  | หญิง | 34,530  | 655.59   | 35,729  | 651.49   |
| 155               | Stroke, not specified as haemorrhage or infarction<br>(I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด | รวม  | 15,162  | 159.78   | 16,857  | 170.39   |
|                   |  | ชาย  | 7,986   | 151.62   | 8,899   | 201.83   |
|                   |  | หญิง | 7,176   | 136.25   | 7,958   | 145.11   |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |          |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|----------|
|                   |  |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา    |
| 156               | Other cerebrovascular diseases (I65-I69)<br>โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ   | รวม  | 82,199 | 866.21 | 85,351 | 862.71   |
|                   |  | ชาย  | 43,956 | 834.56 | 45,803 | 1,038.81 |
|                   |  | หญิง | 38,243 | 726.09 | 39,548 | 721.12   |
| 157               | Atherosclerosis (I70)<br>อะเรอโรสเคลอโรสิส   | รวม  | 1,700  | 17.91  | 1,739  | 17.58    |
|                   |  | ชาย  | 849    | 16.12  | 867    | 19.66    |
|                   |  | หญิง | 851    | 16.16  | 872    | 15.90    |
| 158               | Other peripheral vascular diseases (I73)<br>โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ   | รวม  | 1,373  | 14.47  | 1,401  | 14.16    |
|                   |  | ชาย  | 761    | 14.45  | 779    | 17.67    |
|                   |  | หญิง | 612    | 11.62  | 622    | 11.34    |
| 159               | Aterial embolism and thrombosis (I74)<br>ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง  | รวม  | 4,635  | 48.84  | 4,552  | 46.01    |
|                   |  | ชาย  | 2,457  | 46.65  | 2,359  | 53.50    |
|                   |  | หญิง | 2,178  | 41.35  | 2,193  | 39.99    |
| 160               | Other disease of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79)<br>โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ | รวม  | 10,827 | 114.09 | 11,627 | 117.52   |
|                   |  | ชาย  | 6,545  | 124.26 | 7,075  | 160.46   |
|                   |  | หญิง | 4,282  | 81.30  | 4,552  | 83.00    |
| 161               | Phlebitis, thrombophlebitis,venous embolism and thrombosis (I80-I82)<br>หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด           | รวม  | 12,187 | 128.43 | 13,596 | 137.42   |
|                   |  | ชาย  | 4,856  | 92.20  | 5,390  | 122.24   |
|                   |  | หญิง | 7,331  | 139.19 | 8,206  | 149.63   |
| 162               | Varicose veins of lower extremities (I83)<br>หลอดเลือดดำขอดของรยางค์ส่วนล่าง   | รวม  | 685    | 7.22   | 760    | 7.68     |
|                   |  | ชาย  | 318    | 6.04   | 351    | 7.96     |
|                   |  | หญิง | 367    | 6.97   | 409    | 7.46     |
| 163               | Haemorrhoids (I84)<br>ริดสีดวงทวาร   | รวม  | 8,126  | 85.63  | 8,625  | 87.18    |
|                   |  | ชาย  | 4,731  | 89.82  | 4,964  | 112.58   |
|                   |  | หญิง | 3,395  | 64.46  | 3,661  | 66.76    |
| 164               | Other diseases of the circulatory system (I85-I99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต   | รวม  | 22,354 | 235.57 | 24,984 | 252.53   |
|                   |  | ชาย  | 12,007 | 227.97 | 13,524 | 306.72   |
|                   |  | หญิง | 10,347 | 196.45 | 11,460 | 208.96   |
| 165               | Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)<br>คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน                               | รวม  | 5,112  | 53.87  | 5,249  | 53.06    |
|                   |  | ชาย  | 1,888  | 35.85  | 1,965  | 44.57    |
|                   |  | หญิง | 3,224  | 61.21  | 3,284  | 59.88    |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 166               | Acute laryngitis and tracheitis (J04)<br>กล่องเสียงและหลอดลมให้ญ้อักเสบเฉียบพลัน                               | รวม  | 293     | 3.09     | 274     | 2.77     |
|                   |  | ชาย  | 145     | 2.75     | 136     | 3.08     |
|                   |  | หญิง | 148     | 2.81     | 138     | 2.52     |
| 167               | Other acute upper respiratory infections<br>(J00-J01, J05-J06)<br>การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน | รวม  | 9,374   | 98.78    | 9,869   | 99.75    |
|                   |  | ชาย  | 3,751   | 71.22    | 3,796   | 86.09    |
|                   |  | หญิง | 5,623   | 106.76   | 6,073   | 110.74   |
| 168               | Influenza (J09-J11)<br>ไข้หวัดใหญ่   | รวม  | 3,781   | 39.84    | 6,776   | 68.49    |
|                   |  | ชาย  | 1,585   | 30.09    | 2,811   | 63.75    |
|                   |  | หญิง | 2,196   | 41.69    | 3,965   | 72.30    |
| 169               | Pneumonia (J12-J18)<br>ปอดบวม  | รวม  | 212,010 | 2,234.16 | 236,268 | 2,388.14 |
|                   |  | ชาย  | 111,675 | 2,120.29 | 125,764 | 2,852.32 |
|                   |  | หญิง | 100,335 | 1,904.98 | 110,504 | 2,014.95 |
| 170               | Acute bronchitis and acute bronchiolitis<br>(J20-J21)<br>หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ              | รวม  | 31,399  | 330.88   | 33,295  | 336.54   |
|                   |  | ชาย  | 13,568  | 257.60   | 14,357  | 325.62   |
|                   |  | หญิง | 17,831  | 338.54   | 18,938  | 345.32   |
| 171               | Chronic sinusitis (J32)<br>ไซน์สอค์เสบเรื้อรัง   | รวม  | 1,787   | 18.83    | 1,940   | 19.61    |
|                   |  | ชาย  | 840     | 15.95    | 953     | 21.61    |
|                   |  | หญิง | 947     | 17.98    | 987     | 18.00    |
| 172               | Other diseases of nose and nasal sinuses<br>(J30-J31, J33-J34)<br>โรคอื่นของจมูกและไซนัส                       | รวม  | 3,242   | 34.16    | 3,488   | 35.26    |
|                   |  | ชาย  | 1,596   | 30.30    | 1,705   | 38.67    |
|                   |  | หญิง | 1,646   | 31.25    | 1,783   | 32.51    |
| 173               | Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35)<br>โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ                 | รวม  | 175     | 1.84     | 178     | 1.80     |
|                   |  | ชาย  | 66      | 1.25     | 71      | 1.61     |
|                   |  | หญิง | 109     | 2.07     | 107     | 1.95     |
| 174               | Other diseases of upper respiratory tract<br>(J36-J39)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน                         | รวม  | 2,354   | 24.81    | 2,631   | 26.59    |
|                   |  | ชาย  | 1,242   | 23.58    | 1,395   | 31.64    |
|                   |  | หญิง | 1,112   | 21.11    | 1,236   | 22.54    |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 175               | Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44)โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น | รวม  | 206,979 | 2,181.14 | 212,195 | 2,144.81 |
|                   |  | ชาย  | 151,209 | 2,870.89 | 156,615 | 3,552.02 |
|                   |  | หญิง | 55,770  | 1,058.86 | 55,580  | 1,013.45 |
| 176               | Asthma (J45-J46)<br>โรคหืด   | รวม  | 35,943  | 378.77   | 38,963  | 393.83   |
|                   |  | ชาย  | 7,504   | 142.47   | 7,769   | 176.20   |
|                   |  | หญิง | 28,439  | 539.95   | 31,194  | 568.80   |
| 177               | Bronchioectasis (J47)<br>โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง  | รวม  | 9,890   | 104.22   | 11,046  | 111.65   |
|                   |  | ชาย  | 4,208   | 79.89    | 4,672   | 105.96   |
|                   |  | หญิง | 5,682   | 107.88   | 6,374   | 116.22   |
| 178               | Pnemoconiosis (J60-J65)<br>โรคฝุ่นละอณ์ในปอด   | รวม  | 82      | 0.86     | 95      | 0.96     |
|                   |  | ชาย  | 54      | 1.03     | 61      | 1.38     |
|                   |  | หญิง | 28      | 0.53     | 34      | 0.62     |
| 179               | Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ   | รวม  | 187,124 | 1,971.91 | 199,137 | 2,012.83 |
|                   |  | ชาย  | 101,623 | 1,929.44 | 109,307 | 2,479.07 |
|                   |  | หญิง | 85,501  | 1,623.34 | 89,830  | 1,637.97 |
| 180               | Dental caries (K02)<br>ฟันผุ   | รวม  | 1,657   | 17.46    | 1,757   | 17.76    |
|                   |  | ชาย  | 748     | 14.20    | 802     | 18.19    |
|                   |  | หญิง | 909     | 17.26    | 955     | 17.41    |
| 181               | Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง                                | รวม  | 4,846   | 51.07    | 4,844   | 48.96    |
|                   |  | ชาย  | 2,172   | 41.24    | 2,148   | 48.72    |
|                   |  | หญิง | 2,674   | 50.77    | 2,696   | 49.16    |
| 182               | Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14)โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร                              | รวม  | 6,021   | 63.45    | 6,370   | 64.39    |
|                   |  | ชาย  | 2,526   | 47.96    | 2,720   | 61.69    |
|                   |  | หญิง | 3,495   | 66.36    | 3,650   | 66.55    |
| 183               | Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)<br>แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม  | รวม  | 25,737  | 271.22   | 24,947  | 252.16   |
|                   |  | ชาย  | 15,042  | 285.59   | 14,797  | 335.59   |
|                   |  | หญิง | 10,695  | 203.06   | 10,150  | 185.08   |
| 184               | Gastritis and duodenitis (K29)<br>กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ   | รวม  | 23,126  | 243.70   | 23,514  | 237.67   |
|                   |  | ชาย  | 11,009  | 209.02   | 11,242  | 254.97   |
|                   |  | หญิง | 12,117  | 230.06   | 12,272  | 223.77   |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |  |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 185               | Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31)<br>โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม | รวม  | 79,237 | 835.00 | 76,748 | 775.75 |
|                   |  | ชาย  | 31,419 | 596.53 | 30,646 | 695.05 |
|                   |  | หญิง | 47,818 | 907.88 | 46,102 | 840.63 |
| 186               | Diseases of appEndix (K35-K38)<br>โรคของไส้ติ้ง  | รวม  | 15,067 | 158.78 | 15,068 | 152.30 |
|                   |  | ชาย  | 6,489  | 123.20 | 6,477  | 146.90 |
|                   |  | หญิง | 8,578  | 162.86 | 8,591  | 156.65 |
| 187               | Inguinal hernia (K40)<br>ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ  | รวม  | 17,566 | 185.11 | 17,989 | 181.83 |
|                   |  | ชาย  | 16,906 | 320.98 | 17,326 | 392.95 |
|                   |  | หญิง | 660    | 12.53  | 663    | 12.09  |
| 188               | Other hernia (K41-K46)<br>ไส้เลื่อนอื่น ๆ  | รวม  | 3,323  | 35.02  | 3,573  | 36.11  |
|                   |  | ชาย  | 1,336  | 25.37  | 1,407  | 31.91  |
|                   |  | หญิง | 1,987  | 37.73  | 2,166  | 39.50  |
| 189               | Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51)<br>โรคโกรนและลำไส้ใหญ่ยกเสบแพลงเปื่อย                                   | รวม  | 435    | 4.58   | 448    | 4.53   |
|                   |  | ชาย  | 195    | 3.70   | 198    | 4.49   |
|                   |  | หญิง | 240    | 4.56   | 250    | 4.56   |
| 190               | Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56)<br>ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน      | รวม  | 19,848 | 209.16 | 20,988 | 212.14 |
|                   |  | ชาย  | 11,581 | 219.88 | 12,478 | 283.00 |
|                   |  | หญิง | 8,267  | 156.96 | 8,510  | 155.17 |
| 191               | Diverticular disease of intestine (K57)<br>โรคติ่งเนื้อของลำไส้  | รวม  | 5,024  | 52.94  | 5,575  | 56.35  |
|                   |  | ชาย  | 2,320  | 44.05  | 2,751  | 62.39  |
|                   |  | หญิง | 2,704  | 51.34  | 2,824  | 51.49  |
| 192               | Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67)<br>โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง                    | รวม  | 51,672 | 544.52 | 53,759 | 543.38 |
|                   |  | ชาย  | 25,773 | 489.33 | 26,841 | 608.75 |
|                   |  | หญิง | 25,899 | 491.72 | 26,918 | 490.83 |
| 193               | Alcoholic liver disease (K70)<br>โรคตับเกี่ยวกับอลกอฮอล์   | รวม  | 11,098 | 116.95 | 11,761 | 118.88 |
|                   |  | ชาย  | 7,648  | 145.21 | 8,216  | 186.34 |
|                   |  | หญิง | 3,450  | 65.50  | 3,545  | 64.64  |
| 194               | Other disease of liver (K71-K77)<br>โรคอื่น ๆ ของตับ   | รวม  | 60,306 | 635.50 | 63,636 | 643.22 |
|                   |  | ชาย  | 31,038 | 589.29 | 32,810 | 744.13 |
|                   |  | หญิง | 29,268 | 555.69 | 30,826 | 562.09 |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 195               | Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81)<br>โรคนิรในระบบნ้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ                                 | รวม  | 35,752  | 376.75   | 36,776  | 371.72   |
|                   |  | ชาย  | 15,576  | 295.73   | 16,122  | 365.65   |
|                   |  | หญิง | 20,176  | 383.07   | 20,654  | 376.61   |
| 196               | Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86)<br>ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน  | รวม  | 4,899   | 51.63    | 5,339   | 53.97    |
|                   |  | ชาย  | 2,773   | 52.65    | 2,939   | 66.66    |
|                   |  | หญิง | 2,126   | 40.36    | 2,400   | 43.76    |
| 197               | Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร                          | รวม  | 72,489  | 763.89   | 74,129  | 749.28   |
|                   |  | ชาย  | 40,220  | 763.63   | 41,637  | 944.32   |
|                   |  | หญิง | 32,269  | 612.67   | 32,492  | 592.46   |
| 198               | Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08)<br>โรคอักเสบติดเชื้อของผิวนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวนัง      | รวม  | 63,579  | 670.00   | 58,773  | 594.06   |
|                   |  | ชาย  | 32,551  | 618.02   | 30,128  | 683.30   |
|                   |  | หญิง | 31,028  | 589.10   | 28,645  | 522.32   |
| 199               | Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99)<br>โรคอื่น ๆ ของผิวนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวนัง        | รวม  | 53,562  | 564.44   | 56,150  | 567.55   |
|                   |  | ชาย  | 25,172  | 477.92   | 25,845  | 586.16   |
|                   |  | หญิง | 28,390  | 539.02   | 30,305  | 552.59   |
| 200               | Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14)<br>ข้ออักเสบรูห์มาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ | รวม  | 115,684 | 1,219.08 | 122,134 | 1,234.50 |
|                   |  | ชาย  | 73,704  | 1,399.36 | 78,064  | 1,770.49 |
|                   |  | หญิง | 41,980  | 797.04   | 44,070  | 803.58   |
| 201               | Arthrosis (M15-M19)<br>โรคข้อเสื่อม  | รวม  | 28,051  | 295.60   | 28,771  | 290.81   |
|                   |  | ชาย  | 6,251   | 118.68   | 6,349   | 143.99   |
|                   |  | หญิง | 21,800  | 413.90   | 22,422  | 408.85   |
| 202               | Acquired deformities of limbs (M20-M21)<br>ความพิการของแขนขา   | รวม  | 465     | 4.90     | 517     | 5.23     |
|                   |  | ชาย  | 126     | 2.39     | 165     | 3.74     |
|                   |  | หญิง | 339     | 6.44     | 352     | 6.42     |
| 203               | Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ   | รวม  | 8,569   | 90.30    | 8,860   | 89.55    |
|                   |  | ชาย  | 3,927   | 74.56    | 4,030   | 91.40    |
|                   |  | หญิง | 4,642   | 88.13    | 4,830   | 88.07    |
| 204               | Systemic connective tissue disorders (M30-M36)<br>ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อปราสาณ                             | รวม  | 4,620   | 48.69    | 5,112   | 51.67    |
|                   |  | ชาย  | 1,210   | 22.97    | 1,351   | 30.64    |
|                   |  | หญิง | 3,410   | 64.74    | 3,761   | 68.58    |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการรินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 205               | Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51)<br>กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ                       | รวม  | 2,087   | 21.99    | 2,084   | 21.06    |
|                   |  | ชาย  | 1,040   | 19.75    | 1,082   | 24.54    |
|                   |  | หญิง | 1,047   | 19.88    | 1,002   | 18.27    |
| 206               | Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54)<br>พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ  | รวม  | 37,077  | 390.72   | 36,821  | 372.18   |
|                   |  | ชาย  | 14,627  | 277.71   | 15,150  | 343.60   |
|                   |  | หญิง | 22,450  | 426.24   | 21,671  | 395.15   |
| 207               | Soft tissue disorders (M60-M79)<br>เนื้อเยื่อผิดปกติ   | รวม  | 40,427  | 426.02   | 38,701  | 391.18   |
|                   |  | ชาย  | 18,630  | 353.71   | 17,731  | 402.14   |
|                   |  | หญิง | 21,797  | 413.84   | 20,970  | 382.37   |
| 208               | Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อ<br>กระดูกและโครงสร้าง                      | รวม  | 10,447  | 110.09   | 10,473  | 105.86   |
|                   |  | ชาย  | 2,150   | 40.82    | 2,154   | 48.85    |
|                   |  | หญิง | 8,297   | 157.53   | 8,319   | 151.69   |
| 209               | Osteomyelitis (M86)<br>กระดูกอักเสบ  | รวม  | 4,469   | 47.09    | 4,517   | 45.66    |
|                   |  | ชาย  | 2,411   | 45.78    | 2,486   | 56.38    |
|                   |  | หญิง | 2,058   | 39.07    | 2,031   | 37.03    |
| 210               | Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาณ | รวม  | 5,216   | 54.97    | 5,048   | 51.02    |
|                   |  | ชาย  | 2,160   | 41.01    | 2,153   | 48.83    |
|                   |  | หญิง | 3,056   | 58.02    | 2,895   | 52.79    |
| 211               | Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบ<br>เฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว                   | รวม  | 328     | 3.46     | 336     | 3.40     |
|                   |  | ชาย  | 147     | 2.79     | 160     | 3.63     |
|                   |  | หญิง | 181     | 3.44     | 176     | 3.21     |
| 212               | Other glomerular diseases (N02-N08)<br>โรคของหน่วยไตอื่น ๆ   | รวม  | 17,822  | 187.81   | 18,636  | 188.37   |
|                   |  | ชาย  | 6,881   | 130.64   | 7,297   | 165.50   |
|                   |  | หญิง | 10,941  | 207.73   | 11,339  | 206.76   |
| 213               | Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16)<br>โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต   | รวม  | 55,155  | 581.22   | 56,719  | 573.30   |
|                   |  | ชาย  | 21,120  | 400.99   | 22,150  | 502.36   |
|                   |  | หญิง | 34,035  | 646.20   | 34,569  | 630.34   |
| 214               | Renal failure (N17-N19)<br>ไตวาย   | รวม  | 460,217 | 4,849.77 | 509,752 | 5,152.44 |
|                   |  | ชาย  | 218,318 | 4,145.03 | 242,820 | 5,507.14 |
|                   |  | หญิง | 241,899 | 4,592.75 | 266,932 | 4,867.28 |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|-------------------|---|------|---------|----------|---------|----------|
|                   |   |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 215               | Urolithiasis (N20-N23)<br>นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ  | รวม  | 26,274  | 276.88   | 27,421  | 277.16   |
|                   |   | ชาย  | 16,204  | 307.65   | 17,182  | 389.69   |
|                   |   | หญิง | 10,070  | 191.19   | 10,239  | 186.70   |
| 216               | Cystitis (N30)<br>กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  | รวม  | 13,033  | 137.34   | 12,727  | 128.64   |
|                   |   | ชาย  | 4,065   | 77.18    | 4,116   | 93.35    |
|                   |   | หญิง | 8,968   | 170.27   | 8,611   | 157.01   |
| 217               | Other diseases of the urinary system<br>(N25-N29, N31-N39)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ             | รวม  | 138,410 | 1,458.56 | 147,295 | 1,488.82 |
|                   |   | ชาย  | 54,985  | 1,043.96 | 59,659  | 1,353.06 |
|                   |   | หญิง | 83,425  | 1,583.93 | 87,636  | 1,597.97 |
| 218               | Hyperplasia of prostate (N40)ต่อมลูกหมากโต<br>จากการเพิ่มจำนวนเซลล์                                       | รวม  | 66,212  | 697.74   | 73,121  | 739.09   |
|                   |   | ชาย  | 66,212  | 1,257.12 | 73,121  | 1,658.38 |
|                   |   | หญิง | 0       | 0.00     | 0       | 0.00     |
| 219               | Other disorders of prostate (N41-N42)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก                                 | รวม  | 503     | 5.30     | 565     | 5.71     |
|                   |   | ชาย  | 503     | 9.55     | 565     | 12.81    |
|                   |   | หญิง | 0       | 0.00     | 0       | 0.00     |
| 220               | Hydrocele and spermatocele (N43)<br>ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ  | รวม  | 683     | 7.20     | 699     | 7.07     |
|                   |   | ชาย  | 683     | 12.97    | 699     | 15.85    |
|                   |   | หญิง | 0       | 0.00     | 0       | 0.00     |
| 221               | Redundant prepuce, phimosis and<br>paraphimosis (N47)<br>หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้ | รวม  | 821     | 8.65     | 825     | 8.34     |
|                   |   | ชาย  | 821     | 15.59    | 825     | 18.71    |
|                   |   | หญิง | 0       | 0.00     | 0       | 0.00     |
| 222               | Other disease of male genital organs<br>(N44-N46, N48-N51)<br>โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย             | รวม  | 3,138   | 33.07    | 3,233   | 32.68    |
|                   |   | ชาย  | 3,138   | 59.58    | 3,233   | 73.32    |
|                   |   | หญิง | 0       | 0.00     | 0       | 0.00     |
| 223               | Disorders of breast (N60-N64)<br>ความผิดปกติของเต้านม   | รวม  | 1,414   | 14.90    | 1,399   | 14.14    |
|                   |   | ชาย  | 245     | 4.65     | 186     | 4.22     |
|                   |   | หญิง | 1,169   | 22.19    | 1,213   | 22.12    |
| 224               | Salphingitis and oophoritis (N70)<br>ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ  | รวม  | 102     | 1.07     | 106     | 1.07     |
|                   |   | ชาย  | 0       | 0.00     | 0       | 0.00     |
|                   |   | หญิง | 102     | 1.94     | 106     | 1.93     |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558  |       | 2559  |       |
|-------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
|                   |  |      | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา |
| 225               | Inflammatory disease of cervix uteri (N72)<br>ปากมดลูกอักเสบ   | รวม  | 132   | 1.39  | 126   | 1.27  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 132   | 2.51  | 126   | 2.30  |
| 226               | Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77)<br>การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี                  | รวม  | 1,891 | 19.93 | 1,875 | 18.95 |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 1,891 | 35.90 | 1,875 | 34.19 |
| 227               | Endometriosis (N80)<br>เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่  | รวม  | 267   | 2.81  | 353   | 3.57  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 267   | 5.07  | 353   | 6.44  |
| 228               | Female genital prolapse (N81)<br>การหล่อนตัวออกมากของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี   | รวม  | 3,771 | 39.74 | 3,686 | 37.26 |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 3,771 | 71.60 | 3,686 | 67.21 |
| 229               | Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83)<br>ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่ | รวม  | 817   | 8.61  | 901   | 9.11  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 817   | 15.51 | 901   | 16.43 |
| 230               | Disorder of menstruation (N91-N92)<br>ความผิดปกติของประจำเดือน   | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 231               | Menopausal and other perimenopausal disorders (N95)<br>การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะ                                    | รวม  | 1,677 | 17.67 | 1,705 | 17.23 |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 1,677 | 31.84 | 1,705 | 31.09 |
| 232               | Female infertility (N97)<br>ภาวะมีบุตรยากในสตรี  | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 233               | Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ | รวม  | 2,608 | 27.48 | 2,828 | 28.58 |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 2,608 | 49.52 | 2,828 | 51.57 |
| 234               | Spontaneous abortion (O03)<br>แท้งเอง  | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558  |       | 2559  |       |
|-------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
|                   |  |      | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา |
| 235               | Medical abortion (O04)<br>การทำแท้งโดยแพทย์ทางการแพทย์   | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 236               | Other pregnancies with abortive outcome<br>(O00-O02, O05-O08)<br>การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการทำแท้ง                                 | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 237               | Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16)                                       | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 238               | Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกເກະຕຳ ຮກລອກຕັກ່ອນກຳຫົດ ແລະ ຕກເລືອດກ່ອນຄລອດ       | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 239               | Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48)                                 | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 240               | Obstructed labour (O64-O66)<br>การคลอดติดขัด   | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 241               | Postpartum haemorrhage (O72)<br>ຕກເລືອດຫລັງຄລອດ  | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 242               | Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ຝາວະແທຮກໜອນອື່ນ ພຂອງການ<br>ຕັ້ງຄຽງ ແລະ ການຄລອດ | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558  |       | 2559  |       |
|-------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
|                   |  |      | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา |
| 243               | Single spontaneous delivery (O80)<br>การคลอดของครรภ์เดียว  | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 244               | Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified (O85-O99)<br>ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบร่วมกับหลังคลอด และ   | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 245               | Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และ<br>แรกรเกิดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรก<br>ในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด         | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 246               | Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตชา ทารก<br>ในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการ<br>ตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 247               | Birth trauma (P10-P15)<br>บาดเจ็บจากการคลอด  | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 248               | Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และ<br>ภาวะแօสฟิกเชียเมื่อแรกรเกิด   | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 249               | Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28)<br>ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด  | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 250               | Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37)<br>การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปราระสิต   | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558  |       | 2559  |       |
|-------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
|                   |  |      | จำนวน | อัตรา | จำนวน | อัตรา |
| 251               | Other infections specific to the perinatal period (P38-P39)<br><br>การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด                    | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 252               | Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)<br><br>โรคเม็ดเลือดแตกของทารกในครรภ์และแรกเกิด                                 | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 253               | Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96)<br><br>ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด          | รวม  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | ชาย  | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |
| 254               | Spina bifida (Q05)<br><br>กระดูกสันหลังแยก   | รวม  | 5     | 0.05  | 8     | 0.08  |
|                   |  | ชาย  | 4     | 0.08  | 3     | 0.07  |
|                   |  | หญิง | 1     | 0.02  | 5     | 0.09  |
| 255               | Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07)<br><br>ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท      | รวม  | 56    | 0.59  | 52    | 0.53  |
|                   |  | ชาย  | 28    | 0.53  | 33    | 0.75  |
|                   |  | หญิง | 28    | 0.53  | 19    | 0.35  |
| 256               | Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28)<br><br>ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบหลอดเลือด                      | รวม  | 1,234 | 13.00 | 1,249 | 12.62 |
|                   |  | ชาย  | 430   | 8.16  | 506   | 11.48 |
|                   |  | หญิง | 804   | 15.26 | 743   | 13.55 |
| 257               | Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)<br><br>ปากแหว่งและเพดานโหว่   | รวม  | 13    | 0.14  | 15    | 0.15  |
|                   |  | ชาย  | 6     | 0.11  | 8     | 0.18  |
|                   |  | หญิง | 7     | 0.13  | 7     | 0.13  |
| 258               | Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41)<br><br>ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ                                       | รวม  | 5     | 0.05  | 1     | 0.01  |
|                   |  | ชาย  | 5     | 0.09  | 0     | 0.00  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 1     | 0.02  |
| 259               | Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45)<br><br>ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร | รวม  | 162   | 1.71  | 192   | 1.94  |
|                   |  | ชาย  | 80    | 1.52  | 101   | 2.29  |
|                   |  | หญิง | 82    | 1.56  | 91    | 1.66  |
| 260               | Undescended testicle (Q53)<br><br>อัณฑะไม่ลงถุง  | รวม  | 26    | 0.27  | 45    | 0.45  |
|                   |  | ชาย  | 26    | 0.49  | 45    | 1.02  |
|                   |  | หญิง | 0     | 0.00  | 0     | 0.00  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |  |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 261               | Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ<br>ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ | รวม  | 435    | 4.58   | 499    | 5.04   |
|                   |  | ชาย  | 205    | 3.89   | 237    | 5.38   |
|                   |  | หญิง | 230    | 4.37   | 262    | 4.78   |
| 262               | Congenital deformities of hip (Q65)<br>ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก  | รวม  | 19     | 0.20   | 16     | 0.16   |
|                   |  | ชาย  | 4      | 0.08   | 3      | 0.07   |
|                   |  | หญิง | 15     | 0.28   | 13     | 0.24   |
| 263               | Congenital deformities of feet (Q66)<br>ความพิการแต่กำเนิดของเท้า  | รวม  | 9      | 0.09   | 11     | 0.11   |
|                   |  | ชาย  | 7      | 0.13   | 2      | 0.05   |
|                   |  | หญิง | 2      | 0.04   | 9      | 0.16   |
| 264               | Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79)                                      | รวม  | 67     | 0.71   | 76     | 0.77   |
|                   |  | ชาย  | 21     | 0.40   | 27     | 0.61   |
|                   |  | หญิง | 46     | 0.87   | 49     | 0.89   |
| 265               | Other congenital malformations (Q10-Q18,<br>Q30-Q34, Q80-Q89)<br>ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ                                  | รวม  | 379    | 3.99   | 353    | 3.57   |
|                   |  | ชาย  | 181    | 3.44   | 182    | 4.13   |
|                   |  | หญิง | 198    | 3.76   | 171    | 3.12   |
| 266               | Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99)<br>ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น         | รวม  | 28     | 0.30   | 43     | 0.43   |
|                   |  | ชาย  | 11     | 0.21   | 27     | 0.61   |
|                   |  | หญิง | 17     | 0.32   | 16     | 0.29   |
| 267               | Abdominal and pelvic pain (R10)<br>ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน   | รวม  | 7,447  | 78.48  | 7,520  | 76.01  |
|                   |  | ชาย  | 3,243  | 61.57  | 3,334  | 75.61  |
|                   |  | หญิง | 4,204  | 79.82  | 4,186  | 76.33  |
| 268               | Fever of unknown origin (R50)<br>ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  | รวม  | 29,644 | 312.39 | 34,724 | 350.98 |
|                   |  | ชาย  | 13,624 | 258.67 | 16,189 | 367.17 |
|                   |  | หญิง | 16,020 | 304.16 | 18,535 | 337.97 |
| 269               | Senility (R54)<br>ชราภาพ   | รวม  | 3,543  | 37.34  | 2,139  | 21.62  |
|                   |  | ชาย  | 1,425  | 27.06  | 864    | 19.60  |
|                   |  | หญิง | 2,118  | 40.21  | 1,275  | 23.25  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558- 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ                | 2558                          |                                  | 2559                          |                                  |
|-------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                   |  |                    | จำนวน                         | อัตรา                            | จำนวน                         | อัตรา                            |
| 270               | Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อากาศแสดงและสิ่งพิเศษปกติที่พบจากการตรวจทางคลีนิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 366,612<br>175,440<br>191,172 | 3,863.36<br>3,330.94<br>3,629.63 | 378,230<br>181,896<br>196,334 | 3,823.05<br>4,125.39<br>3,579.98 |
| 271               | Fracture of skull and facial bones (S02) กระดูกแตกหักบริเวณกระโหลกศีรษะและกระดูกหน้า   | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 3,331<br>2,329<br>1,002       | 35.10<br>44.22<br>19.02          | 3,748<br>2,632<br>1,116       | 37.88<br>59.69<br>20.35          |
| 272               | Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08)<br>กระดูกคอ กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว   | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 10,044<br>5,151<br>4,893      | 105.84<br>97.80<br>92.90         | 10,791<br>5,628<br>5,163      | 109.07<br>127.64<br>94.14        |
| 273               | Fracture of femur (S72)<br>กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว   | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 22,959<br>6,316<br>16,643     | 241.94<br>119.92<br>315.99       | 24,889<br>6,844<br>18,045     | 251.57<br>155.22<br>329.04       |
| 274               | Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12)<br>กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ   | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 22,900<br>10,488<br>12,412    | 241.32<br>199.13<br>235.66       | 24,646<br>11,120<br>13,526    | 249.12<br>252.20<br>246.63       |
| 275               | Fracture involving multiple body regions (T02)<br>กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 14<br>7<br>7                  | 0.15<br>0.13<br>0.13             | 18<br>5<br>13                 | 0.18<br>0.11<br>0.24             |
| 276               | Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03)<br>เคลื่อน เคลือด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ                           | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 3,978<br>1,861<br>2,117       | 41.92<br>35.33<br>40.19          | 4,205<br>1,994<br>2,211       | 42.50<br>45.22<br>40.32          |
| 277               | Injury of eye and orbit (S05)<br>การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 2,192<br>1,447<br>745         | 23.10<br>27.47<br>14.14          | 2,225<br>1,441<br>784         | 22.49<br>32.68<br>14.30          |
| 278               | Intracranial injury (S06)<br>การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ   | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 17,978<br>10,823<br>7,155     | 189.45<br>205.49<br>135.85       | 21,233<br>12,388<br>8,845     | 214.62<br>280.96<br>161.28       |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558 - 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |  |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 279               | Injury of other internal organs (S26-S27,<br>S36-S37)<br>การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ  | รวม  | 4,087  | 43.07  | 4,374  | 44.21  |
|                   |  | ชาย  | 3,173  | 60.24  | 3,499  | 79.36  |
|                   |  | หญิง | 914    | 17.35  | 875    | 15.95  |
| 280               | Crushing injuries and traumatic amputations<br>of specified and multiple body regions<br>(S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48,<br>S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98,<br>T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการ<br>บาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุ   | รวม  | 1,075  | 11.33  | 1,094  | 11.06  |
|                   |  | ชาย  | 825    | 15.66  | 845    | 19.16  |
|                   |  | หญิง | 250    | 4.75   | 249    | 4.54   |
| 281               | Other injuries of specified, unspecified and<br>multiple body regions (S00-S01, S04,<br>S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31,<br>S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51,<br>S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76,<br>S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99,<br>T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14 ) การ<br>บาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย | รวม  | 36,718 | 386.93 | 40,166 | 405.99 |
|                   |  | ชาย  | 21,446 | 407.18 | 23,328 | 529.08 |
|                   |  | หญิง | 15,272 | 289.96 | 16,838 | 307.03 |
| 282               | Effects of foreign body entering through<br>natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแผลกล่อง<br>ผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย  | รวม  | 1,179  | 12.42  | 1,146  | 11.58  |
|                   |  | ชาย  | 628    | 11.92  | 622    | 14.11  |
|                   |  | หญิง | 551    | 10.46  | 524    | 9.55   |
| 283               | Burns and corrosions (T20-T32)<br>แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน  | รวม  | 3,348  | 35.28  | 3,690  | 37.30  |
|                   |  | ชาย  | 1,767  | 33.55  | 1,845  | 41.84  |
|                   |  | หญิง | 1,581  | 30.02  | 1,845  | 33.64  |
| 284               | Poisoing by drugs and biological substances<br>(T36-T50)<br>การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและชีววัตถุ   | รวม  | 8,836  | 93.11  | 8,497  | 85.89  |
|                   |  | ชาย  | 3,779  | 71.75  | 3,619  | 82.08  |
|                   |  | หญิง | 5,057  | 96.01  | 4,878  | 88.95  |
| 285               | Toxic effects of substances chiefly<br>nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็น<br>พิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา   | รวม  | 8,468  | 89.24  | 8,374  | 84.64  |
|                   |  | ชาย  | 4,329  | 82.19  | 4,188  | 94.98  |
|                   |  | หญิง | 4,139  | 78.58  | 4,186  | 76.33  |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกรายวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558 - 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|-------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|                   |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 286               | Maltreatment syndromes (T74)<br>กลุ่มอาการจากการทารุณ   | รวม  | 16     | 0.17   | 18     | 0.18   |
|                   |   | ชาย  | 3      | 0.06   | 8      | 0.18   |
|                   |   | หญิง | 13     | 0.25   | 10     | 0.18   |
| 287               | Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78)<br>อื่น ๆ และที่ไม่ได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก  | รวม  | 4,319  | 45.51  | 4,732  | 47.83  |
|                   |   | ชาย  | 1,930  | 36.64  | 2,227  | 50.51  |
|                   |   | หญิง | 2,389  | 45.36  | 2,505  | 45.68  |
| 288               | Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified (T79-T88)<br>ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น | รวม  | 56,865 | 599.24 | 61,525 | 621.88 |
|                   |   | ชาย  | 29,444 | 559.03 | 31,747 | 720.02 |
|                   |   | หญิง | 27,421 | 520.62 | 29,778 | 542.98 |
| 289               | Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลกระทบล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาจากการบาดเจ็บ   | รวม  | 614    | 6.47   | 618    | 6.25   |
|                   |   | ชาย  | 335    | 6.36   | 372    | 8.44   |
|                   |   | หญิง | 279    | 5.30   | 246    | 4.49   |
| 290               | Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13)<br>บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร  | รวม  | 14,947 | 157.51 | 14,941 | 151.02 |
|                   |   | ชาย  | 6,383  | 121.19 | 5,909  | 134.02 |
|                   |   | หญิง | 8,564  | 162.60 | 9,032  | 164.69 |
| 291               | Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21)<br>การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ   | รวม  | 175    | 1.84   | 223    | 2.25   |
|                   |   | ชาย  | 101    | 1.92   | 129    | 2.93   |
|                   |   | หญิง | 74     | 1.40   | 94     | 1.71   |
| 292               | Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ  | รวม  | 607    | 6.40   | 624    | 6.31   |
|                   |   | ชาย  | 306    | 5.81   | 325    | 7.37   |
|                   |   | หญิง | 301    | 5.71   | 299    | 5.45   |
| 293               | Contraceptive management (Z30)<br>การรับบริการคุมกำเนิด   | รวม  | 86     | 0.91   | 66     | 0.67   |
|                   |   | ชาย  | 20     | 0.38   | 2      | 0.05   |
|                   |   | หญิง | 66     | 1.25   | 64     | 1.17   |

ตารางที่ 22 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ.2558 - 2559 (ต่อ)

| รหัส/<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย(โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ                | 2558                        |                                  | 2559                        |                                  |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                   |   |                    | จำนวน                       | อัตรา                            | จำนวน                       | อัตรา                            |
| 294               | Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ                            | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 0<br>0<br>0                 | 0.00<br>0.00<br>0.00             | 0<br>0<br>0                 | 0.00<br>0.00<br>0.00             |
| 295               | Liveborn infants according to place of birth (Z38)<br>การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 0<br>0<br>0                 | 0.00<br>0.00<br>0.00             | 0<br>0<br>0                 | 0.00<br>0.00<br>0.00             |
| 296               | Postpartum care and examination (Z39)<br>การดูแลและการตรวจหลังคลอด  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 0<br>0<br>0                 | 0.00<br>0.00<br>0.00             | 0<br>0<br>0                 | 0.00<br>0.00<br>0.00             |
| 297               | Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 137,260<br>69,382<br>67,878 | 1,446.45<br>1,317.30<br>1,288.75 | 155,764<br>78,505<br>77,259 | 1,574.42<br>1,780.49<br>1,408.75 |
| 298               | Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99)<br>บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 49,521<br>27,308<br>22,213  | 521.85<br>518.48<br>421.74       | 61,068<br>33,543<br>27,525  | 617.26<br>760.75<br>501.89       |

รวมรวม/วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว กรมบัญชีกลาง โดยสำนักงานกองลางสาธารณสุขบริการสุขภาพ(สกส.)

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558       |           | 2559       |           |
|---------------|---|------|------------|-----------|------------|-----------|
|               |   |      | จำนวน      | อัตรา     | จำนวน      | อัตรา     |
|               |   | รวม  | 19,126,383 | 29,412.81 | 19,740,850 | 30,364.23 |
|               | รวมทุกกลุ่มโรค  | ชาย  | 9,002,420  | 28,192.39 | 9,356,225  | 29,334.94 |
|               |   | หญิง | 10,123,963 | 30,590.33 | 10,384,625 | 31,355.48 |
| 001           | Cholera (A00)<br>อหิวาตกโรค   | รวม  | 160        | 0.25      | 142        | 0.22      |
|               |   | ชาย  | 81         | 0.25      | 81         | 0.25      |
|               |   | หญิง | 79         | 0.24      | 61         | 0.18      |
| 002           | Typhoid and paratyphoid fever (A01)<br>ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม   | รวม  | 4,147      | 6.38      | 4,169      | 6.41      |
|               |   | ชาย  | 2,133      | 6.68      | 2,199      | 6.89      |
|               |   | หญิง | 2,014      | 6.09      | 1,970      | 5.95      |
| 003           | Shigellosis (A03)<br>โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา  | รวม  | 142        | 0.22      | 181        | 0.28      |
|               |   | ชาย  | 63         | 0.20      | 90         | 0.28      |
|               |   | หญิง | 79         | 0.24      | 91         | 0.27      |
| 004           | Amoebiasis (A06)<br>โรคบิดมีตัว   | รวม  | 3,469      | 5.33      | 3,730      | 5.74      |
|               |   | ชาย  | 1,659      | 5.20      | 1,678      | 5.26      |
|               |   | หญิง | 1,810      | 5.47      | 2,052      | 6.20      |
| 005           | Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09)<br>อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ | รวม  | 401,511    | 617.45    | 446,664    | 687.03    |
|               |   | ชาย  | 185,876    | 582.10    | 207,392    | 650.24    |
|               |   | หญิง | 215,635    | 651.56    | 239,272    | 722.46    |
| 006           | Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08)<br>โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ  | รวม  | 56,963     | 87.60     | 64,624     | 99.40     |
|               |   | ชาย  | 27,109     | 84.90     | 31,304     | 98.15     |
|               |   | หญิง | 29,854     | 90.21     | 33,320     | 100.61    |
| 007           | Respiratory tuberculosis (A15-A16)<br>วัณโรคทางเดินหายใจ  | รวม  | 69,521     | 106.91    | 70,132     | 107.87    |
|               |   | ชาย  | 47,988     | 150.28    | 48,846     | 153.15    |
|               |   | หญิง | 21,533     | 65.06     | 21,286     | 64.27     |
| 008           | Other Tuberculosis (A17-A19)<br>วัณโรคอื่น ๆ  | รวม  | 17,701     | 27.22     | 17,737     | 27.28     |
|               |   | ชาย  | 10,937     | 34.25     | 10,888     | 34.14     |
|               |   | หญิง | 6,764      | 20.44     | 6,849      | 20.68     |
| 009           | Plaque (A20)<br>กาฬโรค  | รวม  | 0          | 0.00      | 0          | 0.00      |
|               |   | ชาย  | 0          | 0.00      | 0          | 0.00      |
|               |   | หญิง | 0          | 0.00      | 0          | 0.00      |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 010           | Brucellosis (A23)<br>โรคติดเชื้อปรสูชลลา   | รวม  | 17      | 0.03   | 14      | 0.02   |
|               |  | ชาย  | 9       | 0.03   | 10      | 0.03   |
|               |  | หญิง | 8       | 0.02   | 4       | 0.01   |
| 011           | Leprosy (A30)<br>โรคเรือน  | รวม  | 486     | 0.75   | 436     | 0.67   |
|               |  | ชาย  | 316     | 0.99   | 264     | 0.83   |
|               |  | หญิง | 170     | 0.51   | 172     | 0.52   |
| 012           | Tetanus neonatorum (A33)<br>บาดทะยักในเด็กแรกเกิด  | รวม  | 2       | 0.00   | 1       | 0.00   |
|               |  | ชาย  | 1       | 0.00   | 1       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 1       | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 013           | Other tetanus (A34-A35)<br>บาดทะยักอื่น ๆ  | รวม  | 227     | 0.35   | 231     | 0.36   |
|               |  | ชาย  | 148     | 0.46   | 148     | 0.46   |
|               |  | หญิง | 79      | 0.24   | 83      | 0.25   |
| 014           | Diphtheria (A36)<br>โรคคอตีบ   | รวม  | 80      | 0.12   | 66      | 0.10   |
|               |  | ชาย  | 43      | 0.13   | 32      | 0.10   |
|               |  | หญิง | 37      | 0.11   | 34      | 0.10   |
| 015           | Whooping cough (A37)<br>โรคไอกรน   | รวม  | 59      | 0.09   | 76      | 0.12   |
|               |  | ชาย  | 24      | 0.08   | 31      | 0.10   |
|               |  | หญิง | 35      | 0.11   | 45      | 0.14   |
| 016           | Meningococcal infection (A39)<br>การติดเชื้อเมนingoค็อกค็อกซ์                                | รวม  | 146     | 0.22   | 109     | 0.17   |
|               |  | ชาย  | 90      | 0.28   | 65      | 0.20   |
|               |  | หญิง | 56      | 0.17   | 44      | 0.13   |
| 017           | Septicemia (A40-A41)<br>โคลิทเป็นพิษ   | รวม  | 135,253 | 207.99 | 140,825 | 216.61 |
|               |  | ชาย  | 68,657  | 215.01 | 72,113  | 226.10 |
|               |  | หญิง | 66,596  | 201.22 | 68,712  | 207.47 |
| 018           | Other bacterial diseases ( A21-A22, A24-A28,A31-A32, A38, A42-A49 )<br>โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ | รวม  | 57,035  | 87.71  | 58,920  | 90.63  |
|               |  | ชาย  | 32,651  | 102.25 | 33,754  | 105.83 |
|               |  | หญิง | 24,384  | 73.68  | 25,166  | 75.99  |
| 019           | Congenital syphilis (A50)<br>ชิพิลิสแต่กำเนิด  | รวม  | 416     | 0.64   | 590     | 0.91   |
|               |  | ชาย  | 219     | 0.69   | 327     | 1.03   |
|               |  | หญิง | 197     | 0.60   | 263     | 0.79   |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |       | 2559   |       |
|------------------|---|------|--------|-------|--------|-------|
|                  |   |      | จำนวน  | อัตรา | จำนวน  | อัตรา |
| 020              | Early syphilis (A51)<br>ชิพิลิสรายเริ่ม   | รวม  | 211    | 0.32  | 221    | 0.34  |
|                  |   | ชาย  | 141    | 0.44  | 148    | 0.46  |
|                  |   | หญิง | 70     | 0.21  | 73     | 0.22  |
| 021              | Other syphilis (A52-A53)<br>ชิพิลิสอื่น ๆ   | รวม  | 2,000  | 3.08  | 2,376  | 3.65  |
|                  |   | ชาย  | 1,199  | 3.75  | 1,289  | 4.04  |
|                  |   | หญิง | 801    | 2.42  | 1,087  | 3.28  |
| 022              | Gonococcal infection (A54)<br>การติดเชื้อหนองใน   | รวม  | 378    | 0.58  | 405    | 0.62  |
|                  |   | ชาย  | 252    | 0.79  | 275    | 0.86  |
|                  |   | หญิง | 126    | 0.38  | 130    | 0.39  |
| 023              | Sexually transmitted chlamydial diseases<br>(A55-A56)<br>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลາมายเดีย                                  | รวม  | 54     | 0.08  | 44     | 0.07  |
|                  |   | ชาย  | 26     | 0.08  | 28     | 0.09  |
|                  |   | หญิง | 28     | 0.08  | 16     | 0.05  |
| 024              | Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64)<br>โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนมาก | รวม  | 2,597  | 3.99  | 2,622  | 4.03  |
|                  |   | ชาย  | 688    | 2.15  | 684    | 2.14  |
|                  |   | หญิง | 1,909  | 5.77  | 1,938  | 5.85  |
| 025              | Relapsing fever (A68)<br>โรคไข้กลับซ้ำ  | รวม  | 6      | 0.01  | 5      | 0.01  |
|                  |   | ชาย  | 3      | 0.01  | 3      | 0.01  |
|                  |   | หญิง | 3      | 0.01  | 2      | 0.01  |
| 026              | Trachoma (A71)<br>ริดสีดวงตา  | รวม  | 8      | 0.01  | 4      | 0.01  |
|                  |   | ชาย  | 7      | 0.02  | 2      | 0.01  |
|                  |   | หญิง | 1      | 0.00  | 2      | 0.01  |
| 027              | Typhus fever (A75)<br>ไข้รากสาดใหญ่   | รวม  | 14,146 | 21.75 | 11,548 | 17.76 |
|                  |   | ชาย  | 7,953  | 24.91 | 6,431  | 20.16 |
|                  |   | หญิง | 6,193  | 18.71 | 5,117  | 15.45 |
| 028              | Acute poliomyelitis (A80)<br>โรคโปลิโอเนียบพลัน   | รวม  | 224    | 0.34  | 268    | 0.41  |
|                  |   | ชาย  | 136    | 0.43  | 135    | 0.42  |
|                  |   | หญิง | 88     | 0.27  | 133    | 0.40  |
| 029              | Rabies (A82)<br>โรคพิษสุนัขบ้า  | รวม  | 5      | 0.01  | 12     | 0.02  |
|                  |   | ชาย  | 4      | 0.01  | 9      | 0.03  |
|                  |   | หญิง | 1      | 0.00  | 3      | 0.01  |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|---|------|---------|--------|---------|--------|
|               |   |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 030           | Viral encephalitis (A83-A86)<br>สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส   | รวม  | 788     | 1.21   | 796     | 1.22   |
|               |   | ชาย  | 425     | 1.33   | 441     | 1.38   |
|               |   | หญิง | 363     | 1.10   | 355     | 1.07   |
| 031           | Yellow fever (A95)<br>ไข้เหลือง   | รวม  | 1       | 0.00   | 8       | 0.01   |
|               |   | ชาย  | 1       | 0.00   | 3       | 0.01   |
|               |   | หญิง | 0       | 0.00   | 5       | 0.02   |
| 032           | Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99)<br>ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ | รวม  | 173,897 | 267.42 | 105,126 | 161.70 |
|               |   | ชาย  | 86,370  | 270.48 | 52,682  | 165.18 |
|               |   | หญิง | 87,527  | 264.47 | 52,444  | 158.35 |
| 033           | Herpesviral infection (B00)<br>เริม   | รวม  | 5,634   | 8.66   | 5,900   | 9.08   |
|               |   | ชาย  | 2,582   | 8.09   | 2,702   | 8.47   |
|               |   | หญิง | 3,052   | 9.22   | 3,198   | 9.66   |
| 034           | Varicella and zoster (B01-B02)<br>อีสุกอีสิและงูสวัสดิ์   | รวม  | 10,735  | 16.51  | 10,594  | 16.30  |
|               |   | ชาย  | 5,128   | 16.06  | 4,981   | 15.62  |
|               |   | หญิง | 5,607   | 16.94  | 5,613   | 16.95  |
| 035           | Measles (B05)<br>หัด  | รวม  | 366     | 0.56   | 2,668   | 4.10   |
|               |   | ชาย  | 203     | 0.64   | 1,423   | 4.46   |
|               |   | หญิง | 163     | 0.49   | 1,245   | 3.76   |
| 036           | Rubella (B06)<br>หัดเยอรมัน   | รวม  | 46      | 0.07   | 45      | 0.07   |
|               |   | ชาย  | 22      | 0.07   | 27      | 0.08   |
|               |   | หญิง | 24      | 0.07   | 18      | 0.05   |
| 037           | Acute hepatitis B (B16)<br>ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี   | รวม  | 6,136   | 9.44   | 6,274   | 9.65   |
|               |   | ชาย  | 3,962   | 12.41  | 4,100   | 12.85  |
|               |   | หญิง | 2,174   | 6.57   | 2,174   | 6.56   |
| 038           | Other viral hepatitis (B15, B17-B19)<br>ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ   | รวม  | 45,607  | 70.14  | 48,633  | 74.80  |
|               |   | ชาย  | 30,508  | 95.54  | 32,946  | 103.30 |
|               |   | หญิง | 15,099  | 45.62  | 15,687  | 47.37  |
| 039           | Human immunodeficiency virus [HIV] disease<br>(B20-B24)<br>ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)   | รวม  | 70,847  | 108.95 | 69,257  | 106.53 |
|               |   | ชาย  | 40,927  | 128.17 | 39,967  | 125.31 |
|               |   | หญิง | 29,920  | 90.41  | 29,290  | 88.44  |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |       | 2559   |       |
|------------------|--|------|--------|-------|--------|-------|
|                  |  |      | จำนวน  | อัตรา | จำนวน  | อัตรา |
| 040              | Mumps (B26)<br>คางทูม  | รวม  | 168    | 0.26  | 149    | 0.23  |
|                  |  | ชาย  | 101    | 0.32  | 85     | 0.27  |
|                  |  | หญิง | 67     | 0.20  | 64     | 0.19  |
| 041              | Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04,<br>B07-B09, B25, B27-B34 )<br>โรคจากไวรัสอื่น | รวม  | 48,921 | 75.23 | 56,487 | 86.89 |
|                  |  | ชาย  | 25,223 | 78.99 | 30,295 | 94.99 |
|                  |  | หญิง | 23,698 | 71.61 | 26,192 | 79.08 |
| 042              | Mycoses (B35-B49)<br>โรคติดเชื้อราก  | รวม  | 27,745 | 42.67 | 27,819 | 42.79 |
|                  |  | ชาย  | 15,429 | 48.32 | 15,221 | 47.72 |
|                  |  | หญิง | 12,316 | 37.21 | 12,598 | 38.04 |
| 043              | Malaria (B50-B54)<br>มาลาเรีย  | รวม  | 4,170  | 6.41  | 3,436  | 5.29  |
|                  |  | ชาย  | 3,187  | 9.98  | 2,159  | 6.77  |
|                  |  | หญิง | 983    | 2.97  | 1,277  | 3.86  |
| 044              | Leishmaniasis (B55)<br>โรคลิชمانาเนีย  | รวม  | 27     | 0.04  | 35     | 0.05  |
|                  |  | ชาย  | 27     | 0.08  | 35     | 0.11  |
|                  |  | หญิง | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
| 045              | Trypanosomiasis (B56-B57)<br>โรคทริปานโซซิเม   | รวม  | 35     | 0.05  | 36     | 0.06  |
|                  |  | ชาย  | 18     | 0.06  | 14     | 0.04  |
|                  |  | หญิง | 17     | 0.05  | 22     | 0.07  |
| 046              | Schistosomiasis (B65)<br>โรคติดเชื้อซิสโตโซม   | รวม  | 21     | 0.03  | 12     | 0.02  |
|                  |  | ชาย  | 12     | 0.04  | 9      | 0.03  |
|                  |  | หญิง | 9      | 0.03  | 3      | 0.01  |
| 047              | Other fluke infections (B66)<br>โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ  | รวม  | 717    | 1.10  | 713    | 1.10  |
|                  |  | ชาย  | 398    | 1.25  | 405    | 1.27  |
|                  |  | หญิง | 319    | 0.96  | 308    | 0.93  |
| 048              | Echinococcosis (B67)<br>โรคพยาธิเอโคคีโนคอคคัส   | รวม  | 19     | 0.03  | 17     | 0.03  |
|                  |  | ชาย  | 12     | 0.04  | 10     | 0.03  |
|                  |  | หญิง | 7      | 0.02  | 7      | 0.02  |
| 049              | Dracunculiasis (B72)<br>โรคพยาธิตราคันคูลัส  | รวม  | 0      | 0.00  | 1      | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 1      | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |       | 2559   |       |
|------------------|--|------|--------|-------|--------|-------|
|                  |  |      | จำนวน  | อัตรา | จำนวน  | อัตรา |
| 050              | Onchocerciasis (B73)<br>โรคพยาธิอนโคเซอร์คा  | รวม  | 2      | 0.00  | 2      | 0.00  |
|                  |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|                  |  | หญิง | 2      | 0.01  | 2      | 0.01  |
| 051              | Filariasis (B74)<br>โรคพยาธิฟิลาเรีย   | รวม  | 31     | 0.05  | 36     | 0.06  |
|                  |  | ชาย  | 16     | 0.05  | 24     | 0.08  |
|                  |  | หญิง | 15     | 0.05  | 12     | 0.04  |
| 052              | Hookworm diseases (B76)<br>โรคพยาธิปากขอ   | รวม  | 532    | 0.82  | 499    | 0.77  |
|                  |  | ชาย  | 261    | 0.82  | 254    | 0.80  |
|                  |  | หญิง | 271    | 0.82  | 245    | 0.74  |
| 053              | Other helminthiases (B68-B71, B75, B77-B83)<br>โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ  | รวม  | 8,379  | 12.89 | 7,968  | 12.26 |
|                  |  | ชาย  | 5,379  | 16.85 | 5,194  | 16.28 |
|                  |  | หญิง | 3,000  | 9.06  | 2,774  | 8.38  |
| 054              | Sequelae of tuberculosis (B90)<br>ผลตามหลังวันโรค  | รวม  | 25,337 | 38.96 | 27,126 | 41.72 |
|                  |  | ชาย  | 16,702 | 52.30 | 18,201 | 57.07 |
|                  |  | หญิง | 8,635  | 26.09 | 8,925  | 26.95 |
| 055              | Sequelae of poliomyelitis (B91)<br>ผลตามหลังโรคโอลิโอลิโอ  | รวม  | 81     | 0.12  | 79     | 0.12  |
|                  |  | ชาย  | 42     | 0.13  | 46     | 0.14  |
|                  |  | หญิง | 39     | 0.12  | 33     | 0.10  |
| 056              | Sequelae of leprosy (B92)<br>ผลตามหลังโรคเรือน   | รวม  | 54     | 0.08  | 52     | 0.08  |
|                  |  | ชาย  | 34     | 0.11  | 30     | 0.09  |
|                  |  | หญิง | 20     | 0.06  | 22     | 0.07  |
| 057              | Other infectious and parasitic diseases<br>(A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64,<br>B85-B89, B94, B99) | รวม  | 11,521 | 17.72 | 10,991 | 16.91 |
|                  |  | ชาย  | 6,598  | 20.66 | 6,195  | 19.42 |
|                  |  | หญิง | 4,923  | 14.88 | 4,796  | 14.48 |
| 058              | Malignant neoplasm of lip, oral cavity and<br>pharynx (C00-C14)<br>เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย | รวม  | 23,416 | 36.01 | 24,293 | 37.37 |
|                  |  | ชาย  | 16,687 | 52.26 | 17,487 | 54.83 |
|                  |  | หญิง | 6,729  | 20.33 | 6,806  | 20.55 |
| 059              | Malignant neoplasm of oesophagus (C15)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร   | รวม  | 9,095  | 13.99 | 9,641  | 14.83 |
|                  |  | ชาย  | 7,932  | 24.84 | 8,448  | 26.49 |
|                  |  | หญิง | 1,163  | 3.51  | 1,193  | 3.60  |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|---------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|               |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 060           | Malignant neoplasm of stomach (C16)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร  | รวม  | 10,499 | 16.15  | 11,270 | 17.33  |
|               |   | ชาย  | 6,105  | 19.12  | 6,305  | 19.77  |
|               |   | หญิง | 4,394  | 13.28  | 4,965  | 14.99  |
| 061           | Malignant neoplasm of colon (C18)<br>เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่   | รวม  | 49,655 | 76.36  | 54,274 | 83.48  |
|               |   | ชาย  | 25,828 | 80.88  | 27,855 | 87.33  |
|               |   | หญิง | 23,827 | 72.00  | 26,419 | 79.77  |
| 062           | Malignant neoplasm of recto sigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)<br>เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและซิกมอยด์ | รวม  | 34,135 | 52.49  | 37,664 | 57.93  |
|               |   | ชาย  | 19,755 | 61.87  | 21,838 | 68.47  |
|               |   | หญิง | 14,380 | 43.45  | 15,826 | 47.79  |
| 063           | Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ                                     | รวม  | 51,610 | 79.37  | 54,017 | 83.09  |
|               |   | ชาย  | 35,156 | 110.10 | 37,417 | 117.31 |
|               |   | หญิง | 16,454 | 49.72  | 16,600 | 50.12  |
| 064           | Malignant neoplasm of pancreas (C25)<br>เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน  | รวม  | 5,298  | 8.15   | 5,404  | 8.31   |
|               |   | ชาย  | 2,837  | 8.88   | 2,737  | 8.58   |
|               |   | หญิง | 2,461  | 7.44   | 2,667  | 8.05   |
| 065           | Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ                               | รวม  | 6,428  | 9.89   | 6,913  | 10.63  |
|               |   | ชาย  | 3,224  | 10.10  | 3,513  | 11.01  |
|               |   | หญิง | 3,204  | 9.68   | 3,400  | 10.27  |
| 066           | Malignant neoplasm of larynx (C32)<br>เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง   | รวม  | 4,801  | 7.38   | 5,096  | 7.84   |
|               |   | ชาย  | 4,465  | 13.98  | 4,715  | 14.78  |
|               |   | หญิง | 336    | 1.02   | 381    | 1.15   |
| 067           | Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34)<br>เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด                                       | รวม  | 41,444 | 63.73  | 42,067 | 64.71  |
|               |   | ชาย  | 26,131 | 81.83  | 26,100 | 81.83  |
|               |   | หญิง | 15,313 | 46.27  | 15,967 | 48.21  |
| 068           | Other malignant neoplasm of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39)<br>เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก        | รวม  | 2,374  | 3.65   | 2,616  | 4.02   |
|               |   | ชาย  | 1,545  | 4.84   | 1,717  | 5.38   |
|               |   | หญิง | 829    | 2.50   | 899    | 2.71   |
| 069           | Malignant neoplasm of bone and articular cartilage (C40-C41)<br>เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ                                | รวม  | 3,630  | 5.58   | 3,475  | 5.35   |
|               |   | ชาย  | 2,049  | 6.42   | 1,932  | 6.06   |
|               |   | หญิง | 1,581  | 4.78   | 1,543  | 4.66   |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|---------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|               |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 070           | Malignant melanoma of skin (C43)<br>เนื้องอกร้ายที่เมลาม่าของผิวนัง   | รวม  | 821    | 1.26   | 786    | 1.21   |
|               |   | ชาย  | 396    | 1.24   | 411    | 1.29   |
|               |   | หญิง | 425    | 1.28   | 375    | 1.13   |
| 071           | Other malignant neoplasm of skin (C44)<br>เนื้องอกร้ายที่ผิวนังอื่น ๆ   | รวม  | 2,693  | 4.14   | 2,709  | 4.17   |
|               |   | ชาย  | 1,344  | 4.21   | 1,356  | 4.25   |
|               |   | หญิง | 1,349  | 4.08   | 1,353  | 4.09   |
| 072           | Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49)<br>เนื้องอกร้ายที่เมโซ塞เรียลและเนื้อเยื่ออ่อน             | รวม  | 4,783  | 7.36   | 5,217  | 8.02   |
|               |   | ชาย  | 1,990  | 6.23   | 2,333  | 7.31   |
|               |   | หญิง | 2,793  | 8.44   | 2,884  | 8.71   |
| 073           | Malignant neoplasm of breast (C50)<br>เนื้องอกร้ายที่เต้านม   | รวม  | 41,612 | 63.99  | 43,801 | 67.37  |
|               |   | ชาย  | 416    | 1.30   | 385    | 1.21   |
|               |   | หญิง | 41,196 | 124.48 | 43,416 | 131.09 |
| 074           | Malignant neoplasm of cervix uteri (C53)<br>เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก   | รวม  | 23,688 | 71.58  | 24,147 | 72.91  |
|               |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|               |   | หญิง | 23,688 | 71.58  | 24,147 | 72.91  |
| 075           | Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุส่วนของมดลูก | รวม  | 8,907  | 26.91  | 10,292 | 31.08  |
|               |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|               |   | หญิง | 8,907  | 26.91  | 10,292 | 31.08  |
| 076           | Other malignant neoplasm of female genital organs (C51-C52, C56-C58)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสีบพันธุ์หญิง            | รวม  | 19,166 | 57.91  | 19,704 | 59.49  |
|               |   | ชาย  | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
|               |   | หญิง | 19,166 | 57.91  | 19,704 | 59.49  |
| 077           | Malignant neoplasm of prostate (C61)<br>เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก  | รวม  | 9,304  | 29.14  | 9,934  | 31.15  |
|               |   | ชาย  | 9,304  | 29.14  | 9,934  | 31.15  |
|               |   | หญิง | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
| 078           | Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63)<br>เนื้องอกร้ายของอวัยวะสีบพันธุ์ชาย                  | รวม  | 2,145  | 6.72   | 2,373  | 7.44   |
|               |   | ชาย  | 2,145  | 6.72   | 2,373  | 7.44   |
|               |   | หญิง | 0      | 0.00   | 0      | 0.00   |
| 079           | Malignant neoplasm of bladder (C67)<br>เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ  | รวม  | 10,585 | 16.28  | 11,054 | 17.00  |
|               |   | ชาย  | 8,240  | 25.80  | 8,710  | 27.31  |
|               |   | หญิง | 2,345  | 7.09   | 2,344  | 7.08   |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 080           | Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ   | รวม  | 3,533   | 5.43   | 3,667   | 5.64   |
|               |  | ชาย  | 2,316   | 7.25   | 2,390   | 7.49   |
|               |  | หญิง | 1,217   | 3.68   | 1,277   | 3.86   |
| 081           | Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69)<br>เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ   | รวม  | 969     | 1.49   | 911     | 1.40   |
|               |  | ชาย  | 484     | 1.52   | 469     | 1.47   |
|               |  | หญิง | 485     | 1.47   | 442     | 1.33   |
| 082           | Malignant neoplasm of brain (C71)<br>เนื้องอกร้ายของสมอง   | รวม  | 4,627   | 7.12   | 4,582   | 7.05   |
|               |  | ชาย  | 2,473   | 7.74   | 2,519   | 7.90   |
|               |  | หญิง | 2,154   | 6.51   | 2,063   | 6.23   |
| 083           | Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72)<br>เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง  | รวม  | 488     | 0.75   | 533     | 0.82   |
|               |  | ชาย  | 243     | 0.76   | 229     | 0.72   |
|               |  | หญิง | 245     | 0.74   | 304     | 0.92   |
| 084           | Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97)<br>เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ<br>เนื้องอกหุ้ติภูมิที่มีไดรบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง | รวม  | 151,520 | 233.01 | 162,951 | 250.64 |
|               |  | ชาย  | 72,294  | 226.40 | 76,856  | 240.97 |
|               |  | หญิง | 79,226  | 239.39 | 86,095  | 259.96 |
| 085           | Hodgkin's disease (C81)<br>โรคหอดกินส์   | รวม  | 1,767   | 2.72   | 1,850   | 2.85   |
|               |  | ชาย  | 1,136   | 3.56   | 1,127   | 3.53   |
|               |  | หญิง | 631     | 1.91   | 723     | 2.18   |
| 086           | Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85)<br>เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มิใช่โรคหอดกินส์   | รวม  | 20,067  | 30.86  | 20,600  | 31.69  |
|               |  | ชาย  | 11,279  | 35.32  | 11,774  | 36.92  |
|               |  | หญิง | 8,788   | 26.55  | 8,826   | 26.65  |
| 087           | Leukaemia (C91-C95)<br>ลิวโคเมีย   | รวม  | 22,799  | 35.06  | 22,756  | 35.00  |
|               |  | ชาย  | 12,877  | 40.33  | 12,557  | 39.37  |
|               |  | หญิง | 9,922   | 29.98  | 10,199  | 30.80  |
| 088           | Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoitic and related tissue (C88-C90, C96)<br>เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมฟอยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ  | รวม  | 6,149   | 9.46   | 6,311   | 9.71   |
|               |  | ชาย  | 3,192   | 10.00  | 3,241   | 10.16  |
|               |  | หญิง | 2,957   | 8.93   | 3,070   | 9.27   |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบินจัดยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 089           | Carcinoma in situ of cervix uteri (D06)<br>มะเร็งกำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก  | รวม  | 1,859   | 5.62   | 1,511   | 4.56   |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 1,859   | 5.62   | 1,511   | 4.56   |
| 090           | Benign neoplasm of skin (D22-D23)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง   | รวม  | 929     | 1.43   | 975     | 1.50   |
|               |  | ชาย  | 388     | 1.22   | 377     | 1.18   |
|               |  | หญิง | 541     | 1.63   | 598     | 1.81   |
| 091           | Benigh neoplasm of breast (D24)<br>เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม  | รวม  | 1,398   | 2.15   | 1,348   | 2.07   |
|               |  | ชาย  | 13      | 0.04   | 6       | 0.02   |
|               |  | หญิง | 1,385   | 4.18   | 1,342   | 4.05   |
| 092           | Leiomyoma of uterus (D25)<br>โคลอไมโอม่าที่มดลูก   | รวม  | 26,046  | 78.70  | 26,905  | 81.24  |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 26,046  | 78.70  | 26,905  | 81.24  |
| 093           | Benigh neoplasm of ovary (D27)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่   | รวม  | 2,881   | 8.71   | 3,133   | 9.46   |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 2,881   | 8.71   | 3,133   | 9.46   |
| 094           | Benigh neoplasm of urinary organs (D30)<br>เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ   | รวม  | 211     | 0.32   | 236     | 0.36   |
|               |  | ชาย  | 107     | 0.34   | 123     | 0.39   |
|               |  | หญิง | 104     | 0.31   | 113     | 0.34   |
| 095           | Benigh neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง  | รวม  | 1,732   | 2.66   | 1,659   | 2.55   |
|               |  | ชาย  | 723     | 2.26   | 702     | 2.20   |
|               |  | หญิง | 1,009   | 3.05   | 957     | 2.89   |
| 096           | Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26,D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายกำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม | รวม  | 54,183  | 83.32  | 57,392  | 88.28  |
|               |  | ชาย  | 23,422  | 73.35  | 24,974  | 78.30  |
|               |  | หญิง | 30,761  | 92.95  | 32,418  | 97.88  |
| 097           | Iron deficiency anaemia (D50)<br>โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  | รวม  | 109,187 | 167.91 | 113,903 | 175.20 |
|               |  | ชาย  | 45,851  | 143.59 | 48,583  | 152.32 |
|               |  | หญิง | 63,336  | 191.37 | 65,320  | 197.23 |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)**  
**พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|---------------|---|------|---------|----------|---------|----------|
|               |   |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 098           | Other anaemia (D51-D64)<br>โลหิตจางอื่น ๆ   | รวม  | 752,352 | 1,156.98 | 775,171 | 1,192.32 |
|               |   | ชาย  | 341,151 | 1,068.36 | 353,559 | 1,108.53 |
|               |   | หญิง | 411,201 | 1,242.48 | 421,612 | 1,273.02 |
| 099           | Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77)<br>ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด | รวม  | 165,355 | 254.29   | 171,705 | 264.11   |
|               |   | ชาย  | 94,765  | 296.77   | 98,283  | 308.15   |
|               |   | หญิง | 70,590  | 213.29   | 73,422  | 221.69   |
| 100           | Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89)<br>ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน                                     | รวม  | 1,663   | 2.56     | 1,755   | 2.70     |
|               |   | ชาย  | 1,113   | 3.49     | 1,189   | 3.73     |
|               |   | หญิง | 550     | 1.66     | 566     | 1.71     |
| 101           | Iodine deficiency related thyroid disorders (E00-E02)<br>การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมรั้ยรอยด์                                     | รวม  | 915     | 1.41     | 1,100   | 1.69     |
|               |   | ชาย  | 302     | 0.95     | 382     | 1.20     |
|               |   | หญิง | 613     | 1.85     | 718     | 2.17     |
| 102           | Thyrotoxicosis (E05)<br>โรคพิษรั้ยรอยด์   | รวม  | 33,685  | 51.80    | 34,527  | 53.11    |
|               |   | ชาย  | 8,858   | 27.74    | 9,261   | 29.04    |
|               |   | หญิง | 24,827  | 75.02    | 25,266  | 76.29    |
| 103           | Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07)<br>ความผิดปกติของต่อมรั้ยรอยด์อื่น ๆ  | รวม  | 34,409  | 52.91    | 38,231  | 58.80    |
|               |   | ชาย  | 7,796   | 24.41    | 8,688   | 27.24    |
|               |   | หญิง | 26,613  | 80.41    | 29,543  | 89.20    |
| 104           | Diabetes mellitus (E10-E14)<br>เบาหวาน  | รวม  | 802,087 | 1,233.46 | 840,489 | 1,292.79 |
|               |   | ชาย  | 314,832 | 985.94   | 332,605 | 1,042.83 |
|               |   | หญิง | 487,255 | 1,472.28 | 507,884 | 1,533.51 |
| 105           | Malnutrition (E40-E46)<br>ทุพโภชนาการ   | รวม  | 22,033  | 33.88    | 21,457  | 33.00    |
|               |   | ชาย  | 12,618  | 39.52    | 12,161  | 38.13    |
|               |   | หญิง | 9,415   | 28.45    | 9,296   | 28.07    |
| 106           | Vitamin A deficiency (E50)<br>การขาดวิตามินเอ   | รวม  | 91      | 0.14     | 111     | 0.17     |
|               |   | ชาย  | 34      | 0.11     | 48      | 0.15     |
|               |   | หญิง | 57      | 0.17     | 63      | 0.19     |
| 107           | Other vitamin deficiencies (E51-E56)<br>การขาดวิตามินอื่น ๆ   | รวม  | 2,704   | 4.16     | 3,157   | 4.86     |
|               |   | ชาย  | 1,409   | 4.41     | 1,561   | 4.89     |
|               |   | หญิง | 1,295   | 3.91     | 1,596   | 4.82     |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558      |          | 2559      |          |
|---------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|
|               |  |      | จำนวน     | อัตรา    | จำนวน     | อัตรา    |
| 108           | Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ   | รวม  | 84        | 0.13     | 66        | 0.10     |
|               |  | ชาย  | 35        | 0.11     | 36        | 0.11     |
|               |  | หญิง | 49        | 0.15     | 30        | 0.09     |
| 109           | Obesity (E66)<br>โรคอ้วน   | รวม  | 13,105    | 20.15    | 14,090    | 21.67    |
|               |  | ชาย  | 4,882     | 15.29    | 4,885     | 15.32    |
|               |  | หญิง | 8,223     | 24.85    | 9,205     | 27.79    |
| 110           | Volume depletion (E86)<br>การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย   | รวม  | 108,561   | 166.95   | 95,800    | 147.35   |
|               |  | ชาย  | 54,825    | 171.69   | 48,901    | 153.32   |
|               |  | หญิง | 53,736    | 162.37   | 46,899    | 141.61   |
| 111           | Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาbolิกอื่น ๆ                     | รวม  | 2,039,522 | 3,136.40 | 2,115,915 | 3,254.58 |
|               |  | ชาย  | 968,771   | 3,033.85 | 1,010,878 | 3,169.44 |
|               |  | หญิง | 1,070,751 | 3,235.36 | 1,105,037 | 3,336.56 |
| 112           | Dementia (F00-F03)<br>สมองเสื่อม   | รวม  | 10,671    | 16.41    | 11,692    | 17.98    |
|               |  | ชาย  | 4,693     | 14.70    | 5,064     | 15.88    |
|               |  | หญิง | 5,978     | 18.06    | 6,628     | 20.01    |
| 113           | Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพอัลกอฮอล์  | รวม  | 110,520   | 169.96   | 112,033   | 172.32   |
|               |  | ชาย  | 99,109    | 310.37   | 100,494   | 315.08   |
|               |  | หญิง | 11,411    | 34.48    | 11,539    | 34.84    |
| 114           | Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)<br>ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาลอื่น ๆ | รวม  | 23,501    | 36.14    | 26,999    | 41.53    |
|               |  | ชาย  | 20,728    | 64.91    | 23,831    | 74.72    |
|               |  | หญิง | 2,773     | 8.38     | 3,168     | 9.57     |
| 115           | Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด  | รวม  | 59,782    | 91.93    | 61,698    | 94.90    |
|               |  | ชาย  | 37,900    | 118.69   | 39,127    | 122.68   |
|               |  | หญิง | 21,882    | 66.12    | 22,571    | 68.15    |
| 116           | Mood(affective) disorders (F30-F39)<br>ความผิดปกติทางอารมณ์  | รวม  | 35,613    | 54.77    | 37,444    | 57.59    |
|               |  | ชาย  | 11,826    | 37.03    | 12,474    | 39.11    |
|               |  | หญิง | 23,787    | 71.87    | 24,970    | 75.39    |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|---------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|               |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 117           | Neurotic, stress related and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด               | รวม  | 28,485 | 43.80  | 27,491 | 42.29  |
|               |   | ชาย  | 8,203  | 25.69  | 8,199  | 25.71  |
|               |   | หญิง | 20,282 | 61.28  | 19,292 | 58.25  |
| 118           | Mental retardation (F70-F79)<br>ภาวะปัญญาอ่อน   | รวม  | 6,907  | 10.62  | 7,257  | 11.16  |
|               |   | ชาย  | 3,904  | 12.23  | 4,179  | 13.10  |
|               |   | หญิง | 3,003  | 9.07   | 3,078  | 9.29   |
| 119           | Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99)<br>ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ                     | รวม  | 44,397 | 68.27  | 48,050 | 73.91  |
|               |   | ชาย  | 25,953 | 81.28  | 28,153 | 88.27  |
|               |   | หญิง | 18,444 | 55.73  | 19,897 | 60.08  |
| 120           | Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09)<br>การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง                             | รวม  | 27,887 | 42.89  | 28,059 | 43.16  |
|               |   | ชาย  | 17,174 | 53.78  | 17,058 | 53.48  |
|               |   | หญิง | 10,713 | 32.37  | 11,001 | 33.22  |
| 121           | Parkinson's disease (G20)<br>โรคพาคินชัน  | รวม  | 15,603 | 23.99  | 16,845 | 25.91  |
|               |   | ชาย  | 7,426  | 23.26  | 8,117  | 25.45  |
|               |   | หญิง | 8,177  | 24.71  | 8,728  | 26.35  |
| 122           | Alzheimer's disease (G30)<br>โรคแอลไซเมอร์  | รวม  | 5,944  | 9.14   | 7,179  | 11.04  |
|               |   | ชาย  | 2,266  | 7.10   | 2,742  | 8.60   |
|               |   | หญิง | 3,678  | 11.11  | 4,437  | 13.40  |
| 123           | Multiple sclerosis (G35)<br>มัลติเพล  sclerotosis   | รวม  | 453    | 0.70   | 443    | 0.68   |
|               |   | ชาย  | 95     | 0.30   | 79     | 0.25   |
|               |   | หญิง | 358    | 1.08   | 364    | 1.10   |
| 124           | Epilepsy (G40-G41)<br>ลมบ้าหมู  | รวม  | 79,385 | 122.08 | 82,698 | 127.20 |
|               |   | ชาย  | 49,100 | 153.76 | 50,688 | 158.92 |
|               |   | หญิง | 30,285 | 91.51  | 32,010 | 96.65  |
| 125           | Migraine and other headache syndromes (G43-G44)<br>โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ                                     | รวม  | 18,438 | 28.35  | 16,820 | 25.87  |
|               |   | ชาย  | 5,493  | 17.20  | 5,298  | 16.61  |
|               |   | หญิง | 12,945 | 39.11  | 11,522 | 34.79  |
| 126           | Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45) โรคเลือดไปเลี้ยงสมอง<br>น้อยซึ่วครัวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง | รวม  | 11,145 | 17.14  | 11,803 | 18.15  |
|               |   | ชาย  | 6,039  | 18.91  | 6,394  | 20.05  |
|               |   | หญิง | 5,106  | 15.43  | 5,409  | 16.33  |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 127           | Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59) ความผิดปกติของสันประสาท รากประสาท และปมประสาท                                 | รวม  | 11,895  | 18.29  | 12,732  | 19.58  |
|               |  | ชาย  | 5,259   | 16.47  | 5,589   | 17.52  |
|               |  | หญิง | 6,636   | 20.05  | 7,143   | 21.57  |
| 128           | Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83)<br>สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ                                   | รวม  | 45,093  | 69.34  | 49,270  | 75.78  |
|               |  | ชาย  | 27,655  | 86.61  | 30,112  | 94.41  |
|               |  | หญิง | 17,438  | 52.69  | 19,158  | 57.85  |
| 129           | Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)<br>โรคของระบบประสาಥอื่น ๆ | รวม  | 95,091  | 146.23 | 101,767 | 156.53 |
|               |  | ชาย  | 52,481  | 164.35 | 56,360  | 176.71 |
|               |  | หญิง | 42,610  | 128.75 | 45,407  | 137.10 |
| 130           | Inflammation of eyelid (H00-H01)<br>การอักเสบของหนังตา   | รวม  | 2,788   | 4.29   | 3,117   | 4.79   |
|               |  | ชาย  | 1,385   | 4.34   | 1,524   | 4.78   |
|               |  | หญิง | 1,403   | 4.24   | 1,593   | 4.81   |
| 131           | Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13)<br>เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ                 | รวม  | 20,879  | 32.11  | 20,379  | 31.35  |
|               |  | ชาย  | 8,516   | 26.67  | 8,669   | 27.18  |
|               |  | หญิง | 12,363  | 37.36  | 11,710  | 35.36  |
| 132           | Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจากตาอักเสบและความผิดปกติ ของตากขาวและกระจากตาอื่น ๆ           | รวม  | 10,164  | 15.63  | 10,811  | 16.63  |
|               |  | ชาย  | 5,867   | 18.37  | 6,330   | 19.85  |
|               |  | หญิง | 4,297   | 12.98  | 4,481   | 13.53  |
| 133           | Cataract and other disorders of sclera and cornea (H25-H28)<br>ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ                            | รวม  | 244,151 | 375.46 | 217,129 | 333.98 |
|               |  | ชาย  | 104,669 | 327.79 | 93,863  | 294.29 |
|               |  | หญิง | 139,482 | 421.46 | 123,266 | 372.19 |
| 134           | Retinal detachments and breaks (H33)<br>จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา  | รวม  | 7,742   | 11.91  | 7,899   | 12.15  |
|               |  | ชาย  | 4,459   | 13.96  | 4,570   | 14.33  |
|               |  | หญิง | 3,283   | 9.92   | 3,329   | 10.05  |
| 135           | Glaucoma (H40-H42)<br>ต้อหิน   | รวม  | 20,715  | 31.86  | 21,702  | 33.38  |
|               |  | ชาย  | 9,927   | 31.09  | 10,453  | 32.77  |
|               |  | หญิง | 10,788  | 32.60  | 11,249  | 33.97  |
| 136           | Strabismus (H49-H50)<br>ตาเหล่   | รวม  | 2,815   | 4.33   | 3,125   | 4.81   |
|               |  | ชาย  | 1,317   | 4.12   | 1,508   | 4.73   |
|               |  | หญิง | 1,498   | 4.53   | 1,617   | 4.88   |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558      |          | 2559      |          |
|---------------|---|------|-----------|----------|-----------|----------|
|               |   |      | จำนวน     | อัตรา    | จำนวน     | อัตรา    |
| 137           | Disorders of refraction and accommodation (H52)<br>ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง   | รวม  | 1,531     | 2.35     | 1,362     | 2.09     |
|               |   | ชาย  | 724       | 2.27     | 645       | 2.02     |
|               |   | หญิง | 807       | 2.44     | 717       | 2.16     |
| 138           | Blindness and low vision (H54)<br>ตาบอดและสายตาเสื่อมลง   | รวม  | 236,227   | 363.27   | 210,366   | 323.57   |
|               |   | ชาย  | 100,634   | 315.15   | 90,239    | 282.93   |
|               |   | หญิง | 135,593   | 409.70   | 120,127   | 362.71   |
| 139           | Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)<br>โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ | รวม  | 43,087    | 66.26    | 46,264    | 71.16    |
|               |   | ชาย  | 20,312    | 63.61    | 21,829    | 68.44    |
|               |   | หญิง | 22,775    | 68.82    | 24,435    | 73.78    |
| 140           | Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75) หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกากหูอื่น ๆ        | รวม  | 8,505     | 13.08    | 9,275     | 14.27    |
|               |   | ชาย  | 4,302     | 13.47    | 4,766     | 14.94    |
|               |   | หญิง | 4,203     | 12.70    | 4,509     | 13.61    |
| 141           | Hearing loss (H90-H91)<br>การสูญเสียการได้ยิน   | รวม  | 3,339     | 5.13     | 3,526     | 5.42     |
|               |   | ชาย  | 1,820     | 5.70     | 1,899     | 5.95     |
|               |   | หญิง | 1,519     | 4.59     | 1,627     | 4.91     |
| 142           | Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)<br>โรคของหูและปุ่มกากหูอื่น ๆ                                   | รวม  | 28,145    | 43.28    | 26,919    | 41.41    |
|               |   | ชาย  | 8,669     | 27.15    | 8,606     | 26.98    |
|               |   | หญิง | 19,476    | 58.85    | 18,313    | 55.29    |
| 143           | Acute rheumatic fever (I00-I02)<br>ไข้รูมาติกเฉียบพลัน  | รวม  | 590       | 0.91     | 572       | 0.88     |
|               |   | ชาย  | 285       | 0.89     | 257       | 0.81     |
|               |   | หญิง | 305       | 0.92     | 315       | 0.95     |
| 144           | Chronic rheumatic heart disease (I05-I09)<br>โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง  | รวม  | 26,850    | 41.29    | 26,788    | 41.20    |
|               |   | ชาย  | 10,533    | 32.99    | 10,444    | 32.75    |
|               |   | หญิง | 16,317    | 49.30    | 16,344    | 49.35    |
| 145           | Essential (primary) hypertension (I10)<br>ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ   | รวม  | 1,224,023 | 1,882.32 | 1,295,968 | 1,993.38 |
|               |   | ชาย  | 522,663   | 1,636.80 | 558,481   | 1,751.03 |
|               |   | หญิง | 701,360   | 2,119.21 | 737,487   | 2,226.78 |
| 146           | Other hypertensive diseases (I11-I15)<br>โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ   | รวม  | 12,187    | 18.74    | 10,102    | 15.54    |
|               |   | ชาย  | 5,655     | 17.71    | 4,699     | 14.73    |
|               |   | หญิง | 6,532     | 19.74    | 5,403     | 16.31    |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 147           | Acute myocardial infarction (I21-I22)<br>กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน   | รวม  | 81,706  | 125.65 | 82,427  | 126.78 |
|               |  | ชาย  | 47,065  | 147.39 | 47,760  | 149.74 |
|               |  | หญิง | 34,641  | 104.67 | 34,667  | 104.67 |
| 148           | Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25)<br>โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ  | รวม  | 244,167 | 375.48 | 245,026 | 376.88 |
|               |  | ชาย  | 135,205 | 423.41 | 137,972 | 432.59 |
|               |  | หญิง | 108,962 | 329.24 | 107,054 | 323.24 |
| 149           | Pulmonary embolism (I26)<br>ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด   | รวม  | 5,324   | 8.19   | 5,958   | 9.16   |
|               |  | ชาย  | 1,840   | 5.76   | 2,246   | 7.04   |
|               |  | หญิง | 3,484   | 10.53  | 3,712   | 11.21  |
| 150           | Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ                            | รวม  | 221,395 | 340.46 | 235,107 | 361.63 |
|               |  | ชาย  | 105,525 | 330.47 | 112,478 | 352.66 |
|               |  | หญิง | 115,870 | 350.11 | 122,629 | 370.27 |
| 151           | Heart failure (I50)<br>หัวใจล้มเหลว  | รวม  | 189,759 | 291.81 | 193,018 | 296.89 |
|               |  | ชาย  | 82,658  | 258.86 | 85,103  | 266.83 |
|               |  | หญิง | 107,101 | 323.61 | 107,915 | 325.84 |
| 152           | Other heart diseases (I27-I43, I51-I52)<br>โรคหัวใจอื่น ๆ  | รวม  | 115,382 | 177.44 | 120,151 | 184.81 |
|               |  | ชาย  | 55,986  | 175.33 | 59,050  | 185.14 |
|               |  | หญิง | 59,396  | 179.47 | 61,101  | 184.49 |
| 153           | Intracranial haemorrhage (I60-I62)<br>เลือดออกในสมอง   | รวม  | 53,414  | 82.14  | 56,920  | 87.55  |
|               |  | ชาย  | 31,623  | 99.03  | 33,985  | 106.55 |
|               |  | หญิง | 21,791  | 65.84  | 22,935  | 69.25  |
| 154           | Cerebral infarction (I63)<br>เนื้อสมองตาย  | รวม  | 100,364 | 154.34 | 104,322 | 160.46 |
|               |  | ชาย  | 54,358  | 170.23 | 56,156  | 176.07 |
|               |  | หญิง | 46,006  | 139.01 | 48,166  | 145.43 |
| 155           | Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจาก เลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด | รวม  | 20,805  | 31.99  | 23,349  | 35.91  |
|               |  | ชาย  | 11,252  | 35.24  | 12,593  | 39.48  |
|               |  | หญิง | 9,553   | 28.87  | 10,756  | 32.48  |
| 156           | Other cerebrovascular diseases (I65-I69)<br>โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ   | รวม  | 104,941 | 161.38 | 108,872 | 167.46 |
|               |  | ชาย  | 57,621  | 180.45 | 59,876  | 187.73 |
|               |  | หญิง | 47,320  | 142.98 | 48,996  | 147.94 |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558   |        | 2559   |        |
|---------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
|               |   |      | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  |
| 157           | Atherosclerosis (I70)<br>อะเรอโรสเคลอร์อิซิส  | รวม  | 2,200  | 3.38   | 2,316  | 3.56   |
|               |   | ชาย  | 1,146  | 3.59   | 1,224  | 3.84   |
|               |   | หญิง | 1,054  | 3.18   | 1,092  | 3.30   |
| 158           | Other peripheral vascular diseases (I73)<br>โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ  | รวม  | 1,915  | 2.94   | 1,974  | 3.04   |
|               |   | ชาย  | 1,106  | 3.46   | 1,137  | 3.56   |
|               |   | หญิง | 809    | 2.44   | 837    | 2.53   |
| 159           | Aterial embolism and thrombosis (I74)<br>ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง   | รวม  | 6,320  | 9.72   | 6,268  | 9.64   |
|               |   | ชาย  | 3,535  | 11.07  | 3,495  | 10.96  |
|               |   | หญิง | 2,785  | 8.42   | 2,773  | 8.37   |
| 160           | Other disease of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79) โรคของหลอดเลือดแดง<br>หลอดเลือดแดงย่อยและแคปิลารีอื่น ๆ                          | รวม  | 15,183 | 23.35  | 16,019 | 24.64  |
|               |   | ชาย  | 8,957  | 28.05  | 9,605  | 30.11  |
|               |   | หญิง | 6,226  | 18.81  | 6,414  | 19.37  |
| 161           | Phlebitis, thrombophlebitis,venous embolism and thrombosis (I80-I82) หลอดเลือดดำอักเสบ<br>หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือดและลิ่มเลือด ในหลอดเลือดดำ | รวม  | 23,095 | 35.52  | 25,199 | 38.76  |
|               |   | ชาย  | 9,611  | 30.10  | 10,619 | 33.29  |
|               |   | หญิง | 13,484 | 40.74  | 14,580 | 44.02  |
| 162           | Varicose veins of lower extremities (I83)<br>หลอดเลือดดำขดของรยางค์ส่วนล่าง   | รวม  | 1,547  | 2.38   | 1,691  | 2.60   |
|               |   | ชาย  | 649    | 2.03   | 669    | 2.10   |
|               |   | หญิง | 898    | 2.71   | 1,022  | 3.09   |
| 163           | Haemorrhoids (I84)<br>ริดสีดวงทวาร  | รวม  | 19,740 | 30.36  | 20,468 | 31.48  |
|               |   | ชาย  | 11,447 | 35.85  | 11,664 | 36.57  |
|               |   | หญิง | 8,293  | 25.06  | 8,804  | 26.58  |
| 164           | Other diseases of the circulatory system (I85-I99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบหลอดเลือด  | รวม  | 48,889 | 75.18  | 53,455 | 82.22  |
|               |   | ชาย  | 29,489 | 92.35  | 32,533 | 102.00 |
|               |   | หญิง | 19,400 | 58.62  | 20,922 | 63.17  |
| 165           | Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)<br>คออักเสบเนื้ยบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเนื้ยบพลัน  | รวม  | 87,888 | 135.16 | 95,860 | 147.45 |
|               |   | ชาย  | 45,415 | 142.22 | 49,665 | 155.72 |
|               |   | หญิง | 42,473 | 128.34 | 46,195 | 139.48 |
| 166           | Acute laryngitis and tracheitis (J04)<br>กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเนื้ยบพลัน  | รวม  | 1,068  | 1.64   | 1,118  | 1.72   |
|               |   | ชาย  | 594    | 1.86   | 626    | 1.96   |
|               |   | หญิง | 474    | 1.43   | 492    | 1.49   |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|------------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|                  |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 167              | Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ                                   | รวม  | 76,250  | 117.26 | 88,315  | 135.84 |
|                  |  | ชาย  | 40,162  | 125.77 | 46,718  | 146.48 |
|                  |  | หญิง | 36,088  | 109.04 | 41,597  | 125.60 |
| 168              | Influenza (J09-J11)<br>ไข้หวัดใหญ่   | รวม  | 28,322  | 43.55  | 53,048  | 81.60  |
|                  |  | ชาย  | 14,633  | 45.83  | 27,497  | 86.21  |
|                  |  | หญิง | 13,689  | 41.36  | 25,551  | 77.15  |
| 169              | Pneumonia (J12-J18)<br>ปอดบวม  | รวม  | 456,776 | 702.44 | 514,823 | 791.87 |
|                  |  | ชาย  | 255,676 | 800.69 | 289,141 | 906.55 |
|                  |  | หญิง | 201,100 | 607.64 | 225,682 | 681.43 |
| 170              | Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน   | รวม  | 177,511 | 272.98 | 187,747 | 288.78 |
|                  |  | ชาย  | 98,204  | 307.54 | 102,480 | 321.31 |
|                  |  | หญิง | 79,307  | 239.63 | 85,267  | 257.46 |
| 171              | Chronic sinusitis (J32)<br>ไซนัสอักเสบเรื้อรัง   | รวม  | 5,989   | 9.21   | 6,205   | 9.54   |
|                  |  | ชาย  | 3,149   | 9.86   | 3,278   | 10.28  |
|                  |  | หญิง | 2,840   | 8.58   | 2,927   | 8.84   |
| 172              | Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34)<br>โรคอื่นของจมูกและไซนัส  | รวม  | 14,226  | 21.88  | 15,510  | 23.86  |
|                  |  | ชาย  | 7,731   | 24.21  | 8,402   | 26.34  |
|                  |  | หญิง | 6,495   | 19.63  | 7,108   | 21.46  |
| 173              | Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35)<br>โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ   | รวม  | 9,292   | 14.29  | 9,524   | 14.65  |
|                  |  | ชาย  | 5,105   | 15.99  | 5,211   | 16.34  |
|                  |  | หญิง | 4,187   | 12.65  | 4,313   | 13.02  |
| 174              | Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน  | รวม  | 7,781   | 11.97  | 8,139   | 12.52  |
|                  |  | ชาย  | 4,482   | 14.04  | 4,631   | 14.52  |
|                  |  | หญิง | 3,299   | 9.97   | 3,508   | 10.59  |
| 175              | Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44)<br>โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น | รวม  | 249,742 | 384.06 | 254,507 | 391.47 |
|                  |  | ชาย  | 182,007 | 569.98 | 187,127 | 586.71 |
|                  |  | หญิง | 67,735  | 204.67 | 67,380  | 203.45 |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|------------------|---|------|---------|--------|---------|--------|
|                  |   |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 176              | Asthma (J45-J46)<br>โรคหืด  | รวม  | 115,577 | 177.74 | 119,037 | 183.10 |
|                  |   | ชาย  | 44,574  | 139.59 | 44,763  | 140.35 |
|                  |   | หญิง | 71,003  | 214.54 | 74,274  | 224.26 |
| 177              | Bronchioectasis (J47)<br>โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง   | รวม  | 13,781  | 21.19  | 15,155  | 23.31  |
|                  |   | ชาย  | 6,579   | 20.60  | 7,168   | 22.47  |
|                  |   | หญิง | 7,202   | 21.76  | 7,987   | 24.12  |
| 178              | Pnemoconiosis (J60-J65)<br>โรคฝุ่นละอองในปอด  | รวม  | 242     | 0.37   | 269     | 0.41   |
|                  |   | ชาย  | 185     | 0.58   | 214     | 0.67   |
|                  |   | หญิง | 57      | 0.17   | 55      | 0.17   |
| 179              | Other diseases of the respiratory system (J22,<br>J66-J99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ                                 | รวม  | 322,170 | 495.44 | 339,697 | 522.50 |
|                  |   | ชาย  | 187,661 | 587.69 | 198,864 | 623.51 |
|                  |   | หญิง | 134,509 | 406.43 | 140,833 | 425.23 |
| 180              | Dental caries (K02)<br>ฟันผุ  | รวม  | 8,180   | 12.58  | 8,184   | 12.59  |
|                  |   | ชาย  | 4,486   | 14.05  | 4,425   | 13.87  |
|                  |   | หญิง | 3,694   | 11.16  | 3,759   | 11.35  |
| 181              | Other disorders of teeth and supporting<br>structures (K00-K01, K03-K08)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง            | รวม  | 18,153  | 27.92  | 17,560  | 27.01  |
|                  |   | ชาย  | 9,925   | 31.08  | 9,578   | 30.03  |
|                  |   | หญิง | 8,228   | 24.86  | 7,982   | 24.10  |
| 182              | Other diseases of the oral cavity, salivary<br>glands and jaws (K09-K14)<br>โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร      | รวม  | 20,119  | 30.94  | 20,619  | 31.71  |
|                  |   | ชาย  | 10,215  | 31.99  | 10,395  | 32.59  |
|                  |   | หญิง | 9,904   | 29.93  | 10,224  | 30.87  |
| 183              | Gastric and duodenal ulcer (K25-K27)<br>แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนัม   | รวม  | 42,875  | 65.93  | 40,926  | 62.95  |
|                  |   | ชาย  | 27,381  | 85.75  | 26,671  | 83.62  |
|                  |   | หญิง | 15,494  | 46.82  | 14,255  | 43.04  |
| 184              | Gastritis and duodenitis (K29)<br>กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ  | รวม  | 85,932  | 132.15 | 97,356  | 149.75 |
|                  |   | ชาย  | 45,548  | 142.64 | 51,337  | 160.96 |
|                  |   | หญิง | 40,384  | 122.02 | 46,019  | 138.95 |
| 185              | Other diseases of oesophagus, stomach and<br>duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ<br>ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม | รวม  | 172,594 | 265.42 | 167,053 | 256.95 |
|                  |   | ชาย  | 74,413  | 233.04 | 72,527  | 227.40 |
|                  |   | หญิง | 98,181  | 296.66 | 94,526  | 285.41 |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|------------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|                  |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 186              | Diseases of appendix (K35-K38)<br>โรคของไส้ติ้ง  | รวม  | 96,502  | 148.40 | 93,714  | 144.15 |
|                  |  | ชาย  | 45,323  | 141.94 | 44,090  | 138.24 |
|                  |  | หญิง | 51,179  | 154.64 | 49,624  | 149.84 |
| 187              | Inguinal hernia (K40)<br>ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ  | รวม  | 34,146  | 52.51  | 34,319  | 52.79  |
|                  |  | ชาย  | 32,222  | 100.91 | 32,347  | 101.42 |
|                  |  | หญิง | 1,924   | 5.81   | 1,972   | 5.95   |
| 188              | Other hernia (K41-K46)<br>ไส้เลื่อนอื่น ๆ  | รวม  | 5,911   | 9.09   | 6,282   | 9.66   |
|                  |  | ชาย  | 2,671   | 8.36   | 2,819   | 8.84   |
|                  |  | หญิง | 3,240   | 9.79   | 3,463   | 10.46  |
| 189              | Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51)<br>โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแพลเบี้ยอย                          | รวม  | 1,142   | 1.76   | 1,192   | 1.83   |
|                  |  | ชาย  | 568     | 1.78   | 596     | 1.87   |
|                  |  | หญิง | 574     | 1.73   | 596     | 1.80   |
| 190              | Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน | รวม  | 38,143  | 58.66  | 39,569  | 60.86  |
|                  |  | ชาย  | 22,642  | 70.91  | 23,704  | 74.32  |
|                  |  | หญิง | 15,501  | 46.84  | 15,865  | 47.90  |
| 191              | Diverticular disease of intestine (K57)<br>โรคติ่งเนื้อของลำไส้  | รวม  | 7,321   | 11.26  | 8,031   | 12.35  |
|                  |  | ชาย  | 3,600   | 11.27  | 4,131   | 12.95  |
|                  |  | หญิง | 3,721   | 11.24  | 3,900   | 11.78  |
| 192              | Other diseases of intestine and peritoneum (K52-K55, K58-K67)<br>โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง            | รวม  | 108,465 | 166.80 | 111,844 | 172.03 |
|                  |  | ชาย  | 59,255  | 185.57 | 61,266  | 192.09 |
|                  |  | หญิง | 49,210  | 148.69 | 50,578  | 152.72 |
| 193              | Alcoholic liver disease (K70)<br>โรคตับเกี่ยวกับอัลกอฮอล์  | รวม  | 56,910  | 87.52  | 57,234  | 88.03  |
|                  |  | ชาย  | 45,404  | 142.19 | 45,716  | 143.34 |
|                  |  | หญิง | 11,506  | 34.77  | 11,518  | 34.78  |
| 194              | Other disease of liver (K71-K77)<br>โรคอื่น ๆ ของตับ   | รวม  | 145,094 | 223.13 | 149,005 | 229.19 |
|                  |  | ชาย  | 90,230  | 282.57 | 93,620  | 293.53 |
|                  |  | หญิง | 54,864  | 165.78 | 55,385  | 167.23 |
| 195              | Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81)<br>โรคนิ่วในระบบนำดีและถุงน้ำดีอักเสบ                                 | รวม  | 65,536  | 100.78 | 67,742  | 104.20 |
|                  |  | ชาย  | 26,506  | 83.01  | 27,356  | 85.77  |
|                  |  | หญิง | 39,030  | 117.93 | 40,386  | 121.94 |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)**  
**พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 196           | Acute pancreatitis and other disease of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและ โรคอื่น ๆ ของตับอ่อน      | รวม  | 19,638  | 30.20  | 20,616  | 31.71  |
|               |  | ชาย  | 14,518  | 45.47  | 14,907  | 46.74  |
|               |  | หญิง | 5,120   | 15.47  | 5,709   | 17.24  |
| 197           | Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร                               | รวม  | 130,734 | 201.04 | 131,609 | 202.43 |
|               |  | ชาย  | 81,479  | 255.16 | 82,189  | 257.69 |
|               |  | หญิง | 49,255  | 148.83 | 49,420  | 149.22 |
| 198           | Infection of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ ผิวหนัง        | รวม  | 152,990 | 235.27 | 142,626 | 219.38 |
|               |  | ชาย  | 85,665  | 268.27 | 80,035  | 250.94 |
|               |  | หญิง | 67,325  | 203.43 | 62,591  | 188.99 |
| 199           | Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99) โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง           | รวม  | 113,283 | 174.21 | 116,441 | 179.10 |
|               |  | ชาย  | 60,117  | 188.27 | 61,578  | 193.07 |
|               |  | หญิง | 53,166  | 160.65 | 54,863  | 165.65 |
| 200           | Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14) ข้ออักเสบเรื้อรังมาตอย และข้ออักเสบหลายข้อ | รวม  | 152,164 | 234.00 | 159,880 | 245.92 |
|               |  | ชาย  | 98,497  | 308.46 | 104,085 | 326.34 |
|               |  | หญิง | 53,667  | 162.16 | 55,795  | 168.47 |
| 201           | Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม   | รวม  | 37,132  | 57.10  | 37,386  | 57.50  |
|               |  | ชาย  | 8,586   | 26.89  | 8,537   | 26.77  |
|               |  | หญิง | 28,546  | 86.25  | 28,849  | 87.11  |
| 202           | Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา  | รวม  | 1,907   | 2.93   | 1,918   | 2.95   |
|               |  | ชาย  | 839     | 2.63   | 883     | 2.77   |
|               |  | หญิง | 1,068   | 3.23   | 1,035   | 3.13   |
| 203           | Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ  | รวม  | 23,961  | 36.85  | 24,595  | 37.83  |
|               |  | ชาย  | 15,020  | 47.04  | 15,314  | 48.01  |
|               |  | หญิง | 8,941   | 27.02  | 9,281   | 28.02  |
| 204           | Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาณ                                  | รวม  | 25,249  | 38.83  | 25,633  | 39.43  |
|               |  | ชาย  | 4,789   | 15.00  | 4,851   | 15.21  |
|               |  | หญิง | 20,460  | 61.82  | 20,782  | 62.75  |
| 205           | Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ              | รวม  | 9,117   | 14.02  | 8,551   | 13.15  |
|               |  | ชาย  | 4,682   | 14.66  | 4,381   | 13.74  |
|               |  | หญิง | 4,435   | 13.40  | 4,170   | 12.59  |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการริบิจลัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค)**  
**พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|---------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 206           | Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54)<br>พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ  | รวม  | 62,431  | 96.01    | 61,163  | 94.08    |
|               |  | ชาย  | 25,440  | 79.67    | 25,491  | 79.92    |
|               |  | หญิง | 36,991  | 111.77   | 35,672  | 107.71   |
| 207           | Soft tissue disorders (M60-M79)<br>เนื้อเยื่อผิดปกติ   | รวม  | 87,084  | 133.92   | 84,804  | 130.44   |
|               |  | ชาย  | 44,779  | 140.23   | 44,007  | 137.98   |
|               |  | หญิง | 42,305  | 127.83   | 40,797  | 123.18   |
| 208           | Disorders of bone density and structure<br>(M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง<br>กระดูกอักเสบ       | รวม  | 15,615  | 24.01    | 15,814  | 24.32    |
|               |  | ชาย  | 5,134   | 16.08    | 5,218   | 16.36    |
|               |  | หญิง | 10,481  | 31.67    | 10,596  | 31.99    |
| 209           | Osteomyelitis (M86)<br>กระดูกอักเสบ  | รวม  | 10,691  | 16.44    | 10,666  | 16.41    |
|               |  | ชาย  | 6,519   | 20.42    | 6,583   | 20.64    |
|               |  | หญิง | 4,172   | 12.61    | 4,083   | 12.33    |
| 210           | Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาณ | รวม  | 13,235  | 20.35    | 13,275  | 20.42    |
|               |  | ชาย  | 6,744   | 21.12    | 6,875   | 21.56    |
|               |  | หญิง | 6,491   | 19.61    | 6,400   | 19.32    |
| 211           | Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบ<br>เนื้ยบพลันและชนิดกำเริบเร็ว                  | รวม  | 5,911   | 9.09     | 4,609   | 7.09     |
|               |  | ชาย  | 3,569   | 11.18    | 2,768   | 8.68     |
|               |  | หญิง | 2,342   | 7.08     | 1,841   | 5.56     |
| 212           | Other glomerular diseases (N02-N08)<br>โรคของหน่วยไตอื่น ๆ   | รวม  | 39,477  | 60.71    | 40,112  | 61.70    |
|               |  | ชาย  | 15,847  | 49.63    | 16,024  | 50.24    |
|               |  | หญิง | 23,630  | 71.40    | 24,088  | 72.73    |
| 213           | Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16)<br>โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต   | รวม  | 107,331 | 165.06   | 107,289 | 165.03   |
|               |  | ชาย  | 38,770  | 121.41   | 39,774  | 124.70   |
|               |  | หญิง | 68,561  | 207.16   | 67,515  | 203.86   |
| 214           | Renal failure (N17-N19)<br>ไตวาย   | รวม  | 646,299 | 993.89   | 710,477 | 1,092.81 |
|               |  | ชาย  | 322,260 | 1,009.20 | 354,548 | 1,111.63 |
|               |  | หญิง | 324,039 | 979.11   | 355,929 | 1,074.70 |
| 215           | Urolithiasis (N20-N23)<br>นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ   | รวม  | 59,010  | 90.75    | 58,209  | 89.53    |
|               |  | ชาย  | 36,301  | 113.68   | 35,903  | 112.57   |
|               |  | หญิง | 22,709  | 68.62    | 22,306  | 67.35    |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|------------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|                  |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 216              | Cystitis (N30)<br>กระเพาะปัสสาวะอักเสบ   | รวม  | 24,860  | 38.23  | 24,230  | 37.27  |
|                  |  | ชาย  | 7,276   | 22.79  | 7,148   | 22.41  |
|                  |  | หญิง | 17,584  | 53.13  | 17,082  | 51.58  |
| 217              | Other diseases of the urinary system (N25-N29,<br>N31-N39)<br>โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ                          | รวม  | 225,529 | 346.82 | 236,674 | 364.04 |
|                  |  | ชาย  | 91,309  | 285.95 | 97,045  | 304.27 |
|                  |  | หญิง | 134,220 | 405.56 | 139,629 | 421.60 |
| 218              | Hyperplasia of prostate (N40)<br>ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์  | รวม  | 70,804  | 221.73 | 77,790  | 243.90 |
|                  |  | ชาย  | 70,804  | 221.73 | 77,790  | 243.90 |
|                  |  | หญิง | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 219              | Other disorders of prostate (N41-N42)<br>ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก  | รวม  | 713     | 2.23   | 784     | 2.46   |
|                  |  | ชาย  | 713     | 2.23   | 784     | 2.46   |
|                  |  | หญิง | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 220              | Hydrocele and spermatocele (N43)<br>ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ   | รวม  | 3,496   | 10.95  | 3,512   | 11.01  |
|                  |  | ชาย  | 3,496   | 10.95  | 3,512   | 11.01  |
|                  |  | หญิง | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 221              | Redundant prepuce, phimosis and<br>paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป<br>ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก | รวม  | 5,308   | 16.62  | 5,375   | 16.85  |
|                  |  | ชาย  | 5,308   | 16.62  | 5,375   | 16.85  |
|                  |  | หญิง | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 222              | Other disease of male genital organs (N44-N46,<br>N48-N51)<br>โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย                          | รวม  | 10,904  | 34.15  | 11,494  | 36.04  |
|                  |  | ชาย  | 10,904  | 34.15  | 11,494  | 36.04  |
|                  |  | หญิง | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 223              | Disorders of breast (N60-N64)<br>ความผิดปกติของเต้านม  | รวม  | 8,860   | 13.63  | 9,124   | 14.03  |
|                  |  | ชาย  | 615     | 1.93   | 569     | 1.78   |
|                  |  | หญิง | 8,245   | 24.91  | 8,555   | 25.83  |
| 224              | Salphingitis and oophoritis (N70)<br>ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ   | รวม  | 2,500   | 7.00   | 2,693   | 8.13   |
|                  |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 2,500   | 7.55   | 2,693   | 8.13   |
| 225              | Inflammatory disease of cervix uteri (N72)<br>ปากมดลูกอักเสบ   | รวม  | 731     | 2.21   | 808     | 2.44   |
|                  |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|                  |  | หญิง | 731     | 2.21   | 808     | 2.44   |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558   |       | 2559   |       |
|---------------|--|------|--------|-------|--------|-------|
|               |  |      | จำนวน  | อัตรา | จำนวน  | อัตรา |
| 226           | Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77)<br>การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี                              | รวม  | 20,277 | 61.27 | 21,089 | 63.68 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 20,277 | 61.27 | 21,089 | 63.68 |
| 227           | Endometriosis (N80)<br>เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่  | รวม  | 12,763 | 38.56 | 13,682 | 41.31 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 12,763 | 38.56 | 13,682 | 41.31 |
| 228           | Female genital prolapse (N81)<br>การหย่อนตัวออกมากของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี   | รวม  | 5,085  | 15.36 | 4,939  | 14.91 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 5,085  | 15.36 | 4,939  | 14.91 |
| 229           | Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยีดมดลูก | รวม  | 8,626  | 26.06 | 9,328  | 28.17 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 8,626  | 26.06 | 9,328  | 28.17 |
| 230           | Disorder of menstruation (N91-N92)<br>ความผิดปกติของระดู   | รวม  | 10,645 | 32.16 | 10,113 | 30.54 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 10,645 | 32.16 | 10,113 | 30.54 |
| 231           | Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหยุดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหยุดประจำเดือน                                    | รวม  | 4,227  | 12.77 | 4,318  | 13.04 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 4,227  | 12.77 | 4,318  | 13.04 |
| 232           | Female infertility (N97)<br>ภาวะมีบุตรยากในสตรี  | รวม  | 298    | 0.90  | 307    | 0.93  |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 298    | 0.90  | 307    | 0.93  |
| 233           | Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์                   | รวม  | 24,373 | 73.64 | 24,474 | 73.90 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 24,373 | 73.64 | 24,474 | 73.90 |
| 234           | Spontaneous abortion (O03)<br>แท้งเอง  | รวม  | 14,052 | 42.46 | 13,017 | 39.30 |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 14,052 | 42.46 | 13,017 | 39.30 |
| 235           | Medical abortion (O04)<br>การทำแท้งโดยแพทย์  | รวม  | 1,640  | 4.96  | 1,498  | 4.52  |
|               |  | ชาย  | 0      | 0.00  | 0      | 0.00  |
|               |  | หญิง | 1,640  | 4.96  | 1,498  | 4.52  |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 236           | Other pregnancies with abortive outcome<br>(O00-O02, O05-O08)<br>การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง   | รวม  | 28,931  | 87.42  | 28,297  | 85.44  |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 28,931  | 87.42  | 28,297  | 85.44  |
| 237           | Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความตันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด                         | รวม  | 23,542  | 71.13  | 24,664  | 74.47  |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 23,542  | 71.13  | 24,664  | 74.47  |
| 238           | Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด   | รวม  | 6,047   | 18.27  | 5,829   | 17.60  |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 6,047   | 18.27  | 5,829   | 17.60  |
| 239           | Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลการคลอด อื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำครรภ์ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด | รวม  | 147,757 | 446.46 | 148,810 | 449.32 |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 147,757 | 446.46 | 148,810 | 449.32 |
| 240           | Obstructed labour (O64-O66)<br>การคลอดติดขัด   | รวม  | 25,822  | 78.02  | 24,102  | 72.77  |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 25,822  | 78.02  | 24,102  | 72.77  |
| 241           | Postpartum haemorrhage (O72)<br>ตกเลือดหลังคลอด  | รวม  | 11,505  | 34.76  | 12,077  | 36.47  |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 11,505  | 34.76  | 12,077  | 36.47  |
| 242           | Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)  | รวม  | 293,511 | 886.87 | 293,228 | 885.38 |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 293,511 | 886.87 | 293,228 | 885.38 |
| 243           | Single spontaneous delivery (O80)<br>การคลอดของครรภ์เดียว  | รวม  | 236,016 | 713.14 | 232,601 | 702.32 |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 236,016 | 713.14 | 232,601 | 702.32 |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ                | 2558                       |                            | 2559                       |                            |
|---------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |  |                    | จำนวน                      | อัตรา                      | จำนวน                      | อัตรา                      |
| 244           | Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not Elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรม อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียด          | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 65,183<br>0<br>65,183      | 196.96<br>0.00<br>196.96   | 67,990<br>0<br>67,990      | 205.29<br>0.00<br>205.29   |
| 245           | Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางมาตรา และโรคแทรกใน ระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด           | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 31,398<br>16,230<br>15,168 | 48.28<br>50.83<br>45.83    | 30,315<br>15,926<br>14,389 | 46.63<br>49.93<br>43.45    |
| 246           | Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 68,966<br>33,627<br>35,339 | 106.06<br>105.31<br>106.78 | 69,569<br>34,619<br>34,950 | 107.01<br>108.54<br>105.53 |
| 247           | Birth trauma (P10-P15)<br>บาดเจ็บจากการคลอด  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 8,632<br>5,085<br>3,547    | 13.27<br>15.92<br>10.72    | 8,282<br>4,925<br>3,357    | 12.74<br>15.44<br>10.14    |
| 248           | Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และ ภาวะแอสฟิกเซียเมื่อแรกเกิด   | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 14,410<br>7,998<br>6,412   | 22.16<br>25.05<br>19.37    | 13,906<br>7,697<br>6,209   | 21.39<br>24.13<br>18.75    |
| 249           | Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติ อื่น ๆ ในระยะปริกำเปิด  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 67,790<br>40,112<br>27,678 | 104.25<br>125.62<br>83.63  | 72,906<br>43,363<br>29,543 | 112.14<br>135.96<br>89.20  |
| 250           | Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37)<br>การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคพาราสิต  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 32,431<br>17,651<br>14,780 | 49.87<br>55.28<br>44.66    | 36,244<br>19,966<br>16,278 | 55.75<br>62.60<br>49.15    |
| 251           | Other infections specific to the perinatal period (P38-P39)<br>การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด  | รวม<br>ชาย<br>หญิง | 5,944<br>3,424<br>2,520    | 9.14<br>10.72<br>7.61      | 5,581<br>3,170<br>2,411    | 8.58<br>9.94<br>7.28       |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 252           | Haemolytic disease of fetus and newborn (P55)<br>โรคเม็ดเลือดแดงแตกของ胎รักในครรภ์และแรกเกิด                              | รวม  | 7,728   | 11.88  | 8,131   | 12.51  |
|               |  | ชาย  | 3,954   | 12.38  | 4,182   | 13.11  |
|               |  | หญิง | 3,774   | 11.40  | 3,949   | 11.92  |
| 253           | Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96)<br>ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด          | รวม  | 250,573 | 385.33 | 248,064 | 381.56 |
|               |  | ชาย  | 136,526 | 427.55 | 136,205 | 427.05 |
|               |  | หญิง | 114,047 | 344.60 | 111,859 | 337.75 |
| 254           | Spina bifida (Q05)<br>กระดูกสันหลังแยก   | รวม  | 617     | 0.95   | 677     | 1.04   |
|               |  | ชาย  | 294     | 0.92   | 294     | 0.92   |
|               |  | หญิง | 323     | 0.98   | 383     | 1.16   |
| 255           | Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท         | รวม  | 3,412   | 5.25   | 3,566   | 5.49   |
|               |  | ชาย  | 1,808   | 5.66   | 1,867   | 5.85   |
|               |  | หญิง | 1,604   | 4.85   | 1,699   | 5.13   |
| 256           | Congenital malformation of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต                     | รวม  | 33,146  | 50.97  | 34,229  | 52.65  |
|               |  | ชาย  | 16,530  | 51.77  | 17,011  | 53.34  |
|               |  | หญิง | 16,616  | 50.21  | 17,218  | 51.99  |
| 257           | Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37)<br>ปากแหว่งและเพดานโหนว   | รวม  | 4,789   | 7.36   | 4,901   | 7.54   |
|               |  | ชาย  | 2,551   | 7.99   | 2,577   | 8.08   |
|               |  | หญิง | 2,238   | 6.76   | 2,324   | 7.02   |
| 258           | Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41)<br>ลำไส้เล็กไม่มี ตันและตีบ                                       | รวม  | 386     | 0.59   | 363     | 0.56   |
|               |  | ชาย  | 200     | 0.63   | 199     | 0.62   |
|               |  | หญิง | 186     | 0.56   | 164     | 0.50   |
| 259           | Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45)<br>ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร | รวม  | 26,532  | 40.80  | 29,494  | 45.37  |
|               |  | ชาย  | 15,546  | 48.68  | 17,452  | 54.72  |
|               |  | หญิง | 10,986  | 33.20  | 12,042  | 36.36  |
| 260           | Undescended testicle (Q53)<br>อัณฑะไม่ลงถุง  | รวม  | 2,504   | 7.84   | 2,679   | 8.40   |
|               |  | ชาย  | 2,504   | 7.84   | 2,679   | 8.40   |
|               |  | หญิง | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 261           | Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ   | รวม  | 4,865   | 7.48   | 5,189   | 7.98   |
|               |  | ชาย  | 3,077   | 9.64   | 3,316   | 10.40  |
|               |  | หญิง | 1,788   | 5.40   | 1,873   | 5.66   |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|---------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 262           | Congenital deformities of hip (Q65)<br>ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก  | รวม  | 372     | 0.57     | 378     | 0.58     |
|               |  | ชาย  | 132     | 0.41     | 131     | 0.41     |
|               |  | หญิง | 240     | 0.73     | 247     | 0.75     |
| 263           | Congenital deformities of feet (Q66)<br>ความพิการแต่กำเนิดของเท้า  | รวม  | 2,745   | 4.22     | 2,666   | 4.10     |
|               |  | ชาย  | 1,449   | 4.54     | 1,342   | 4.21     |
|               |  | หญิง | 1,296   | 3.92     | 1,324   | 4.00     |
| 264           | Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิด อื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง   | รวม  | 5,627   | 8.65     | 5,909   | 9.09     |
|               |  | ชาย  | 3,039   | 9.52     | 3,221   | 10.10    |
|               |  | หญิง | 2,588   | 7.82     | 2,688   | 8.12     |
| 265           | Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89)<br>ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ   | รวม  | 10,427  | 16.03    | 10,854  | 16.70    |
|               |  | ชาย  | 5,576   | 17.46    | 5,784   | 18.13    |
|               |  | หญิง | 4,851   | 14.66    | 5,070   | 15.31    |
| 266           | Chromosomal abnormalities, not Elsewhere classified (Q90-Q99)<br>ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรัสระบุไว้ที่อื่น  | รวม  | 6,136   | 9.44     | 6,721   | 10.34    |
|               |  | ชาย  | 3,202   | 10.03    | 3,569   | 11.19    |
|               |  | หญิง | 2,934   | 8.87     | 3,152   | 9.52     |
| 267           | Abdominal and pelvic pain (R10)<br>ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน   | รวม  | 30,509  | 46.92    | 30,294  | 46.60    |
|               |  | ชาย  | 12,089  | 37.86    | 12,004  | 37.64    |
|               |  | หญิง | 18,420  | 55.66    | 18,290  | 55.23    |
| 268           | Fever of unknown origin (R50)<br>ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  | รวม  | 86,060  | 132.34   | 97,308  | 149.67   |
|               |  | ชาย  | 44,284  | 138.68   | 50,434  | 158.13   |
|               |  | หญิง | 41,776  | 126.23   | 46,874  | 141.53   |
| 269           | Senility (R54)<br>痴呆   | รวม  | 3,543   | 5.45     | 2,139   | 3.29     |
|               |  | ชาย  | 1,425   | 4.46     | 864     | 2.71     |
|               |  | หญิง | 2,118   | 6.40     | 1,275   | 3.85     |
| 270           | Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99)<br>อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรัสระบุไว้ | รวม  | 749,696 | 1,152.89 | 768,087 | 1,181.43 |
|               |  | ชาย  | 384,894 | 1,205.35 | 397,101 | 1,245.05 |
|               |  | หญิง | 364,802 | 1,102.28 | 370,986 | 1,120.16 |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 271           | Fracture of skull and facial bones (S02)กระดูกแตกหักบริเวณกระเพาะปัสสาวะและกระดูกหน้า  | รวม  | 32,750  | 50.36  | 34,935  | 53.74  |
|               |  | ชาย  | 26,434  | 82.78  | 28,271  | 88.64  |
|               |  | หญิง | 6,316   | 19.08  | 6,664   | 20.12  |
| 272           | Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08)<br>กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก   | รวม  | 28,637  | 44.04  | 29,873  | 45.95  |
|               |  | ชาย  | 19,062  | 59.70  | 19,962  | 62.59  |
|               |  | หญิง | 9,575   | 28.93  | 9,911   | 29.93  |
| 273           | Fracture of femur (S72)<br>กระดูกต้นขาแตก หัก ร้าว   | รวม  | 37,693  | 57.96  | 40,711  | 62.62  |
|               |  | ชาย  | 16,912  | 52.96  | 18,362  | 57.57  |
|               |  | หญิง | 20,781  | 62.79  | 22,349  | 67.48  |
| 274           | Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12)<br>กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ   | รวม  | 125,045 | 192.30 | 129,859 | 199.74 |
|               |  | ชาย  | 85,171  | 266.73 | 87,721  | 275.04 |
|               |  | หญิง | 39,874  | 120.48 | 42,138  | 127.23 |
| 275           | Fracture involving multiple body regions (T02)<br>กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย  | รวม  | 85      | 0.13   | 94      | 0.14   |
|               |  | ชาย  | 65      | 0.20   | 65      | 0.20   |
|               |  | หญิง | 20      | 0.06   | 29      | 0.09   |
| 276           | Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ | รวม  | 19,808  | 30.46  | 20,175  | 31.03  |
|               |  | ชาย  | 13,406  | 41.98  | 13,610  | 42.67  |
|               |  | หญิง | 6,402   | 19.34  | 6,565   | 19.82  |
| 277           | Injury of eye and orbit (S05)<br>การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา  | รวม  | 11,470  | 17.64  | 11,474  | 17.65  |
|               |  | ชาย  | 9,006   | 28.20  | 8,861   | 27.78  |
|               |  | หญิง | 2,464   | 7.45   | 2,613   | 7.89   |
| 278           | Intracranial injury (S06)<br>การบาดเจ็บภายในกระเพาะปัสสาวะ   | รวม  | 78,375  | 120.53 | 85,106  | 130.91 |
|               |  | ชาย  | 57,013  | 178.54 | 61,290  | 192.16 |
|               |  | หญิง | 21,362  | 64.55  | 23,816  | 71.91  |
| 279           | Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37)<br>การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ   | รวม  | 23,342  | 35.90  | 23,707  | 36.46  |
|               |  | ชาย  | 19,022  | 59.57  | 19,303  | 60.52  |
|               |  | หญิง | 4,320   | 13.05  | 4,404   | 13.30  |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ          | 2558                   |                      | 2559                   |                      |
|---------------|--|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|               |  |              | จำนวน                  | อัตรา                | จำนวน                  | อัตรา                |
| 280           | Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจาก การบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณ ร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ  | รวม ชาย หญิง | 6,363 5,177 1,186      | 9.79 16.21 3.58      | 6,321 5,133 1,188      | 9.72 16.09 3.59      |
| 281           | Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14 ) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุ เนพะและหล่ายบริเวณในร่างกาย | รวม ชาย หญิง | 199,113 144,076 55,037 | 306.20 451.19 166.30 | 200,281 143,737 56,544 | 308.06 450.66 170.73 |
| 282           | Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมฝ่าเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย  | รวม ชาย หญิง | 6,434 3,751 2,683      | 9.89 11.75 8.11      | 6,406 3,812 2,594      | 9.85 11.95 7.83      |
| 283           | Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน   | รวม ชาย หญิง | 22,264 14,624 7,640    | 34.24 45.80 23.08    | 22,314 14,379 7,935    | 34.32 45.08 23.96    |
| 284           | Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยาและซึ่ววัตถุ   | รวม ชาย หญิง | 31,244 12,903 18,341   | 48.05 40.41 55.42    | 30,207 12,399 17,808   | 46.46 38.88 53.77    |
| 285           | Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา  | รวม ชาย หญิง | 46,078 26,758 19,320   | 70.86 83.80 58.38    | 43,542 25,366 18,176   | 66.97 79.53 54.88    |
| 286           | Maltreatment syndromes (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ   | รวม ชาย หญิง | 449 86 363             | 0.69 0.27 1.10       | 413 73 340             | 0.64 0.23 1.03       |

**ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)**

| รหัส กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |        | 2559    |        |
|---------------|--|------|---------|--------|---------|--------|
|               |  |      | จำนวน   | อัตรา  | จำนวน   | อัตรา  |
| 287           | Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่ไม่ได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก  | รวม  | 30,040  | 46.20  | 32,597  | 50.14  |
|               |  | ชาย  | 16,982  | 53.18  | 18,526  | 58.09  |
|               |  | หญิง | 13,058  | 39.46  | 14,071  | 42.49  |
| 288           | Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, note Elsewhere classified (T79-T88)<br>ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น | รวม  | 132,237 | 203.36 | 142,362 | 218.97 |
|               |  | ชาย  | 75,222  | 235.57 | 80,674  | 252.94 |
|               |  | หญิง | 57,015  | 172.28 | 61,688  | 186.26 |
| 289           | Sequelae of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ  | รวม  | 2,155   | 3.31   | 2,391   | 3.68   |
|               |  | ชาย  | 1,538   | 4.82   | 1,793   | 5.62   |
|               |  | หญิง | 617     | 1.86   | 598     | 1.81   |
| 290           | Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13)<br>บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและขันสูตร   | รวม  | 45,656  | 70.21  | 46,446  | 71.44  |
|               |  | ชาย  | 17,674  | 55.35  | 18,262  | 57.26  |
|               |  | หญิง | 27,982  | 84.55  | 28,184  | 85.10  |
| 291           | Asymptomatic human immunodeficiency virus (HIV) infection status (Z21)<br>การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ  | รวม  | 2,711   | 4.17   | 2,809   | 4.32   |
|               |  | ชาย  | 1,257   | 3.94   | 1,311   | 4.11   |
|               |  | หญิง | 1,454   | 4.39   | 1,498   | 4.52   |
| 292           | Other persons with potential health hazards related to communicable diseases (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ   | รวม  | 105,120 | 161.65 | 95,379  | 146.71 |
|               |  | ชาย  | 53,609  | 167.88 | 49,071  | 153.85 |
|               |  | หญิง | 51,511  | 155.64 | 46,308  | 139.82 |
| 293           | Contraceptive management (Z30)<br>การรับบริการคุมกำเนิด  | รวม  | 67,326  | 103.53 | 79,533  | 122.33 |
|               |  | ชาย  | 151     | 0.47   | 53      | 0.17   |
|               |  | หญิง | 67,175  | 202.97 | 79,480  | 239.98 |
| 294           | Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ   | รวม  | 18,517  | 55.95  | 20,147  | 60.83  |
|               |  | ชาย  | 0       | 0.00   | 0       | 0.00   |
|               |  | หญิง | 18,517  | 55.95  | 20,147  | 60.83  |

ตาราง 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม เพศ และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 : 298 กลุ่มโรค) พ.ศ. 2558 -2559 (ต่อ)

| รหัส<br>กลุ่มโรค | สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | 2558    |          | 2559    |          |
|------------------|--|------|---------|----------|---------|----------|
|                  |  |      | จำนวน   | อัตรา    | จำนวน   | อัตรา    |
| 295              | Liveborn infants according to place of birth (Z38)<br>การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด   | รวม  | 578,208 | 889.18   | 559,774 | 861.01   |
|                  |  | ชาย  | 297,999 | 933.23   | 289,153 | 906.59   |
|                  |  | หญิง | 280,209 | 846.67   | 270,621 | 817.12   |
| 296              | Postpartum care and examination (Z39)<br>การดูแลและการตรวจหลังคลอด   | รวม  | 1,932   | 5.84     | 2,036   | 6.15     |
|                  |  | ชาย  | 0       | 0.00     | 0       | 0.00     |
|                  |  | หญิง | 1,932   | 5.84     | 2,036   | 6.15     |
| 297              | Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัดถกการ หรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ | รวม  | 308,395 | 474.25   | 340,086 | 523.10   |
|                  |  | ชาย  | 155,241 | 486.16   | 171,352 | 537.25   |
|                  |  | หญิง | 153,154 | 462.77   | 168,734 | 509.48   |
| 298              | Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99)<br>บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น   | รวม  | 482,321 | 741.72   | 494,737 | 760.98   |
|                  |  | ชาย  | 57,716  | 180.75   | 69,245  | 217.11   |
|                  |  | หญิง | 424,605 | 1,282.98 | 425,492 | 1,284.74 |

รวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภัยนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร  
ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559

| สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |        | เหนือ  |          | กลาง(ไม่รวม กทม.) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|--|------|------------|--------|--------|----------|-------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|  |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา    | จำนวน             | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| รวมทุกกลุ่มโรค   | รวม  | 476,730    | 733.28 | 94,840 | 812.80   | 119,604           | 720.93 | 72,588 | 783.50 | 163,209            | 745.54 | 26,489   | 473.11 |
|  | ชาย  | 302,962    | 949.89 | 59,464 | 1,037.81 | 74,685            | 926.38 | 45,459 | 995.94 | 106,429            | 976.58 | 16,925   | 641.07 |
|  | หญิง | 173,768    | 524.68 | 35,376 | 595.70   | 44,919            | 526.71 | 27,129 | 577.19 | 56,780             | 516.50 | 9,564    | 323.24 |
| Pedestrian injured in transport accident<br>(V01-V09) คนเดินเท้าที่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขับส่ง         | รวม  | 2,865      | 4.41   | 344    | 2.95     | 871               | 5.25   | 471    | 5.08   | 773                | 3.53   | 406      | 7.25   |
|  | ชาย  | 1,813      | 5.68   | 214    | 3.73     | 570               | 7.07   | 284    | 6.22   | 505                | 4.63   | 240      | 9.09   |
|  | หญิง | 1,052      | 3.18   | 130    | 2.19     | 301               | 3.53   | 187    | 3.98   | 268                | 2.44   | 166      | 5.61   |
| Pedal cyclist injured in transport accident<br>(V10-V19)   | รวม  | 7,781      | 11.97  | 1,846  | 15.82    | 1,571             | 9.47   | 1,027  | 11.09  | 2,963              | 13.53  | 374      | 6.68   |
|  | ชาย  | 5,203      | 16.31  | 1,153  | 20.12    | 1,050             | 13.02  | 696    | 15.25  | 2,041              | 18.73  | 263      | 9.96   |
| ผู้ใช้จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขับส่ง   | หญิง | 2,578      | 7.78   | 693    | 11.67    | 521               | 6.11   | 331    | 7.04   | 922                | 8.39   | 111      | 3.75   |
| Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขับส่ง | รวม  | 62,568     | 96.24  | 9,098  | 77.97    | 20,947            | 126.26 | 10,153 | 109.59 | 16,367             | 74.76  | 6,003    | 107.22 |
|  | ชาย  | 46,252     | 145.02 | 6,711  | 117.13   | 15,321            | 190.04 | 6,956  | 152.40 | 12,454             | 114.28 | 4,810    | 182.19 |
|  | หญิง | 16,316     | 49.26  | 2,387  | 40.20    | 5,626             | 65.97  | 3,197  | 68.02  | 3,913              | 35.59  | 1,193    | 40.32  |
| Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in transport accident (V30-V39) ผู้ใช้สามล้อเครื่องบาดเจ็บ | รวม  | 796        | 1.22   | 210    | 1.80     | 171               | 1.03   | 145    | 1.57   | 225                | 1.03   | 45       | 0.80   |
|  | ชาย  | 551        | 1.73   | 139    | 2.43     | 120               | 1.49   | 88     | 1.93   | 167                | 1.53   | 37       | 1.40   |
|  | หญิง | 245        | 0.74   | 71     | 1.20     | 51                | 0.60   | 57     | 1.21   | 58                 | 0.53   | 8        | 0.27   |
| Car occupant injured in transport accident (V40-V49) ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขับส่ง           | รวม  | 2,898      | 4.46   | 505    | 4.33     | 990               | 5.97   | 530    | 5.72   | 670                | 3.06   | 203      | 3.63   |
|  | ชาย  | 1,881      | 5.90   | 321    | 5.60     | 655               | 8.12   | 331    | 7.25   | 441                | 4.05   | 133      | 5.04   |
|  | หญิง | 1,017      | 3.07   | 184    | 3.10     | 335               | 3.93   | 199    | 4.23   | 229                | 2.08   | 70       | 2.37   |

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภายหลังของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

**ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภัยนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร  
ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)**

| สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |        | เหนือ  |        | กลาง(ไม่รวม กทม.) |        | ใต้    |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |        | กรุงเทพฯ |        |
|---|------|------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------|--------|
|   |      | จำนวน      | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน             | อัตรา  | จำนวน  | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา  | จำนวน    | อัตรา  |
| Other and unspecified transport accidents<br>(V98-V99)<br>อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุ | รวม  | 56         | 0.09   | 5      | 0.04   | 14                | 0.08   | 8      | 0.09   | 5                  | 0.02   | 24       | 0.43   |
|   | ชาย  | 39         | 0.12   | 4      | 0.07   | 11                | 0.14   | 6      | 0.13   | 3                  | 0.03   | 15       | 0.57   |
|   | หญิง | 17         | 0.05   | 1      | 0.02   | 3                 | 0.04   | 2      | 0.04   | 2                  | 0.02   | 9        | 0.30   |
| Falls (W00-W19)<br>การพลัดตกหล่น  | รวม  | 118,557    | 182.36 | 29,614 | 253.80 | 26,789            | 161.47 | 15,134 | 163.35 | 39,935             | 182.42 | 7,085    | 126.54 |
|   | ชาย  | 65,516     | 205.41 | 16,186 | 282.49 | 14,184            | 175.94 | 8,144  | 178.42 | 23,456             | 215.23 | 3,546    | 134.31 |
|   | หญิง | 53,041     | 160.15 | 13,428 | 226.12 | 12,605            | 147.80 | 6,990  | 148.72 | 16,479             | 149.90 | 3,539    | 119.61 |
| Exposure to inanimate mechanical forces<br>(W20-W49)<br>บาดเจ็บจากการถูกวัตถุไม่มีชีวิต       | รวม  | 76,694     | 117.97 | 16,508 | 141.48 | 16,857            | 101.61 | 11,204 | 120.93 | 29,524             | 134.87 | 2,601    | 46.46  |
|   | ชาย  | 59,656     | 187.04 | 12,910 | 225.32 | 12,952            | 160.65 | 8,665  | 189.84 | 23,111             | 212.06 | 2,018    | 76.44  |
|   | หญิง | 17,038     | 51.44  | 3,598  | 60.59  | 3,905             | 45.79  | 2,539  | 54.02  | 6,413              | 58.34  | 583      | 19.70  |
| Exposure to animate mechanical forces<br>(W50-W64)<br>บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต     | รวม  | 22,256     | 34.23  | 3,568  | 30.58  | 6,518             | 39.29  | 4,554  | 49.15  | 7,125              | 32.55  | 491      | 8.77   |
|   | ชาย  | 13,111     | 41.11  | 2,168  | 37.84  | 3,622             | 44.93  | 2,753  | 60.31  | 4,287              | 39.34  | 281      | 10.64  |
|   | หญิง | 9,145      | 27.61  | 1,400  | 23.57  | 2,896             | 33.96  | 1,801  | 38.32  | 2,838              | 25.82  | 210      | 7.10   |
| Accidental drowning and submersion<br>(W65-W74)<br>อุบัติเหตุจากการตกน้ำรวมถึงการจมน้ำ        | รวม  | 1,224      | 1.88   | 147    | 1.26   | 404               | 2.44   | 234    | 2.53   | 393                | 1.80   | 46       | 0.82   |
|   | ชาย  | 844        | 2.65   | 97     | 1.69   | 278               | 3.45   | 154    | 3.37   | 283                | 2.60   | 32       | 1.21   |
|   | หญิง | 380        | 1.15   | 50     | 0.84   | 126               | 1.48   | 80     | 1.70   | 110                | 1.00   | 14       | 0.47   |
| Other accidental threats to breathing<br>(W75-W84)<br>อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ      | รวม  | 427        | 0.66   | 89     | 0.76   | 86                | 0.52   | 90     | 0.97   | 142                | 0.65   | 20       | 0.36   |
|   | ชาย  | 255        | 0.80   | 52     | 0.91   | 54                | 0.67   | 53     | 1.16   | 82                 | 0.75   | 14       | 0.53   |
|   | หญิง | 172        | 0.52   | 37     | 0.62   | 32                | 0.38   | 37     | 0.79   | 60                 | 0.55   | 6        | 0.20   |

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภัยนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร  
ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง(ไม่รวม กทม.) |       | ใต้   |        | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|--|------|------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|----------|-------|
|  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน             | อัตรา | จำนวน | อัตรา  | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure (W85-W99) อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิอากาศและความกดอากาศที่ผิดปกติ | รวม  | 5,327      | 8.19  | 751   | 6.44  | 1,369             | 8.25  | 774   | 8.35   | 2,289              | 10.46 | 144      | 2.57  |
|  | ชาย  | 3,623      | 11.36 | 569   | 9.93  | 962               | 11.93 | 500   | 10.95  | 1,474              | 13.53 | 118      | 4.47  |
|  | หญิง | 1,704      | 5.15  | 182   | 3.06  | 407               | 4.77  | 274   | 5.83   | 815                | 7.41  | 26       | 0.88  |
| Exposure to smoke, fire and flames (X00-X09)   | รวม  | 2,014      | 3.10  | 411   | 3.52  | 395               | 2.38  | 256   | 2.76   | 880                | 4.02  | 72       | 1.29  |
| การถูกควัน ไฟและเปลวไฟ   | ชาย  | 1,433      | 4.49  | 276   | 4.82  | 285               | 3.54  | 201   | 4.40   | 622                | 5.71  | 49       | 1.86  |
|  | หญิง | 581        | 1.75  | 135   | 2.27  | 110               | 1.29  | 55    | 1.17   | 258                | 2.35  | 23       | 0.78  |
| Contact with heat and hot substances (X10-X19)   | รวม  | 4,955      | 7.62  | 921   | 7.89  | 1,123             | 6.77  | 799   | 8.62   | 1,850              | 8.45  | 262      | 4.68  |
|  | ชาย  | 2,732      | 8.57  | 495   | 8.64  | 608               | 7.54  | 447   | 9.79   | 1,040              | 9.54  | 142      | 5.38  |
|  | หญิง | 2,223      | 6.71  | 426   | 7.17  | 515               | 6.04  | 352   | 7.49   | 810                | 7.37  | 120      | 4.06  |
| Contact with venomous animals and plants (X20-X29)   | รวม  | 32,066     | 49.32 | 5,305 | 45.47 | 8,699             | 52.43 | 8,587 | 92.69  | 9,047              | 41.33 | 428      | 7.64  |
| สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ   | ชาย  | 19,480     | 61.08 | 3,243 | 56.60 | 5,117             | 63.47 | 5,308 | 116.29 | 5,580              | 51.20 | 232      | 8.79  |
|  | หญิง | 12,586     | 38.00 | 2,062 | 34.72 | 3,582             | 42.00 | 3,279 | 69.76  | 3,467              | 31.54 | 196      | 6.62  |
| Exposure to forces of nature (X30-X39) ภัยธรรมชาติ   | รวม  | 756        | 1.16  | 154   | 1.32  | 272               | 1.64  | 58    | 0.63   | 243                | 1.11  | 29       | 0.52  |
|  | ชาย  | 666        | 2.09  | 133   | 2.32  | 256               | 3.18  | 53    | 1.16   | 199                | 1.83  | 25       | 0.95  |
|  | หญิง | 90         | 0.27  | 21    | 0.35  | 16                | 0.19  | 5     | 0.11   | 44                 | 0.40  | 4        | 0.14  |

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภัยนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร  
ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)  | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง(ไม่รวม กทม.) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|---|------|------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|   |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน             | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| Accidental poisoning by and exposure to noxious substances (X40-X49)<br>การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ                       | รวม  | 17,310     | 26.63 | 3,060 | 26.22 | 4,433             | 26.72 | 3,363 | 36.30 | 5,941              | 27.14 | 513      | 9.16  |
|   | ชาย  | 9,172      | 28.76 | 1,618 | 28.24 | 2,427             | 30.10 | 1,746 | 38.25 | 3,122              | 28.65 | 259      | 9.81  |
|   | หญิง | 8,138      | 24.57 | 1,442 | 24.28 | 2,006             | 23.52 | 1,617 | 34.40 | 2,819              | 25.64 | 254      | 8.58  |
| Overexertion, travel and privation (X50-X57)<br>การออกกำลังมากเกินขนาด การเดินทางและการขาดแคลน                        | รวม  | 1,445      | 2.22  | 284   | 2.43  | 425               | 2.56  | 179   | 1.93  | 464                | 2.12  | 93       | 1.66  |
|   | ชาย  | 917        | 2.88  | 157   | 2.74  | 266               | 3.30  | 117   | 2.56  | 310                | 2.84  | 67       | 2.54  |
|   | หญิง | 528        | 1.59  | 127   | 2.14  | 159               | 1.86  | 62    | 1.32  | 154                | 1.40  | 26       | 0.88  |
| Accidental exposure to other and unspecified factors (X58-X59) ภัยนตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุโดยบังเอิญ | รวม  | 15,898     | 24.45 | 2,327 | 19.94 | 3,201             | 19.29 | 1,949 | 21.04 | 8,068              | 36.85 | 353      | 6.30  |
|   | ชาย  | 8,767      | 27.49 | 1,300 | 22.69 | 1,685             | 20.90 | 1,039 | 22.76 | 4,562              | 41.86 | 181      | 6.86  |
|   | หญิง | 7,131      | 21.53 | 1,027 | 17.29 | 1,516             | 17.78 | 910   | 19.36 | 3,506              | 31.89 | 172      | 5.81  |
| Intentional self-harm (X60-X84)<br>การทำร้ายตัวเอง  | รวม  | 16,211     | 24.93 | 3,734 | 32.00 | 5,451             | 32.86 | 2,182 | 23.55 | 4,048              | 18.49 | 796      | 14.22 |
|   | ชาย  | 7,068      | 22.16 | 1,787 | 31.19 | 2,255             | 27.97 | 870   | 19.06 | 1,817              | 16.67 | 339      | 12.84 |
|   | หญิง | 9,143      | 27.61 | 1,947 | 32.79 | 3,196             | 37.48 | 1,312 | 27.91 | 2,231              | 20.29 | 457      | 15.45 |
| Assault (X85-Y09)<br>การถูกทำร้าย   | รวม  | 30,603     | 47.07 | 4,390 | 37.62 | 7,146             | 43.07 | 4,572 | 49.35 | 12,455             | 56.89 | 2,040    | 36.44 |
|   | ชาย  | 24,104     | 75.57 | 3,270 | 57.07 | 5,576             | 69.16 | 3,576 | 78.35 | 9,956              | 91.36 | 1,726    | 65.38 |
|   | หญิง | 6,499      | 19.62 | 1,120 | 18.86 | 1,570             | 18.41 | 996   | 21.19 | 2,499              | 22.73 | 314      | 10.61 |
| Event of undetermined intent (Y10-Y34)<br>เหตุการณ์ที่ไม่อาระบุเจตนา  | รวม  | 6,599      | 10.15 | 1,379 | 11.82 | 1,455             | 8.77  | 898   | 9.69  | 2,370              | 10.83 | 497      | 8.88  |
|   | ชาย  | 3,557      | 11.15 | 761   | 13.28 | 734               | 9.10  | 475   | 10.41 | 1,317              | 12.08 | 270      | 10.23 |
|   | หญิง | 3,042      | 9.19  | 618   | 10.41 | 721               | 8.45  | 423   | 9.00  | 1,053              | 9.58  | 227      | 7.67  |

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภัยนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)


| สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั้งประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง(ไม่รวม กทม.) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|--|------|------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน             | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| Legal intervention and operations of war (Y35-Y36) ปฏิบัติการหรือการแทรกแซงทางกฎหมายและการทำสังคม  | รวม  | 69         | 0.11  | 3     | 0.03  | 6                 | 0.04  | 28    | 0.30  | 2                  | 0.01  | 30       | 0.54  |
|  | ชาย  | 57         | 0.18  | 3     | 0.05  | 6                 | 0.07  | 18    | 0.39  |                    | 0.00  | 30       | 1.14  |
|  | หญิง | 12         | 0.04  |       | 0.00  |                   | 0.00  | 10    | 0.21  | 2                  | 0.02  |          | 0.00  |
| Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59) ยา เครื่องยาและชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา | รวม  | 9,363      | 14.40 | 2,038 | 17.47 | 2,161             | 13.03 | 1,297 | 14.00 | 3,423              | 15.64 | 444      | 7.93  |
|  | ชาย  | 4,185      | 13.12 | 912   | 15.92 | 948               | 11.76 | 565   | 12.38 | 1,549              | 14.21 | 211      | 7.99  |
|  | หญิง | 5,178      | 15.63 | 1,126 | 18.96 | 1,213             | 14.22 | 732   | 15.57 | 1,874              | 17.05 | 233      | 7.87  |
| Misadventures to patients during surgical and medical care (Y60-Y69) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะทำการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรม                                    | รวม  | 1,074      | 1.65  | 239   | 2.05  | 253               | 1.52  | 103   | 1.11  | 292                | 1.33  | 187      | 3.34  |
|  | ชาย  | 570        | 1.79  | 145   | 2.53  | 121               | 1.50  | 50    | 1.10  | 145                | 1.33  | 109      | 4.13  |
|  | หญิง | 504        | 1.52  | 94    | 1.58  | 132               | 1.55  | 53    | 1.13  | 147                | 1.34  | 78       | 2.64  |
| Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use (Y70-Y82) ความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์   | รวม  | 4,562      | 7.02  | 1,680 | 14.40 | 1,146             | 6.91  | 226   | 2.44  | 780                | 3.56  | 730      | 13.04 |
|  | ชาย  | 2,660      | 8.34  | 997   | 17.40 | 668               | 8.29  | 135   | 2.96  | 463                | 4.25  | 397      | 15.04 |
|  | หญิง | 1,902      | 5.74  | 683   | 11.50 | 478               | 5.60  | 91    | 1.94  | 317                | 2.88  | 333      | 11.25 |

ตาราง 24 จำนวน และอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุภัยนอกของการบาดเจ็บ จำแนกเพศ รายภาค/กรุงเทพมหานคร  
ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559 (ต่อ)

| สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)   | เพศ  | ทั่วประเทศ |       | เหนือ |       | กลาง(ไม่รวม กทม.) |       | ใต้   |       | ตะวันออกเฉียงเหนือ |       | กรุงเทพฯ |       |
|--|------|------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-------|
|  |      | จำนวน      | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน             | อัตรา | จำนวน | อัตรา | จำนวน              | อัตรา | จำนวน    | อัตรา |
| Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84)<br>วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย | รวม  | 25,678     | 39.50 | 4,760 | 40.79 | 5,297             | 31.93 | 2,828 | 30.52 | 10,513             | 48.02 | 2,280    | 40.72 |
|  | ชาย  | 14,107     | 44.23 | 2,791 | 48.71 | 2,899             | 35.96 | 1,555 | 34.07 | 5,675              | 52.07 | 1,187    | 44.96 |
|  | หญิง | 11,571     | 34.94 | 1,969 | 33.16 | 2,398             | 28.12 | 1,273 | 27.08 | 4,838              | 44.01 | 1,093    | 36.94 |
| Sequelae of external causes of morbidity and mortality (Y85-Y89)<br>ผลที่ตามมาจากการบาดเจ็บและตาย  | รวม  | 1,569      | 2.41  | 406   | 3.48  | 267               | 1.61  | 284   | 3.07  | 506                | 2.31  | 106      | 1.89  |
|  | ชาย  | 993        | 3.11  | 250   | 4.36  | 177               | 2.20  | 177   | 3.88  | 321                | 2.95  | 68       | 2.58  |
|  | หญิง | 576        | 1.74  | 156   | 2.63  | 90                | 1.06  | 107   | 2.28  | 185                | 1.68  | 38       | 1.28  |
| Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere (Y90-Y98) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่ไม่ได้ระบุไว้ที่อื่น  | รวม  | 315        | 0.48  | 49    | 0.42  | 94                | 0.57  | 38    | 0.41  | 96                 | 0.44  | 38       | 0.68  |
|  | ชาย  | 179        | 0.56  | 25    | 0.44  | 49                | 0.61  | 23    | 0.50  | 59                 | 0.54  | 23       | 0.87  |
|  | หญิง | 136        | 0.41  | 24    | 0.40  | 45                | 0.53  | 15    | 0.32  | 37                 | 0.34  | 15       | 0.51  |

รวมรวม / วิเคราะห์ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล : สำนักงานกองกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข